



268. **REDI FRANC.** - Osservazioni intorno agli animali viventi che si trovano negli animali viventi. In Firenze, per Piero Matini, 1684. In 4° grande. Rileg. pergam. orig. 4 ff.nn. 232 pagg. 26 tavole incise in rame. Sul frontespizio, stampato in rosso e nero, insegna della Crusca incisa in legno. Edizione pregevole e rara. Uno dei rari esemplari in carta grande con barbe. L. 18.000

395 **REDI** (Francesco) Osservazioni di Francesco Redi Accademico della Crusca intorno agli Animali Viventi che si trovano negli Animali Viventi. Florence, Piero Matini, 1684.

4to. Old vellum. 4 ff. + 243 pp. wrongly numbered 253. 26 plates at end, some folding, showing vermin, reptiles, aquatic animals, monsters, etc.

First edition of this celebrated and hitherto much neglected work. Redi is considered by parasitologists as the father of this science. The most important result of his investigations was his demonstration of the reproductive organs in the ascaris of man and of the ascaris eggs. This book is the result of his discoveries and describes 108 different species of parasites. The present is an exceptional copy, being printed on large and thick paper and contains an autograph dedication on the fly-leaf 'Dono di Signore Redi autore al Cavre. Fabbiano Lambardi'. Garrison-Morton 2448. Gamba 823.



**OSSERVAZIONI**  
**DI**  
**FRANCESCO REDÌ**

DESSERTATIONI  
DI  
FRANCESCO REDI





OSSERVAZIONI  
DI  
FRANCESCO REDI  
ACCADEMICO DELLA CRUSCA.  
INTORNO  
AGLI ANIMALI VIVENTI  
CHE SI TROVANO  
NEGLI ANIMALI VIVENTI.



IN FIRENZE, MDCLXXXIV.

---

Per Piero Matini, all' insegna del Lion d' Oro.  
*Con licenza de' Superiori.*

Fuole Doue XI 332

OSIRIS A. 11220

I O

965487

1875

1875

1875

1875

1875



1875


EX illis nos velim intelligi pingendi conditoribus, quos in Tabulis suis invenies, absoluta opera, & illa quoque quæ mirando non satiamur pendentis titulo inscripisse: ut, Apelles faciebat, aut Polycletus: tanquam inchoata semper arte, & imperfecta, ut contra iudiciorum varietates superesset artifici regressus ad veniam, velut emendaturo quicquid desideraretur, si non esset interceptus — Ego plane meis adyci posse multa confiteor: nec his solis, sed & omnibus, quæ edidi-

*Plin. Prefaz. a Vespas.*

**N**Ec dubitavimus, multa esse;  
quæ nos præterierint, homi-  
nes enim sumus, & occupati offi-  
cijs: Subcisivis temporibus ista  
curamus.

*Plin. Prefaz. a Vespas.*

**N**On canto Lui, però che Lui non posso  
Degnamente onorar se non tacendo,  
E riverendo: ma non fian giammai  
Gli altari suoi senza i miei feri, e senza  
Soave fumo d' odorati incensi;  
Ed allor questa semplice, e devota  
Religion mi si torrà dal core  
Che d' aria pasceransi in aria i Cervi,  
E che mutando i fiumi, e letto, e corso,  
Il Perso bea la Sona, il Gallo il Tigre.





**C**HE ne' contorni della Palude di Lerna vivesse anticamente un serpente con sette teste , fù de' Greci , e de' Latinj Poeti un favoloso Trovato , ed una Iperbole di penne amplificatrici . Ma non è mica menzogna , che si trovi talvolta qualche serpe , il quale abbia due capi : Conciossiacosachè racconta *Eliano* , che nel paese bagnato dal fiume *Arcade* soleuano , al suo tempo , comparir non di rado certi simili serpenti lunghi per lo più quattro cubiti , col corpo tutto quanto nero , eccettuatene le due teste , le quali biancheggiavano . E *Aristotele* , nel Cap. 4. del 4. lib. della *Generazione degli Animali* , prima di *Eliano* , ci lasciò scritto , Già

A

si è

si è veduto un Serpente da due teste , per la medesima cagione ; Imperocchè questa razza di animali partorisce l' uova , e molte di numero , ma rade volte da quelle uova nascono i mastri per cagione della figura dell' uero . Nel Museo Bolognese del famoso *Ulfisse Aldrovando* se ne conserva ancor oggi uno imbalsamato : Ed un altro essersene veduto ne' Monti Pirenei , lo scriue *Fortunio Liceto* nel suo libro de' *Mastri* : siccome *Giouan Batista Porta* Napoletano racconta , esser nata in Napoli una così fatta vipera : E *Martino Foghelio* Amburghese uomo , che , nella osservazione delle cose naturali , era non men dotto , che diligente , mi scrisse già molti anni sono , averne veduta un' altra in Roma , ed un' altra nella Città di Lione in Francia : Ed io facilmente , e di buona voglia lo credo ; perchè questo presente anno , essendo in Pisa colla Corte , ebbi fortuna di vedere , e di maneggiare un simile Serpentello con due teste , trovato , e preso nella stessa Città , mentre se ne stava lungo la riva d' Arno a riscaldarsi disteso al Sole nel bel mezzo di Gennaio : e volli farvi sopra qualche curiosa osservazione , e particolarmente nel dare un' occhiata per passatempo all' interna fabbrica , ed all' interno ordine , e postura delle viscere ; giacchè da veruno di coloro , che anno menzionati i serpentelli da due



due teste , non n' è mai , ch' io sappia , stata fatta parola .

Questo serpentello adunque , che da' Paesani del Contado è tenuto , che sia l'Aspido , e per conseguenza è stimato velenoso , anzi più velenoso , e più mortifero delle vipere , era maschio , e di poco passava la lunghezza di due de' miei palmi , e nella grossezza poteasi dir simile al dito minore della mano di un' uomo , come si può vedere nella Figura prima della prima Tavola , dove è disegnato minore del naturale . Appareva di color chiaro di ruggine , tutto tempestato vagamente di macchie nere , e con bell' ordine lunghesso il dorso , e lunghesso il ventre disposte ; con questa differenza però , che le macchie del dorso , e de' fianchi erano veramente più fosche , e quelle del ventre più chiare , ed all' intorno , per così dire , più sfumate . A prima vista giudicai , che fosse una Viperetta : Ma due considerazioni mi distolsero da tale opinione ; imperocchè non portava in bocca quei denti maggiori , o canini , o maestri , che portano le vipere , racchiusi nelle loro guaine , come accennai nelle mie *Osservazioni intorno alle vipere* : E di più intorno a' due colli , immediatamente dopo le due teste , avea una striscia bianca lattata , che cingea l' uno , e l' altro collo inoggia

di due collarini , il che non anno le Vipere . Vna striscia parimente bianca lattata circondava intorno intorno l' estremità della coda , la qual coda era tutta tempestata di macchie bianche in figura di minutissime stelluzze .

Le teste , ed i colli erano della stessa grossezza , e lunghezza , senza differenza veruna ; ed essi colli erano lunghi al più al più due dita trasverse . In ogni bocca si vedea la sua lingua al solito de' serpenti acutissima , e biforcata in punta , nascente , e radicata sotto il cannello dell' asperarteria : Si vedeano altresì due occhi per ogni testa : Ed in somma queste teste erano totalmente simili , e di niuna particella tra di loro manchevoli , e differenti .

Due erano le trachee o canne de' polmoni : Due per conseguenza i polmoni , l' uno dall' altro onninamente diviso . Il destro appariva chiaramente maggiore del sinistro . La loro figura scorgeasi simile a quella de' polmoni delle Vipere , e delle altre serpi , in foggia di un lungo , e semplice sacco membranoso tutto internamente di piccoli rialti , e rabeschi allu rinfusa ricamato ; manifestamente di due sostanze , e come per appunto *Gherardo Blasio* descrive il polmone del serpente da esso notomizzato nella quinta parte della sua *Notomia degli Animali brutti* .

Due

Due i cuori racchiusi ne' loro particolari Pericardi, e ciascuno avea di persè i suoi propri canali sanguigni, con questa sola differenza, che il cuore dextro era più grande di quello, che si fosse il sinistro.

Due gli Esofaghi, e due gli stomachi assai lunghi secondo il solito de' serpenti. Questi stomachi si univano in un solo, e comune intestino: E la dove in esso comune intestino si univano, inalzavasi nel fondo di ciascuno di essi internamente un mucchietto circolare di minutissime glandulette, o papille acute in punta, e rossigne, simili a quelle, che ne' volatili guerniscono la parte interna, e bassa dell' Esofago in vicinanza dello stomaco; e gemevano qualche, appena visibile stilla di liquor bianco, ed, a giudizio del sapore, salato. Vna linea di simili, ma molto minori papillette, che senza l' aiuto del Microscopio non si potevano ben distinguere, scorreva per tutta quanta la lunghezza del canale componente gli Esofaghi, e gli stomachi.

L' intestino, dopo i consueti avvolgimenti si conduceva a sboccare nella cloaca del podice, conforme sta delineato nella Figura seconda della prima Tav. Gli stomachi totalmente voti, solamente nel canale degl' intestini riteneasi per ancora qualche piccola bruttura di sterco, e qualche

che impiastramento di materia mucosa , tra la quale stavano involti , e per così dire impantannati molti minutissimi lombrichi , alcuni di color bianchissimo , ed altri di colore rossigno , e tutti vivi , ancorchè per tre settimane io aueffi tenuto questo animalletto rinchiuso in un gran vaso di vetro , dove non volle mai prender cibo di sorte alcuna , conforme soglion fare molte razze di serpenti .

- Il fegato non era un solo , ma due erano i fegati . Nel dextro , che trovai esser maggiore del sinistro , tondeggiavauo cinque rilevate vescichette , ciascuna delle quali racchiudeva un vermicciuolo della stessa razza di quegli impantannati nella cavità degl' intestini . La considerazione di questi tali vermicciuoli mi diede impulso al presente Trattatello , in cui secondo l' occasione faranno tramischiate , per passaggio , altre minute Osservazioni intorno alle cose della Storia naturale . Ma torniamo ora al serpentello da due capi .

Ciascuno de' due fegati corredevasi della sua propria vena scorrente sovra di essi fegati per tutta quanta la loro lunghezza : E se due erano i fegati due necessariamente erano le borse del fiele , non attaccate , o radicate in essi fegati ; ma bensì collocate naturalmente in qualche solita distanza ,

distanza , conforme suol avvenire nelle Vipere , e negli altri serpenti , che non anno piedi . Ho detto che non anno piedi , perchè nelle Lucertole , ne' Ramarri , e ne' Lucertoloni Affricani , ne' Camalconti , nelle Salamandre acquatiche , negli Stellioni , che per altro nome a Firenze son detti Tarantole , ed in altri serpenti quadrupedi , la borsetta del fiele trovasi piantata tra i due lobi del fegato , ed altamente radicata in vno di essi lobi . In alcuni altri animali fuor della razza de' serpenti ho osservata la borsetta del fiele non radicata nel fegato ; e mi sovviene , che il Pesce Rondine , latin : *Milvus Milvago* Plinij , *Hirundo Rondeletij* , la tiene piantata nell' intestino duodeno , e continuata al fegato per mezzo di un sottilissimo canaletto . E di certo s' ingannò Giovanni Ionstono affermando tenerla nel fegato . Al medesimo intestino duodeno la ha parimente attaccata quel pesce , del quale sotto nome di Pesce d' Oro favellerò a suo luogo , mentovando le vesciche de' Pesci piene d' aria .

La destra borsetta del fiele del serpentello da due teste era molto maggiore della sinistra , ed attaccata con un canaletto alla destra banda , o per così dire al destro lobo del fegato . Dal mezzo quasi di essa borsetta sorgeva il canale cistico , che giva a scaricarsi della bile , ed a metter foca  
negl' .

negl' intestini . Dal lembo estremo della sinistra banda , o lobo di esso fegato destro nasceva un' altro canaletto biliario , che suol chiamarsi epatico , il quale solitario , e senza accostarsi alla borsetta giva ad imboccare negl' intestini , non nella stessa foce del canale cistico , ma bensì un poco lontanetto da quella . Di tal secondo canale biliario epatico non era guernito il sinistro fegato , o non lo seppi vedere , ma solamente era corredato della borsetta del fiele , la quale col suo canale cistico metteva capo nell' intestino in un proprio forame separato onninamente dagli altri due , e penetrava nella cavità dell' intestino con vna molto rilevata papilla . Negli uccelli più che frequentissimamente si trova , che il canale cistico della borsetta del fiele , ed il canale epatico mette diverse foci , e lontane l' une dalle altre negl' intestini ; il che fu già accennato dall' impareggiabile , e dottissimo *Malpighi* nel suo nobile utilissimo Trattato *de' Hepate* . Ed in vero che ho avuta l' occasione bene spesso di toccarlo con mano , e particolarmente ne' Grotti , ne' Tarabusi , nelle Garze bianche , ne' Gusi , nelle Foglie , nelle Gru , nelle Pernici bianche de' Monti Pirenei , ne' Palettoni , o Albardeole , ed in molti e molti altri uccelli , che per brevità tralascio di mentovare . Vna sola cosa foggugnere

gnerò , che questi canali biliari non in tutti gli uccelli metton foce ad un modo nell' intestino ; Imperocchè alcuni vi metton foce in minore , altri in maggior lontananza dallo stomaco : Alcuni vi entrano accompagnati da i canali pancreatici ; altri metton capo nell' intestino senza l' accompagnatura de' suddetti canali pancreatici , conforme si può vedere nelle figure della Tavola settima .

Tutti gli animali maschi della razza de' serpenti , de' Ramarri , e dell' altre Lucertole anno due membri genitali , e due testicoli . Il perche si poteva facilmente credere , che in questo serpentello da due teste , il quale avea le viscere raddoppiate , si douessero trovare quattro testicoli , e quattro membri genitali . Ma la verità si è , che due solamente furono i testicoli , e due i membri genitali . I testicoli al solito bianchi , e lunghetti con le solite appartenenze , e situati nella consueta situazione , cioè a dire , non dirimpetto l' uno all' altro , ma vno di essi posto più alto verso il capo , e l' altro più basso verso la coda . I membri genitali allogati nel solito sito della coda , aventi la solita figura , e pieni di molte , e molte spine nella punta , conforme ne son piene le punte de' membri genitali delle Vipere , e dell' altre serpi , che si strascicano col ventre per terra , Ho detto che si strascicano col

ventre per terra , perchè i due membri genitali de' Ramarri , e delle Lucertole non mi sovviene d'avergli trovati spinosi , ma bensì biforcati . Ho ben trovato tra quadrupedi , che i Topi casalinghi , i Topi aquatici , i Ghiri , &c. anno il membro genitale tricuspide , ed oltre lo averlo tricuspide lo anno altresì corredato d'un piccolissimo officino in quella guisa , che ho veduto il membro degli Scoiattoli , delle Talpe , e de' Porcellini d' India , delle Donnole , e di altri animali maggiori , che pure lo anno armato di vn grande osso , come le Martore , le Faine , le Puzzole , i Tassi , gl' Istrici , i Cani , le Volpi , le Lontre , i Gatti del Zibetto , i Leoni , gli Orsi , i Lupi , e le Foche , le quali per altro nome son dette Vitelli , o Vecchi marini . Egli è ben vero che quest' osso , nel principio della vita di questi animali , non è veramente osso , ma appoco appoco va indurendosi in osso . Tav. 26. Fig. 1. 2. 3. &c.

Spremuti i membri genitali di quel serpentello da due teste schizzaron fuori di quel solito liquor femminile , che ha un certo odorettecciaccio grave , e fetidamente salvatico . Mi son trovato ad osservar due serpi con due code , ed i membri genitali in queste serpi da due code non son mai stati quattro , ma solamente due ; ed il simile ho rinvenuto ne' Ramarri , e nelle Lucertole aventi due



due code ; tra le quali Lucertole se ne trovano anco di quelle , che anno tre code , come si può vedere nella prima Fig. della Tav. seconda . Se le Lucertole da due code , per opinione del semplice , e credulo volgo , anno tante , e tante maravigliose virtù , quante crederà egli , che ne possedesse questa , che di tre code era guernita ?

I due cervelli racchiufi nelle due teste apparivano d' uguale grandezza , e fabbrica ; e le loro spinali midolle camminavano per le vertebre de' due colli ad unirfi in un sol tronco nel principio del dorso , fino all' ultima estremità della coda .  
Tav. prima Fig. 3.

Dopo che ebbi , per quanto mi fu possibile , osservate le viscere , restarono i rimasugli di esse , insieme col torso , e con la pelle , ammassati per alcuni giorni in una tavola , dove avendo incominciato a putrefarsi , posi mente una sera per caso , che quelle carni risplendevano allo scuro di una certa bianca , e pallida luce , la quale durò per quattro notti continue , e poscia appoco appoco svanì . Ho voluto tentare in questa state , se ancor le viscere , le carni , ed il grassume delle Vipere , e di altre serpi non velenose producevano per avventura un tal' effetto luminoso ; ma non mi è succeduto il poterlo mai vedere , per qualsivisa diligenza usatavi . L' ho ben

veduto molte volte in diverse stagioni dell' anno nelle carni , nel grasso , e nell' ossa untuose di differenti maniere di pesci marini , e particolarmente nel Pesce Rondine , nel Delfino , nella Vipera di Mare , nella Sfirena , nella Tenia , nell' Aquila , nel Polpo , nel Calamaio , o Sepia , nella Lolligine , ovvero Totano , nel Polmone marino , ed in molte altre generazioni di pesci , che per brevità tralascio , essendo cosa notissima la luce osservata in così fatti animali , che cominciano , morti che sono , ad imputridire , e corrompersi .

Quando questo serpentello si morì , il che avvenne poco dopo il principio del mese di febbraio , e la sua morte avvenne forse per gli strapazzi da me fattigli nel forzarlo a mordere alcuni animaletti , come appresso riferirò , ebbi campo di vedere , che morì prima la testa destra la mattina alle quindici ore , e la sinistra testa morì lo stesso giorno sett' ore dopo la destra .

Molti giorni prima , che morisse , volli accertarmi , se il suo morso era velenoso : Onde operai , che mordesse con l' una , e con l' altra bocca replicatamente un piccion grosso , il quale non solo non ne morì ; ma non ne ebbe male alcuno , per lo meno , apparente . Lo stesso avvenne a quattro Passere , e a due Calderugi di gabbia : Il perchè

perchè si potrebbe risolutamente dire, che il morso di questa serpe da due teste non fosse stato velenoso; se non si trouassero alcuni animali, che di verno lasciano il veleno, e lo ripigliano fierissimo, e violentissimo nella Primavera, e nella State, come accennai degli Scorpioni Affricani nel mio *Libro della Generazione degl' Insetti*. Con tutto ciò ella è cosa certissima, che le Vipere di fitto verno conservano svegliato, e potente il veleno, ancorchè stieno acquattate ne' loro covaccioli, abbrividate dal freddo, e quasi che diffi agghiadate. Io n' ho più volte fatta l'esperienza; ed alcuni anni sono, al principio del mese di Febbraio, essendo state pigliate certe Vipere nel lido del Mare in vicinanza di Pisa, mi certificai, che non solamente col mordere avvelenavano, ed ammazzavano, mentre erano vive, ma di più avvelenavano, e facevano morire con le punture delle loro teste morte, e morte di quattro giorni, e di vantaggio. Quindi è che mi venne pensiero di voler in qualche altra congiuntura osservar minutamente, e a bella posta quanto tempo dopo morte conservano le Vipere il veleno, facendone replicate esperienze col tener minuto conto dell' ore, al che io non avea badato nelle mie prime *Osservazioni intorno alle Vipere scritte all' Illustriss. Sig. Conte Lorenzo Magalotti*,

ti, e ne meno nella *Lettera*, che pure intorno alle Vipere indirizzai al Sig. Abate Bourdelot, ed al Sig. Alessandro Moro.

Da quel che racconta un Autore Franzese, chiamato *Lorvijs de la Grive* nel suo Libro intitolato *Antiparallele des Viperes romaines*, & *herbes candiottes* stampato in Lione l'anno 1632. appresso Claudio, e Giovanni Castellard, pare, che la Vipera possa ammazzar col suo veleno infin otto giorni dopo, che ella fu morta, e son queste esse le sue parole registrate a carte 77. del soprammentovato suo Libro, nel quale parla delle Vipere della Francia; e più particolarmente di quelle, che nascono nella Provincia Lionesa. *Ce qui est plus remarquable encor; En un seruiteur Lorrain nommè Thiriet asses connu de plusieurs en ceste Ville, pour avoir demeure deux ans dans ma boutique; il fut curieux de savoir si un Vipere mort, & gardè depuis huit iours auroit ses dents. Il lui ouvrit la gorge, & passant le doigt index dessus la dent, fut piqué simplement d'une piqueure, qui fut suivie de tous les accidents ordinaires, dont il fust mort dans sept heures n'eust esté les remèdes. Fin.* quì *Luigi de la Grive*; e sia appresso di lui la verità del racconto: Ed io non ho molta difficoltà a credergli, conforme egli vuole affermare, che le Vipere Lionesi sieno le stesse stessissime, che  
le

le Italiane ; anzi di buona voglia gliele credo , ed ho grande occasione , e molti motivi di crederglielo : ma non posso con certezza scrivere , ed affermare se non quello , che da me medesimo ho veduto , ed osservato .

Il giorno de' nove di Maggio , la mattina sulle undici ore , feci tagliare il capo a molte , ed a molte Vipere : Vn ora , e mezza dopo , che furen morte , e che le teste erano di già rimase senza moto veruno , presi in mano un di quei capi , e con esso , spalancandogli la bocca , feci mordere un Colombo torraiuolo nella parte muscolosa del petto , e calcai benbene il capo , acciocchè quel liquor giallo , che cova nelle guaine de' denti maggiori delle Vipere , potesse penetrar ben addentro nelle ferite della morsura ; ed il Colombo se ne morì in poco meno di due ore.

Adi dieci di Maggio trentatre ore dopo che le Vipere furono morte , con una delle lor teste feci addentare un' altro Colombo torraiuolo nel petto ; e perchè la ferita cominciò fortemente a sanguinare , lo feci addentare di nuovo da un' altro capo di Vipera nella coscia , e se ne morì un ora dopo essere stato addentato. Siccome vn' ora e mezza dopo si morì un altro Colombo , che nello stesso tempo io avea fatto mordere nel petto .

Il gior-

Il giorno seguente , che fù l' undecimo di Maggio , cinquantaquattro ore dopo la morte delle Vipere , ferij con diverfi capi di effe Vipere tre Colombi : Il primo cadè morto quasi subito : Il fecondo indugiò a morire due ore ; ed il terzo ne indugiò quasi tre intere .

Il fimile avvenne in tre Galletti , feriti con differenti capi di Vipere , il giorno dodici di Maggio , settantotto ore dopo che furono amazzate ; Imperochè due in breve tempo se ne morirono , ed il terzo che era più groffo , e più durotto degli altri due , stentò quattro buone ore prima che bafiffe .

Adi tredici di Maggio , centodue ore appreffo la morte delle Vipere , feci mordere replicatamente tre pollastrini . Due di effi morirono tre ore dopo , l' vno appreffo l' altro ; ma il terzo , ancorchè aveffe patito molti tremiti , e molte piccole convulfioncelle , non morì .

Il giorno seguente , centoventifei ore dopo la morte delle Vipere , feci mordere tre Piccioni torraiuoli , e un Galletto . I Piccioni morirono tutti a tre nello spazio di cinqu' ore chi prima , e chi poi . Il Galletto morì dieci ore dopo l' efsere ftato ferito .

Adi quindici di Maggio centocinquanta ore dopo la morte delle Vipere feci la ftessa esperien-

za in tre Galletti , e non ne morì veruno : Siccome non ne morì veruno di tre altri , che ferij il giorno seguente, cento settantaquattro ore dopo, che le Vipere furono ammazzate . Ma , per dire il vero , in questi due ultimi giorni , le teste delle Vipere erano diventate puzzolenti, guaste , e verminose , e facilissimamente si spappolavano in mano ; e con molta difficoltà con esse teste s' imprimeva la morsura ; perchè i denti non reggevano , e le guaine de' denti erano rose , e lacerate .

A mezzo il mese di Giugno replicai le suddette prove con capi morti delle Vipere , e sempre ne avvenne la morte degli animali feriti , ma non potei continuarle se non tre sole giornate ; perchè dal gran caldo le teste erano ad una totale , e fetentissima corruttela pervenute ; e le mosche le avevano fatte più che abbondantemente invernare : E lo stesso mi avvenne al principio di Agosto .

Nel tempo di queste prime esperienze , ed in quello parimente delle seconde , e delle terze , fatte per ritrovare quanti giorni duri il veleno nelle teste delle Vipere morte , feci con ogni possibile diligenza seccare alcuni capi di esse Vipere , avendo ben l' occhio , che non invernassero , e che nel seccarsi rimanessero con la

C bocca

bocca spalancata, e co' denti canini, o maggiori sguainati fuor delle loro guaine in atto di mordere. Dopo molti, e molti giorni, che furono ben-rasciutti, e seccati, ferij al petto, ed alle cosce con essi capi alcuni Colombi, e Pollastri, ma senza che ne avvenisse loro alcun male, o pericolo di morire.

In questo mentre avea cavato dalla bocca di molte Vipere morte di fresco, e dalle guaine de' loro denti molto di quel liquor giallo, e velenoso, che vi stagna: Con esso liquore unsi, ed impiastrai molti fuscelletti di scopa ben aguzzati: lasciai che si rascingassero, e poscia con liquor nuovo gli rimpiastrai grossamente, e rasciutti che furono, gli riposi in vaso di vetro ben ferrato: E lasciato passare un mese, ed anco quaranta giorni, feci la prova del lor veleno, e trovai, che in brev' ora morirono tutti quanti que' Colombi, e que' Pollastri, a' quali piantai profondamente nella parte carnosà del petto un di quei fuscelletti spalmati di veleno viperino, in modo, che il fuscelletto rimanesse ricoperto dalla pelle, e non potesse uscirne, o esserne facilmente cavato. E facile il rintracciare per qual cagione le punture delle teste delle Vipere seccate non avvelenino, ed i fuscelli impiastrati col lor liquor velenoso facciano morire: imperocchè la puntu-



ra impressa dalla testa secca è una semplice , e momentanea puntura del dente , che non lascia liquor velenoso nella piaga ; ma il fuscelletto impiastro , essendo fitto altamente nella carne , e quivi stando qualche tempo , succede , che il veleno seccato sopra il fuscello si ammorvidisce , e si rinviene , e rinvenuto si rende abile a penetrare ne' fluidi del corpo , ed a cagionar la morte . Ne si dubiti , che il morire de' suddetti Colombi , e Pollastrini fosse cagionato non dal veleno , ma dalla ferita , come ferita ; perchè non morì veruno di molti altri Colombi , e Pollastri , a' quali feci lo stesso giuoco con semplici fuscelli non impiastri di veleno viperino : siccome non morirono alcuni altri a' quali sforacchiai con uno spillo fino a sedici , e a venti volte i grossi muscoli del petto , arrivando all' osso del medesimo petto con le punture .

Tutte queste esperienze le ho rifatte replicatamente ne' mesi di Novembre , e di Dicembre , e di Gennaio con Vipere pigliate al Settembre , e fatte venir da Napoli dal Sarenis. Granduca Cosimo Terzo mio Signore , succedendone sempre gli avvenimenti simili a' sopraccennati . Solamente ho osservato di vantaggio , che le teste tagliate alle Vipere in quei tre mesi mantengono il veleno per dieci , e per dodici giorni , ed an-

co più , e meno ; secondochè prima , o poi si rasciuga , e si rifecca nelle guaine de' denti quel liquor velenoso , il quale , per l'apertura della ferita fatta da essi denti , dee penetrare nelle carni ad infettarne i fluidi .

Debbo ora favellare storicamente di que' vermi , che talvolta abitano in diverse parti de' corpi degli animali viventi , conforme fu mia prima intenzione , e conforme promisi allora , quando riferij , che non solamente negl' intestini del serpentello da due teste ritrovai de' lombrichetti bianchi , e rossigni ; ma che di più nel di lui fegato destro vidi , che tondeggiavano cinque rilevate vescichette , ciascuna delle quali racchiudeva un vermicciuolo della stessa razza di quegli , che stavano impantanati tra le lordure degl' intestini . E vaglia il vero , che di sì fatti vermicciuoli soventemente ne ho trovati , e negli stomachi , e ne' budelli delle Vipere , e di altre serpi , non meno che in quegli de' Ramarri , delle Lucertole nostrali , e de' Lucertoloni Affricani : Anzi in uno di questi Lucertoloni Affricani lungo un braccio , e due terzi , che l' Anno 1677. venutomi dalle coste dell' Affrica , era vissuto in Firenze più di otto mesi , senza mangiare , e senza bere , racchiuso in vna gabbia di ferro , e finalmente si era morto o di fame , o di stento ,  
o di

o di freddo , o di che che si fosse , non solamente ritrovai di tali vermicciuoli nello stomaco , e nelle budella ; ma ne trovai altresì alcuni bianchissimi racchiusi tra 'l Peritoneo , ed i muscoli dell' Addomine , ed erano vivi , e lunghi quattro in cinque dita traverse , e grossi quanto un grosso filo di refe addoppiato . Di più tutti i muscoli dell' Addomine erano tempestati d' innumerabili glandulette , o tubercoletti , simili di colore , e di grandezza a' granelli del panico , e del miglio ; ciascuno de' quali tubercoletti conteneva internamente racchiuso un verme . Di quelle glandulette , o tubercoli ve n' erano ancora de' più grossetti , e quasi della grandezza delle vecce , de' piselletti , e de' ceci , e conservavano anch' essi il loro proprio verme quasi della stessa lunghezza , e della stessa grossezza di quegli , che come ho detto , camminavano sciolti in quegli spazi , che sono tra 'l Peritoneo ed i muscoli dell' Addomine . In oltre il Peritoneo medesimo dalla parte interna era tutto pieno de' suddetti tubercoli : E la dove parimente il Peritoneo va ad unirsi al mesenterio intorno all' intestino colon , e nel mesenterio stesso , ve n' era una quantità innumerabile . Vna quantità innumerabile parimente se ne vedea sotto il Peritoneo in quei luoghi , che son chiamati l' anguinaic , dove tro-  
vai

vai due corpi glandulosi di color dorè , o per dir meglio , due glandule conglomerate , lunghe sette dita trasverse , divise in molte strisce attaccate l' una all' altra per mezzo di molti canaletti , e di molte sottilissime fibre membranose , le quali tutte strisce erano gremite di quegli stessi tubercoletti verminosi .

Il polmone del Riccio terrestre , che per altro nome dicesi Spinoso , è diviso in due parti , una delle quali posa nel lato destro del torace , e l' altra nel lato sinistro . La parte che posa nel lato destro trovasi per lo più scompartita in tre lobi , ed anco talvolta in quattro ; ma la parte del lato sinistro è sempre costantemente di un sol lobo . In così fatti polmoni di un Riccio femmina grassissima , e lattante , che apersi viva , tanto nel lato destro , quanto nel lato sinistro osservai , che in tutti i loro bronchi , o ramificazioni dell' asperarteria vi si aggiravano molti lombricuzzi vivi bianchi sottilissimi , e non più lunghi di quanto si sia larga l' ugnia del dito indice di un uomo . Ne numerai fino in quaranta , e non credo che gli neverassi tutti . Ne questa volta solamente gli ho veduti , ma altre ancora in altri Ricci , e maschi , e femmine , ancorchè non mai in tanto numero quanto in questa femmina . Egli è ben vero , che ne' canali sanguigni serpeggianti per

per essi polmoni non ne ho mai veduto pur uno, ma sempre tutti ne' bronchi dell' asperarteria.

I quattro lobi parimente del lato destro, ed i tre lobi del lato sinistro de' polmoni di una Volpe gli ho offeruati esternamente scabrosi di alcune tuberosità glandulose, e bianche, alcune di figura, e di grandezza simili alle vecce, ed altre simili, a' granelli del miglio. Ciascuna di quelle più grosse racchiudeva un lombrichetto bianco più sottile di un capello; ma in quelle minori, e simili a' granelli del miglio scorgeasi vn' poca di acqua, e tra essa acqua vn piccolo, per così dire, atometto bianco in foggia di un minutissimo, e quasi invisibile uovo. Alle tuniche esterne dello stomaco di un altra Volpe stava attaccata una glandula, più grossa assai di vna grossa noce, ed era internamente tutta traforata da piccoli lombrichetti rossissimi della grossezza, e lunghezza de' minori spilletti.

In una Faina ho veduto, che i quattro lobi del Polmone, che stan situati nella parte destra del petto, ed i due lobi del medesimo polmone, che stan situati nella parte sinistra di esso petto, erano internamente tempestati di varj sacchetti, o vescichette di color nericcio di diverse grandezze, poste secondo l' ordine delle ramificazioni de' bronchi dell' asperarteria. Ciascuna di quaste

ve-

vescichette , o sacchetti conteneva alcuni sottilissimi lombrichi .

In tre altre Faine 'non solamente ho trovato ne' polmoni i sovraddetti sacchetti , o vescichette verminose ; ma di più in una di esse Faine il Zirbo era tutto pieno di certe gallozzole trasparenti della grandezza delle vecce , alcune delle quali non contenevano altro , che un' acqua purissima , ed altre , che non erano tanto trasparenti , contenevano tra quell' acqua un sottilissimo lombrichetto . Inoltre tolta via la pelle , e scorticata , come si dice , la Faina , osservai , che tra' muscoli , e gl' integumenti esterni , per tutta quanta l' estensione del corpo , stavano acquattati moltissimi vermini in figura di lombrichi ; molti de' quali penetravano nella sostanza , e tra gli spazj de' muscoli medesimi . Questi Lombrichi erano tutti bianchi , e lunghi da una spanna alle due , e grossi per lo più quanto l' ordinaria seta , che dicesi da impunture . Ne gli ho trovati solamente sotto la pelle di questa mentovata Faina , ma ancora in molte , e molte altre in differenti stagioni dell' anno , e talvolta così numerosi , che in una sola Faina son arrivato a numerarne fino in dugento , e in dugencinquanta tutti vivi , e talmente vivi , che messi a nuoto nell' acqua vi son campati quattro , e cinque ore per volta ; ma te-  
nuti

tenuti all' asciutto si muoiono in pochi momenti, e si seccano : Non è sola la Faina ad esserne infestata ; ma ne è infestato parimente sotto la pelle quell' animaletto poco minore della Faina , il quale dal fetore , che spira da tutte quante le parti interne , ed esterne del suo corpo , e massimamente ne' tempi caldi , e quando va in amore , da noi Toscani è chiamato Puzzola , e da' moderni Scrittori della Storia naturale in latino diceasi Putorius . Le Martore non ne sono esenti . Di simili vermi ne ho veduti ancora sotto la pelle de' Leonì , e soglion essiere un poco più grossetti di quegli delle Faine . Questi de' Leonì son rappresentati, ancorchè più grossetti del naturale, nella Fig. seconda della Tav. nona , e quegli delle Faine , delle Puzzole , e delle Martore nella Fig. terza della medesima Tav. nona . Sotto la pelle de' Cervi abitano talvolta certi altri bacherozzoli grossotti , e corti , che soglion rodere la pelle medesima , e lasciarvi altamente la traccia della rosura , e non son molto dissimili dalla figura di quegli , che stanno nella testa , e alle radici del naso de' medesimi Cervi , e de' Castroni ancora , de' quali bacherozzoli favellai nelle mie *Esperienze intorno alla Generazione degl' Insetti* , e ne portai la Figura a carte 190. della prima Edizione Fiorentina . Nelle Faine però non solo ho trova-

to sotto la pelle i sovrammentovati vermini bianchi in figura di Lombrichi sciolti , ed a lor voglia vaganti ; ma di più scorticate altre Faine mi sono imbattuto a veder tutte le loro carni esternamente tempestate di certi bitorzoli, o glandule di color bianchiccio , le maggiori delle quali erano quanto vna mandorla schiacciata , e monda ; altre nella grandezza , e nella figura simili ad vn lupino , altre simili alle lenti , ed altre lunghette in foggia di vn pinocchio mondato. Alcune di esse racchiudevano un solo de' suddetti sottilissimi lombrichi bianchi. Alcune non ne racchiudevano un solo , ma due , e tre , ed anco quattro . In alcune altre non vi si trovava niun verme , ma una materia bianca simile al burro , ed al fego , della qual materia bianca se ne trovava talvolta qualche poca in quelle stesse glandule attualmente abitate da' vermi . Di tali glandule verminose non maggiori delle lenti , e de' granelli di grano ne ho vedute soventemente tra tunica , e tunica dello stomaco medesimo .

Da' Cacciatori del Serenifs. Granduca fu pigliata alle tagliuole vna Martora : Nell' osservar le sue viscere io vidi , che il rene destro era , secondo il solito , e naturale stato , non più grosso di una castagna , ma il rene sinistro a prima fronte mi apparve sfoggiatamente cresciuto in foggia  
di



di vna grandissima borsa . Aperta questa borsa fatta dalle sole , e nude , e smunte sottilissime tuniche del rene , in vece del parenchima di esso rene , vi trovai raggruppato uno sterminatissimo Lombrico morto , lungo un braccio , e tre soldi di misura Fiorontina , e grosso quanto l' estremità del mio dito minore della mano , come nella Tav. nona Fig. prima se ne può consider la figura presa per appunto con le feste . Volendo far vedere agli amici così fatto verme , e temendo , che nel corso della notte non si rasciugasse , lo posi la sera in vna catinella , nel di cui fondo aggiunsi qualche quantità di acqua di fiori di mortella ; ma la mattina seguente l' offeruai vn poco assottigliato , ma nella lunghezza , il che è da considerarsi , così cresciuto , che arrivava alla misura di un braccio , e due terzi , auendo imbevuta , e succhiata una buona parte di quell' acqua di mortella .

Pochi giorni dopo nel rene sinistro di un Cane trovai un Lombrico di lunghezza totalmente simile a quello della Martora , ma un poco più sottile : anco questo era morto , e conservava un colore di scarlatta vivissimo , e stavasene rinchiuso nelle tuniche del rene di già consumato ; e le tuniche eran diventate grosse polpute , e di sostanza per così dire , glandulosa . Tali Lombrichi

abitatori ne' reni de' Cani furono anticamente osservati dal dottissimo *Andrea Cesalpino* di Arezzo, che fu uno de' primi scopritori della circolazione del sangue. Furono osservati parimente, e mentovati da *Tommaso Bartolino*, da *Francesco Delestantio*, da *Giorgio Vvolzio*, da *Goffredo Egenizio*, da *Tcodoro Cherchringio*, e dal diligentissimo, e cotanto benemerito della Repubblica anatomica *Gherardo Blasio* nelle sue *Osservazioni Anatomicopratiche* negli uomini, e ne' Brutì. Nello stesso tempo, e nello stesso rene sinistro di una Cagna gravida vidi un altro Lombrico in tutto, e per tutto simile al sopradDETTO, il quale non solamente raggomitolavasi nella borsa delle ringroffate tuniche del rene, ma di più entrava per cinque o sei dita nel canale dell' uretere, dilatato molto più del naturale; sicchè non potendo per esso canale dell' uretere scender l'urina, la gran borsa delle tuniche del rene erane tutta piena, e vi giaceva il sopradDETTO lughissimo Lombrico, accompagnato da un altro molto di lui minore; e tuttadue, ancorchè morti, mostravano quello stesso accessissimo colore di scarlatto: tuttadue parimente tenuti da me per una notte nell' acqua si allungavano come quello della Martora, avendo imbevuta molta di quell' acqua, la quale non penetrava in essi, ne per la bocca, ne pel

pel forame dell' ano , ma bensì per i pori della pelle , imperocchè quando mi venne curiosità di osservare le loro viscere trovai tutta l' acqua , non dentro 'l canale degli alimenti , ma bensì in quella lunga cavità , che racchiude tutte le viscere .  
Tav. ottava Fig. prima .

Venutami dunque curiosità di osservare le viscere di questi Lombrichi della Martora , de' Cani , e di quelli ancora , che trovansi negli uomini , per rintracciare se veramente questi degli animali sieno della stessa razza de' Lombrichi terrestri , che abitano nella terra grassa , e tra 'l letame , mi accorsi evidentemente , che i Lombrichi della terra son d' una specie differente da quella de' Lombrichi , i quali vivono tra le viscere degli uomini , e degli altri animali non ragionevoli . Quali , e quante , e come situate sieno le viscere de' Lombrichi della terra lo ha descritto diligentemente il dottissimo *Tommaso Villis* nel primo *Libro dell' Anima de' Bruti* al capitolo terzo ; e però non voglio qui replicarlo , riservandomi a favellarne poco appresso . Dico solamente per ora , che ne' Lombrichi degli animali non si trova veruno di que' corpi , o globi bianchi descritti ne' Lombrichi terrestri da esso Villis con le seguenti parole : *Ex utroque cordis latere ; Et inde paulo inferius corpora albicantia , Et non nihil globosa*

*sa utrinque in tres veluti lobos distinctos conſtituuntur . Horum duo superiores nitidius albeſcunt , & minores ſunt ; infimus globus utrinque duplo maior , & inſtar farciminis oblongus exiſtit ; Inter hæc corpora albicantia , & magis retro , globuli alij minores quaſi caruncula exigue , & ſubſtarva in duplici ferie , ſcilicet utrinque modo quatuor modo quinque , aut plures diſponuntur .* Dico altresì, che a mio credere i Lombrichi degli uomini , e de' bruti , per quanto ho potuto vedere , non anno lo ſtomaco diviſo in tre grandi cavità , conforme il Villis afferma aver gli ſtomachi de' Lombrichi terreſtri , e di più dentro all' inteſtino de' Lombrichi degli animali non ſerpeggia quell' altro canale , che dal Villis fu oſſervato nell' inteſtino de' Lombrichi terreſtri , e da lui creduto far le funzioni del fegato , e del meſenterio ; ma di ciò , come diſſi , ne farò menzione più diſteſamente poco di ſotto , quando favellerò di eſſi Lombrichi terreſtri . Aperto adunque il Lombrico maggiore di quella ſopraddetta Cagna trovai due principaliffimi canali , uno di colore ulivaſtro , e ſolco , e l' altro tutto bianco . Il canale ulivaſtro è il canale degli alimenti . Il ſuo principio è attaccato alla bocca del Lombrico , e comincia con un canaletto ugualmente ſottile carnoſetto , biancaſtro di groſſe pareti , o tuniche , e va a metter ſoce  
nel

nel canal grande ulivastro, il qual canale ulivastro è membranoso di sottilissime tuniche, e molto più largo, conformesi vede nella Tav. ottava Fig. 3. dove è disegnata la naturale sua grandezza. Cammina a linea retta per tutta la lunghezza del Lombrico terminando nell' estrema punta della coda con manifesta apertura: ed è tutto fatto a piegoline trasversali, ed increspate, acciocchè possa allungarsi, e scorciarsi secondo i moti dell' animale, ancorchè sia alla pelle con sottilissime attaccature lunghette, e cedenti attaccato per qualche spazio nel suo principio, e per qualche spazio ancora verso la sua fine, rimanendo sciolto, e staccato tutto il restante dello spazio di mezzo del canale. Nella cavità di esso non vi stagnava altro, che qualche poca di materia assai fluida del colore della filiggine.

L' altro canale bianco, che [ a mio credere ] appartiene al lavoro della generazione: in questo Lombrico era lungo sette braccia di buona misura, e tutto pieno di una materia bianca, e grassa simile alla manteca. Ha il suo principio, ed attaccamento talvolta un poco lontano dalla bocca, e talvolta vicinissimo, e comincia con un canaletto molto più sottile di quello con cui fa il suo cominciamento il canale degli alimenti, e dopo di avere scorsa la lunghezza di tre dita

tra-

traverse si allarga grandemente, e ingrossa ; quindi or assottigliandosi , ora ingrossandosi , con molti giri , e andirivieni , cammina quasi per tutta la lunghezza del ventre , e poscia risale verso la sua origine , e di nuovo scende , e sempre con nuovi giri , e avvolgimenti intrighatissimi ; e pur di nuovo ritorna a salire alla sua origine , e passa sotto , e sopra al canale degli alimenti , la dove il canale degli alimenti è sciolto , e lo avvolge in più luoghi , e lo circonda ; e con esso si attacca , s' intreccia , e per così dire , si aggroviglia , e di nuovo cala verso la coda , e termina attaccandosi colla punta della sua estremità nel ventre quasi due o tre dita traverse lontano dal podice . Veggasene il disegno nella Tav. ottava Fig. terza nella quale per maggiore evidenza è disegnato sciolto , e senza quei tanti intrighi , e laberinti .

Il verme dell' altro Cane era anch' egli corredato di quei due canali in tutto , e per tutto simili a' suddetti con questa sola differenza , che il canal bianco appartenente all' opera della generazione si stendeva solamente alla lunghezza di cinque braccia e mezzo , e colla sua estremità si attaccava al ventre in maggior vicinanza del podice di quel che si facesse il canal bianco della Cagna .

Il ver-

Il verme del rene della Martora avea gli stessi due canali con qualche piccola differenza, le di cui particolarità ora non mi sovengono, per avere smarrito alcuni fogli, ne' quali ne avea scritte le memorie, e non è mio costume lo affermar cosa veruna, che siasi ambigua, e dubbia. Posso bene affermar con certezza, che un Lombrico da me trovato negl' intestini di una Tigre guernivasi bensì, e del canale degli alimenti, e del canal bianco appartenente alle cose della generazione; ma dal canale degli alimenti verso la sua fine pendevano due sottilissimi intestini ciechi, come sta delineato nella Tav. decimasesta Fig. quarta, ed il canal bianco distendevasi in cotanto sfoggiata lunghezza, che tutto uguale, e liscio, e sommamente sottile trapassava più di dieci volte la lunghezza del Lombrico medesimo; e come quello de' lombrichi de' Cani con una estremità attaccavasi vicino alla bocca, e con l'altra estremità terminava attaccato in vicinanza del podice, rimanendo tutto il restante sciolto, e libero, se non quanto si attorcigliava; e si attaccava intorno intorno al canale degli alimenti.

Ne' Lombrichi tondi degli uomini appariscono i due suddetti canali. Quello degli alimenti nel suo principio è di pareti grosse, dure, salde, opache, ed è bianco, e sottilissimo, ed appoco ap-

E

poco,

poco, a foggia di un cono, si allarga per la lunghezza di meno di un dito traverso; e poscia divenuta la sua tunica floscia, sottilissima, e trasparente, si ristrigne un poco, e subito ricomincia a dilatarsi, e per la materia contenuta diventa di colore ulivastro. Con tal dilatazione cammina attaccato per ogn' intorno fino ad un terzo della cavità del ventre del Lombrico: Quindi si ristrigne di nuovo, e cammina sciolto da ogni attaccamento, lo spazio di un altro terzo del ventre, e di nuovo si dilata, e si allarga, e termina poco lungi dall'estremità della coda con esterna visibile apertura. La materia, che nel canale degli alimenti si suol trovare, non è altra cosa, che un liquido grossietto, e melinoso di color di filiggine foscamente verdastro, in compagnia talvolta di qualche poco di flato Tav. 10. Fig. 2.

L'altro canale che è bianco lattato, e serve alla generazione, se si scompartisce il ventre del Lombrico in tre terzi, principia uno di essi terzi lontano dalla bocca stendendosi in tanta lunghezza, che potrebbe francamente dirsi cinque, o sei volte, e talora sette, più lungo del Lombrico; e principia con un sottilissimo tronco, il quale quasi subito si divide in due grossi rami, che con egual grossezza, ma con molti giri, e avvolgimenti camminano verso la coda, e oc-



e occupano una gran parte della lunghezza del ventre; quindi ritornano verso il loro principio, e grandemente assottigliandosi, come una matassa di fili sottilissimi, ed intrigati, si avvolgono intorno al canale degli alimenti; e non terminano in due estremità separate, ma formano un canale circolare. Veggasi la Fig. terza della Tav. decima, dove è disegnato fuor del sito naturale, e senza i naturali suoi avvolgimenti, acciocchè più evidentemente potesse rappresentarsi la sua circolar figura. Sicchè chiaramente è noto, che corre questa differenza tra' Lombrichi de' soprammentovati animali, e tra' Lombrichi dell' uomo, che i Lombrichi de' mentovati animali anno il canale della generazione di un sol ramo, ed il canale della generazione de' Lombrichi dell' uomo si divide in due rami, i quali si uniscono in cerchio continuato, e nella sua origine attaccasi all' interno del ventre, e tale attaccamento arriva, e risponde fin nello esterno della pelle in un forame così sottile, e minuto, che l'occhio ignudo, e non armato di Microscopio appena appena arriva a divisarlo: Ma se internamente si preme il canale, e si spinge a gire verso quel forame certa materia bianca, di cui egli è tutto pieno, si scorge subito scaturire pel suo forame, ed innondare eternamente la pelle qualche quan-

tità di quella materia bianca, la quale sgorgerebbe tutta; se tutta si necessitasse a scorrere a quella volta. Questa materia bianca è similissima al latte, talvolta un poco più grossetta come una manteca, e talvolta un poco più fluida, tanto ne' canali de' Lombrichi maschi, quanto in quegli delle femmine. In tutti quanti i Lombrichi ton- di de' corpi umani da me osservati, che sono stati moltissimi, in tutti ho veduto questo canale della generazione fatto ad un modo senza veruna differenza. Onde io potea forse sospettare, se tra i maschi, e le femmine di questi Lombrichi non vi fosse differenza veruna nella figura del canale, o strumento appartenente al lavoro della generazione. In quattro soli soli Lombrichi usciti dal corpo di un fanciullo, e d'un uomo, in compagnia d'un' infinita quantità di Ascaridi, ho trovato il canale della generazione molto differente di figura, e di sito dal suddetto canale, che ho descritto: Imperocchè se quel canale avea il suo attaccamento, e la sua apertura un terzo lontano dalla testa; questo di questi quattro Lombrichi avea l'attaccamento, e l'apertura nella estremità della coda, quasi accanto all'apertura, nella quale sbocca l'intestino per mandar fuori le fecce. Nella sua attaccatura era fortissimo, e sempre, per lo spazio di quattro dita

tra-

traverse , camminando verso la testa , andava ingrossando alla grossezza d' una penna dell' ala d' un picciongrossa , e poscia ad un tratto strabocchevolmente si assottigliava in una sottilissima sottigliezza di fil di refe bianchissimo , e sempre nella sottigliezza eguale , il qual filo , con vari avvolgimenti , intrecciamenti , e rigiri , si avvicinava intorno intorno all' intestino : E se il canale di quegli altri Lombrichi faceva una figura circolare , il canale di questi quattro terminava in una semplice estremità , ed era tutto pieno , e particolarmente la dove egli era più grosso , d' una materia latticinosa , bianchissima , e fluidissima . Fuor di questi quattro Lombrichi non mi son mai imbattuto in verun altro Lombrico de' corpi umani a vedere un simile canale . Tav. decima Fig. quarta . E veramente questi quattro Lombrichi erano di figura un pochetto differente da tutti quegli altri , perchè non aveano la coda ritonda come quegli ; ma bensì nell' estremità un poco schiacciata , e piana ; e quando eran morti tenevano essa coda ravvolta in mezzo cerchio ; dove che tutti quegli altri , e vivi , e morti la conservano sempre distesa . Darà forse fastidio a qualcuno , che io sospettassi , che i canali della generazione de' Lombrichi maschi , e delle femmine sembrano totalmente simili tra di loro : Ma certa  
cosa

cosa è che una tale similitudine la Natura l'ha conceduta ancora ad altri Insetti, tra quali ora mi sovviene delle Chioccioline col guscio, e de' Lumaconi ignudi terrestri, che bizzarramente s'uniscono al coito in una maniera tutta differente, da quella dell'altre bestie: Imperocchè i Lumaconi ignudi, e maschi, e femmine portano racchiuso tra le viscere nel ventre un loro arnese, o membro genitale, e sembra, anzi veramente egli è, in tuttadue i sessi onninamente della stessa figura, e grandezza. Allora quando vogliono congiugnersi al coito spingono, ed arrovesciano fuor del corpo i loro membri più lunghi d'un braccio di misura Fiorentina, e gl'intrecciano insieme l'uno con l'altro, e gli avviticchiano, rimanendo in tale avviticchiamento per una considerabile lunghezza di tempo, che talvolta ho osservato trapassar le due, e le tre ore, e sempre quei membri, ciondolando fuor del corpo, scambievolmente si divincolano, si scontrano, si attorcigliano, si allungano, si scortano, ed in questi moti s'imbrodolano d'vna spuma, o bava, simile ad una saponata bianchissima, e viscosetta, che cala esternamente giù per tutta la lunghezza di essi, e fermasi in grosse falde sulla loro estremità; ed in questo tempo sono essi membri genitali internamente pieni di un

un liquore bianco acquoso, che è quello, che somministra la materia a quella spuma, la qual materia jè somministrata a' membri da' vasi spermatici. Ho veduto talvolta due Lumaconi attaccati nell' alto di una muraglia, ed avendo 'cavato fuori i loro membri, e questi intrecciati nella sola estremità, questa estremità appiccavasi così fortemente alla muraglia suddetta, che i membri stavano dislesi, e tirati, come tante corde tirate sul Leuto. Tav. undecima, Fig. prima. Non attaccano però sempre, ne appiccano l' estremità raggrupata, e attorcigliata de' loro membri genitali; anzi il più delle volte la tengono ciondoloni per aria a beneficio di natura. Mi sono molte volte abbattuto a trovarne due uniti al lavoro del coito; ed avendo anatomicamente osservate tutte quante le interne lor viscere, per vedere, se io avessi tanta fortuna di rinvenire chiaramente qual de' due fosse il maschio, e qual veramente fosse la femmina, non ho mai potuto rinvenirlo; perchè tutti i canali, e tutti gli strumenti appartenenti, e alla nutrizione, e alla sanguificazione, e alla generazione appaiono tanto nell' uno quanto nell' altro figurati nello stesso modello, senza ch' io v' habbia potuto, o saputo, scorgere mai differenza veruna per minima, che ella si sia. Occhi migliori de' miei

una-

una volta , per avventura , ve la scorgeranno , se ella vi è , aiutati dal lume , che qui ne ho io presentemente dato . Mi devierò forse troppo , e con molta giustizia ne potrò esser ripreso ; ma , stimo , che non sia forse per dispiacere ; giacchè ho mentovati incidentemente i Lumaconi ignudi , se darò di essi qualche leggier notizia .

Son noti i Lumaconi ignudi , e da molti Autori n' è stato scritto . I più grandi ch' io abbia veduti in Toscana sono arrivati al peso di un oncia e mezza al più .

Quattro principali forami , o aperture , si trovano nell' esterno del corpo del Lumacone ignudo , tutti situati verso la testa . Due di essi son sempre visibili all' occhio ; gli altri due non son così facilmente visibili , ma ci vuol non piccola diligenza per rinvenirli . De' primi due l' uno è aperto sulla punta del muso quasi nel mezzo delle due corna minori ; e questo è il forame della piccola bocca : L' altro forame ha un' apertura larga quanto vna gran lente , che cangia figura secondo i moti dell' animale , ed è posto nella parte destra del collo , la dove il Lumacone porta un certo cappuccio , per così chiamarlo , o per dir meglio , una pezza col lembo intorno staccato nelle parti anteriori , sotto la quale egli ritira , ed appiatta la testa a suo piacimento , ed  
a suo

a suo piacimento altresì apre , e ferra quel forame , e lo stringe , e lo allarga , facendone uscire di quando in quando certi sonagli di aria , i quali , o nell' uscire si rompono , ovvero il Lumacone se gli ritira in dentro , quando ripiglia il fiato , alla volta de' polmoni , giacchè questo forame appartiene a' polmoni medesimi , e ad essi fa la strada . Degli altri due forami , che non son così facilmente visibili , il primo è collocato in quello spazio della testa , che nella parte destra corre tra l'apertura della bocca , ed il forame de' polmoni , e per questo il Lumacone cava fuori il membro genitale . L' altro forame è sull' orlo del forame de' polmoni , ed in questo forametto termina l' intestino del Lumacone , e per esso si scarica dello sterco . Altri molti minutissimi , e quasi invisibili forametti son disseminati per tutta la grossa pelle del Lumacone , e particolarmente su quel cappuccio , o pezza , o cocolla , che egli porta sul collo ; e sono i forami da' quali esce quell' umore untuoso , e viscido , di cui son sempre spalmati i Lumaconi : ed a premere con che che sia all' intorno di quel cappuccio , si vede chiaramente gernerne fuora ; e per conseguenza non è menzogna , che a questi forami sieno continuati i loro canali diramati per tutta quanta la pelle , come avviene nelle Anguille , ed in mol-

maco sta piantato da una delle bande un ossetto femilunare assai tagliente per esercitarvi l'ufficio de' denti Tav. undecima, Fig. quarta; e dalla banda opposta inalzasi pure internamente un piccol corpo cartilaginoso. Alla parete esterna del gozzo stanno attaccate le basi delle quattro corna, che si alzano sulla testa del Lumacone; e quando egli le ritira in dentro, la loro punta, che è gonfia e rotonda, a similitudine di un globetto, entra a toccar la base, e quando le stende infuora, le allunga come per una guaina, alla punta della qual guaina internamente è attaccata una pallottoletta nera, che è la punta del corno; e ritirando in dentro le quattro corna, ritira anche in dentro le quattro guaine, e le arrovescia in dentro, come si farebbe in un dito d' un guanto; che pure indentro si volesse arrovesciare: Sicchè se quelle pallottolette nere, che nelle due corna maggiori son visibilissime senza microscopio, sieno gli occhi de' Lumaconi, come veramente sono, e come savamente inclina a credere il diligentissimo *Martino Lister nel suo galantissimo Trattato de Coeleis*, possono i Lumaconi mandar fuora gli occhi a lor piacimento, e possono altresì rimpiazzargli, e ritirargli in dentro alla base delle corna piantata sul gozzo. Dal gozzo è continuato uno stretto, e certo passaggio allo stomaco.



Allo stomaco è continuato il canale degli intestini , che con diversi giri , e rivolte abbraccia strettamente il fegato , e con esso fegato ha una grandissima comunicazione di canaletti , il che evidentemente si potrà conoscere , se con un cannello si soffierà per la bocca dell' animale nel canal degli alimenti , perchè subito gonfierà non solamente esso canale degli alimenti , ma gonfierà altresì tutto quanto il fegato , e di più nel fegato si troverà una sostanza , o fluido , che chiamar lo vogliamo , simile a quello , che trovasi nello stomaco , e negl' intestini . Liberatosi il canal degl' intestini dagli avvolgimenti del fegato , ritorna verso la sua origine , ed entrando nella sostanza della pelle per qualche breve spazio vi cammina nascosto , e poscia va a sboccare in quel forametto , che è intorno all' orlo di quel maggior forame , pel quale entra , ed esce l' aria per servizio de' polmoni , Tav. duodecima , Fig. prima , i quali polmoni , per così rozzamente dirlo , sono in foggia di una vescica situata all' imboccatura di questo forame , e occupa tutto il luogo , che è coperto da quell' osso bianco , il quale dal volgo comunemente vien chiamato pietra della testa de' Lumaconi , e quest' osso , o pietra , ha luogo sott' al mezzo del cappuccio , o pezza , che cuopre il collo del Lumacone , e  
sta così

stafsi in una sua propria cavità della pelle , ed è convessa da una banda , e concava dall' altra . La parte convessa è quella , che riguarda la pelle ; la concava è quella , che è volta verso il polmone . La parte convessa è di un colore , e di una sostanza di un nicchio bianco , e lustro come madreperla , e si vede che è fatta di vari suoli , o falde , come son fatti i gusci dell' Ostliche , o di altre Conchiglie marine . La parte concava è tutta per lo più , ma non sempre , incrostata , e ripiena di una bianchissima , talvolta aspra , e talvolta liscia , congelazione quasi cristallina . È trovasene di diverse grandezze aventi diverso peso , diversificando la grossezza della loro congelazione . I meno pesanti oksi ne' Lumaconi di giusta statura , gli ho trovati di due , e di tre grani ; ed i più pesanti arrivano talvolta fino a nove grani , ed a dieci . Gli Autori antichi , e moderni scrivono gran cose delle virtù di questa pietra . Lasciamole credere a coloro , che godono d' ingannare , e di essere ingannati . Io al più , al più mi lascerò solamente persuadere , che nella medicina questa pietra produca gli stessi effetti delle perle , e delle pietre de' granchi , e de' gusci delle Conchiglie marine ; il che modernamente è stato accennato da *Martino Lister* accuratissimo , e gentilissimo Scrittore Inglese . *Quod eadem usui*  
dice

gli cuopre la collottola, si vede un moto successivo di pulsazioni cagionato dal cuore. Tav. undecima, Fig. seconda.

Quanto si appartiene agli strumenti della generazione; Aperto il ventre del Lumacone trovansi, tra le altre viscere in quello contenute, un corpo bianco variamente intagliato di sostanza tenerissima, e similissima a' testicoli di molti pesci; onde lo chiamerò per ora il testicolo. Dal testicolo si parte un canale bianchissimo, e quasi trasparente simile al colore delle perle, figurato al di fuori con molti intagli e increspature, che perciò gli dà nome di vaso spermatico; questo vaso spermatico partendosi dal testicolo va alla volta della testa, e si avvicina a quel forame, pel quale il Lumacone, volendo usare il coito; cava, ed arrovescia in fuori il suo membro genitale, ed in questa vicinanza pende da esso vaso spermatico una piccola borsetta in figura di pera, la quale però non si trova sempre in tutti i Lumaconi, quindi il medesimo vaso spermatico va a congiugnersi con un altro canale molto lungo, e bianco, ma non così chiaro, e questo si è il membro genitale; che, unito in un canale comune col vaso spermatico, va a sboccare in quel forame, che è situato nello spazio di mezzo tra le corna, ed il forame de' polmoni. Il  
testi-

testicolo in alcuni Lumaconi è maggiore ; in altri è minore , e differentemente figurato ; ed ancorchè sia di sostanza molto polposa di testicolo , come ho accennato di sopra , e tale sempre io l'abbia trovato ne' mesi di Settembre , e di Ottobre , contuttociò talvolta ne' mesi di Aprile , e di Maggio io l' ho trovato voto affatto di ogni sostanza , senza esservi altro , che la nuda membrana che rassembra un piccolo sacchetto , e questa membrana aperta mostra , che il sacchetto è diviso internamente in moltissime cellette a similitudine dell' intestino colon ; ed inoltre vi è un ligamento , che cammina per la lunghezza di esso sacchetto , come si osserva per appunto nel colon , il qual ligamento è quello che fa , che il sacchetto formi quelle cellette . Alcune volte ne' medesimi mesi di Aprile , e di Maggio ho considerato il medesimo testicolo simile ad uno ammassamento , e a una congerie di piccoli globetti , o uova bianchissime unite insieme per cagione di molti , e molti filamenti , come suol avvenire nell'ovaie de' Pesci . Ma siasi in che stato si vuole il testicolo , o che che sia , sempre , in quella parte , colla quale egli sta unito col vaso spermatico , ha la sua estremità un altro canaletto sottilissimo pieno di materia bianca grossiotta , il quale camminando per lo più a serpe a traverso del ventre  
senza


avere attaccamento veruno nel mezzo, coll' altra estremità più sottile si attacca, e si ramifica nel fegato, o per dir meglio in un corpo glanduloso di figura, e di composizione di parti simile al fegato; ma di colore un poco più rosso, il qual corpo è abbracciato, e circondato dal medesimo fegato, che è di lui cinque, o sei volte maggiore.

Ne' mesi di Aprile, e di Maggio ho veduto alcuni Lumaconi esser privi di quel che ho chiamato testicolo bianco attaccato, e continuato al vaso spermatico. Vedi Tav. duodecima, Fig. seconda. Ne' mesi altresì di Marzo, di Aprile, e di Maggio ho osservato, che tutti i vasi appartenenti alla generazione di queste bestiuole sogliono per lo più trovarsi notabilmente più piccoli, e più smunti; ma di Settembre, di Ottobre, ed anco di Novembre gli ho sempre trovati grandissimi, e pieni di sugo, e particolarmente quegli; che per ora chiamo testicolo, e vaso spermatico.

Il vaso spermatico adunque, che è un canale, come l' ho descritto di sopra, contiene nella sua cavità un umore simile all' acqua un poco più albiccia, ancorchè un poco più viscosa. In quella piccola borsetta in figura di pera, che pende da questo vaso spermatico, frequentemente, ma non

G

sempre,

sempre , trovasi racchiuso un corpo sciolto di sostanza rossigna simile alla sostanza della carne , di grandezza di una mezza lente , in foggia di un rocchietto piegato in mezzo cerchio .  Che cosa sia questa sostanza carnosa non saprei dirlo con certezza . Tav. duodecima , Fig. seconda .

Poco lungi dalla soprammentovata borsetta , il vaso spermatico va a congiugnersi col membro genitale , in un comune canaletto , il qual canaletto sbocca in quel forame , che ho scritto esser situato nello spazio posto di mezzo tra l'apertura della bocca , ed il forame de' polmoni : Ezzo membro genitale anch' egli è un lungo , e liscio canale , che , quando il Lumacone non usa il coito , se ne sta chiuso nel ventre in compagnia dell' altre viscere non disteso , ma avvolto in più giri , come si può vedere disegnato nello stato naturale nella Tav. duodecima , Fig. seconda g. A stare avvolto in quei giri vi è necessitato da una membrana piena di diverse ramificazioni intralciatissime , Tav. duodecima , Fig. terza .

Tale internamente è situato lo strumento della generazione : Ma arrovesciato fuor del ventre , non ha la superficie liscia ; ma bensì scabrosa per molte papillette , o glandule , che in mezzo cerchio del cilindro la circondano dall' attaccatura di esso strumento fino alla metà della sua lunghezza .

ghezza . In oltre l' estremità del medesimo strumento è molto differente : Imperocchè quando egli stassi racchiuso nel ventre , l' estremità sua è liscia , ed appuntata a similitudine di un cornetto ; ma quando è arrovesciata fuor del ventre , si allarga , si spiana ; e distende , e spiega per tutta la lunghezza del membro una falda con varie inegualità , e increspature . Tav. duodecima , Fig. 4. nella quale esso membro è attorto spiralmente in quella stessa foggia , che mostra allora , quando artificiosamente con un cannellino si empie di flato , e si gonfia .

Non è la terra sola ad avere i Lumaconi ignudi ; gli ha ancora il Mare ; e sono quegli stessi animalletti , che dagli Scrittori della Storia naturale furono chiamati *Lepri marine* ; e furono annoverati tra' veleni . Per qual cagione fosse dato loro tal nome , non saprei indovinarlo ; se per avventura non fosse , che allora quando il Lumacone marino tiene distese , e allungate le due corna posteriori , e ritirate in dentro le due anteriori , fa , così a prima vista in tal postura , qualche rozza , ed abbozzata similitudine col muso della Lepre terrestre : imperocchè le due corna allungate possono rappresentare alla immaginazione le lunghe orecchie della Lepre ; e le due corna anteriori ritirate possono far la figura degli occhi . Del resto

il Lumacone marino quanto all' esterna figura è similissimo al Lumacone terrestre, se non quanto il marino nel ventre si è più tronfio; e più corpacciuto del terrestre: e se il terrestre porta sul dorso quel suo cappuccio, o pezza col lembo intorno intorno staccato nelle parti anteriori, e vi ritira, e vi appiatta la testa a suo piacimento, il Lumacone marino non ha sul dorso cotal pezza, o cappuccio, ma in sua vece vi stende due alette, o risalti, o espansioni membranose, e nello spazio che corre di mezzo tra queste due espansioni, sta sotto la pelle situata quella stessa pietra, o osso che ho mentovato ne' Lumaconi ignudi terrestri; ma questo osso de' Lumaconi marini è sottilissimo, e tutto liscio, e sembra lavorato di puro, e quasi trasparente talco. In oltre quantunque la pelle de' marini sia dura, e grossotta, come quella de' terrestri, e sia parimente un poco viscosetta; contuttociò non si può paragonare in maniera veruna al copiosissimo vischio de' terrestri. Le viscere interne, come gli arnesi tutti della generazione, il polmone, il cuore, il canale degli alimenti, son molto, e molto simili, e corrispondenti a quelle de' Lumaconi ignudi terrestri, ed il fegato stesso è ammassato intorno intorno agli intestini, benchè sia di sostanza un poco più duretta, e più forte.

Le



Le Chiocciolè terrestri col guscio anch' esse portano le viscere in alcune cose rassomiglianti a quelle de' Lumaconi ignudi terrestri : Conciossicòsachè anch' esse aprono nel lor corpo esternamente quattro forami , o aperture , cioè quella della bocca ; quella dell' arnese della generazione ; quella de' polmoni , in vicinanza della quale si apre il forame del podice .

Nella cavità dell' apertura della bocca s' alza , per così dire , un osso dentato , o un dente ; Il dottissimo *Marco Aurelio Severino* nella Zootomia scrive di averne trovati due . Non posso dire di averne veduto mai se non uno ; e questo in tutte quante le Chiocciolè , e piccole , e grandi , che ho aperte , tanto di quelle , che nascono nelle pianure di Toscana , quanto di quelle , che abitano nelle Montagne , e particolarmente di quelle grossissime , che si trovano in monte Morello , e son chiamate comunemente Martinacci , e di quelle ancora , che ci son portate dal paese di Pontremoli , e dal Genovesato . Tav. decimaterza , Fig. seconda . Egli è però vero , che le Chiocciolè del Mare soventemente l' ho vedute armate di due denti disegnati nella Tav. decimaseconda , Fig. settima , e sono di una Chiocciola di grandezza , e di figura simile alle comunali terrestri , ed ha il guscio assai grosso , e duro ; di colore ,

lore , e di lucidezza di madreperla scaccato di rosso scuro , e quasi pendente al nero .

Il canale degli alimenti è molto simile a quello de' Lumaconi ignudi , e come quello partendosi dalla bocca va ad aggirarsi intorno al fegato , e ad internarsi in esso con diversi minutissimi canaletti , e poscia , tornando verso la sua origine , mette foce in quel forame collocato accanto alla esterna apertura de' polmoni . Tav. decimaterza , Fig. prima .

Del fegato , e della maravigliosa sua fabbrica , non ne parlo , perchè non si può dir di vantaggio di quello , che vi scopersè l'oculatissimo *Marcello Malpighi* nel Capitolo secondo della sua degnamente celebratissima *Dissertazione del fegato* .

Il forame esterno anche della generazione della Chiocciola risponde internamente in un canale ; o cavità membranosa , nell'interno della qual cavità alzasi un corpo bianco grinzoso di pareti grosse simile a una papilla colla sua bocchetta aperta nella punta . Tav. decimaterza Fig. quinta . Intromessa la setola per questa bocchetta entra in un canale bianco , il quale si dirama in tre altri sottili canaletti lunghissimi , uno de' quali canaletti va ad impiantarsi nelcanele spermatico , fatto , come dirò , a lattughe . Il canale bianco , dal quale si diramano questi tre canaletti , è per  
così

così dire, il prepuzio che cuopre, e veste l'arnese genitale. Imperocchè dentro di esso stassi racchiuso; e quivi non rassembra più lungo di tre dita trasverse, e grosso quanto una penna dell'ale di un colombo; ed è aperto in punta, e dentro scanalato, e pieno d'una materia bianca un poco più consistente del latte. Sdruccio per lo lungo li vede, che dalla sua punta insino al mezzo è tutto internamente rugoso di rughe talvolta longitudinali, e talvolta trasversali, ma dal mezzo fino all'estremità è rugoso di rughe longitudinali. Si rappresenta il suo esterno nella Tav. decimaterza Fig. terza alla lettera C.

In quella stessa cavità membranosa, nella quale alzasi la suddetta papilla dell'arnese genitale, vi sono più internamente due forami. Per uno di questi forami situato nel fondo intromettendosi la setola, penetra in un sacchetto bianco di pareti grosse, e come cartilaginose, dentro del qual sacchetto sta collocato un ossetto lungo bianco spugnoso angolare, scanalato fatto quasi a piramide, che posa la sua base nel fondo del sacchetto sopra un piccol globo cartilaginoso, il qual globo con una quasi sua papilla entra, e penetra nella base dell'osso. *Marco Aurelio Severino* afferma nella sua *Zootomia democritea* non esservi un osso solo, ma bensì due. Io non ne ho mai

mai trovato se non uno , e non ci vedo luogo da potervene adattare due . Per l' altro forame aperto nella soprammentovata cavità membranosa , intromettendosi la setola , entra in un canale bianco , che è messo in mezzo da due altri corti canali , dall' estremità de' quali si diramano molti , e molti altri minutissimi canaletti sciolti sì , ma serrati nelle loro estremità , e per lo più son pieni di un fluido bianco , o simile al latte , e rappresentano la figura di due spazzole . Tav. decimaterza , Fig. terza , Let. I. I. Quel canale , in cui dissi ; che entra la setola si divide in due grossi rami . Vno di questi due rami , che a mio credere , è il canale , o vaso spermatico , grandemente si dilata , ed è fatto a piegoline trasversali da una estremità sciolte , e dall' altra legate , e strettamente increspate come un collare a lattughe . Termina attaccato ad un grosso , e lungo corpo giallognolo , il quale , ne maschi potrebbe dirsi il testicolo ; All' intorno del qual testicolo scappa fuorà un sottil canaletto , che sciolto , e serpeggiante va ad impiantarfi in un certo corpo rosso glanduloso situato , e nascosto nel mezzo di quella massa , che fanno gl' intestini , ed il fegato aggrovigliati insieme . Questo canaletto però non nasce dal testicolo , ma ha la sua origine , o per dir meglio , una delle sue estremità più

più alta di esso la ha al principio del canale spermatico , e cammina alla volta del testicolo sempre attaccato strettamente ad uno de' lembi di esso canale spermatico . Tav. decimaterza , Fig. terza . L' altro ramo , che è pur canale appartenente all' opera della generazione , cammina per tutta la lunghezza del canale spermatico non sopra di esso , ma bensì attaccato ad uno de' suoi lembi con una larga membrana tutta serpeggiata di minutissimi canaletti , ed arrivato al fine del canale spermatico termina , come in una zucchetta , piena di certa materia di color di ruggine simile al sapon tenero . Tav. decimaterza , Fig. terza , Let. L.

Dell' uova prodotte dalle Chiocciolè , e de' Lumaconi ignudi veggasi il libro del sempre con lode mentovato *Martino Lister* . Veggasi il Trattato del virtuosissimo , e diligentissimo *Giacomo Ardero* . Veggasi la lettera scrittane al *Sig. Marcello Malpighi* dal *Sig. Antonio Felice Marfigli* Cavalier Bolognese , che allo splendor de' Natali aggiugne quello di una nobile Litteratura , e di uno ardente commendabil ilussir o desiderio di svelare co' suoi studi le molte , fino ad ora occultate , verità intorno alle operazioni della Natura .

Nella fig. quart. della medesima Tav. decimaterza accennata di sopra si può veder abbozzato ,

H

zato ,

zato, e tratto fuora de' suoi invogli il cuore delle Chiocciolè, di un sol ventricolo, con le diramazioni della vena cava, e dell' aorta; e nella Tav. decimanona, Fig. sesta, il cuore di quelle Buccine marine, che da' pescatori Livornesi son chiamate Cangigli. Stimo, che di queste due figure, per valermi della sua propria frase, si burlerà il Padre *Filippo Buonanni*, il quale nel suo eruditissimo Libro intitolato *Ricreazione dell' occhio, e della mente nell' osservazione delle Chiocciolè al problema diciottesimo costantemente afferma*, tutte le spezie delle Chiocciolè tanto terrestri, quanto marine non avere il cuore, ed in esse per quanto si studi l' occhio aiutato da' microscopi, che fan veder cose alla debolezza di esso invisibili, mai non ne potrà riconoscer vestigio; e pur, se vi fosse, veder lo dovrebbe; siccome nella generazione di tutti gli animali, che an sangue, appena formato si scuopre. Per vedere il cuor delle Chiocciolè terrestri non occorre aiutar la vista col microscopio; ne vi è necessità di aguzzar le ciglia.

*Come il vecchio sartor fa nella cruna.*

Imperocchè l' occhio ignudo, ed anco di sua naturalezza debole, lo può da per se stesso facilmente ravvisare, e scorgere corredato di ramificazioni sanguigne; e può considerarne i moti, e le regulate sue pulsazioni, purchè miri, e si affis-  
si in

fi in quella parte del corpo , dove dalla natura fu collocato . Mi servirò delle parole di *Marco Aurelio Severino* , che nella parte seconda della *Zootomia* al Capitolo vigesimo scrisse . *Verum accidit quoque , ut multa sint cuique obvia , visuque , & tactu familiaria , quæ neque etiam extare advertuntur , & tamen re vera sunt* . Non alle sole Chiocciolc terrestri ha dato la Natura il cuore ; Ella lo ha dato altresì all' Ostriche marine , ed a tutte tutte quante le Conchiglie , che abitano nell' acqua dolce , e nell' acqua salata , ed a tutti quanti gli altri animali , che non anno il sangue tinto di rosso , non essendo necessario il color rosso a dare l' essenza di sangue ; in quella guisa appunto , che tanto è veramente vino il vino vermiglio , quanto il bianco , il dorato , ed il mezzo colore . Che più ? Infino ne' vilissimi Lombrichi terrestri , infino in quegli stessi Pinci marini , che stanno perpetuamente attaccati agli scogli , infino in quegli altri Zoofiti pur sempre radicati ne' medesimi scogli , e talvolta radicati ancora sul groppone di altri Zoofiti , e che da' pescatori Livornesi son chiamati Carnumi , e da altri , perchè levata loro la prima durissima , e scabrosissima pelle appariscono nel colore , nella figura , e nella sostanza simili ad un tuorlo d' uovo quasi cotto sodo avente due beccucci

sperti in fuora simili a quegli de' Pinci marini, vengono appellati uova di mare; infino, dico, in elsi trovasi il cuore bello mostrabile, e visibile senza occhiali; E si trova altresì infino in quei moltissimi, e lunghi tarli, o vermi di Mare, che da' marinari son chiamati Brume, in quegli, dico, che si annidano in tutte quelle tavole delle navi, le quali stanno sempre sott' acqua, e laggiù sott' acqua le rodono, le trivellano, e per valermi di un vocabolo marinarefco, le verrinano tutte quante con grandissimo danno delle medesime navi. Dirò di vantaggio. Si trova il cuore in un certo animaletto, che è il più bizzarro di quanti mai abitano, e vivono ne' fondi del Mare: Ed è così bizzarro, e forse per ancora non osservato da alcuno Scrittore, che non posso ritenermi dal non farne una tal, qual si sia, rozza descrizione. Ben considerato eternamente questo animale con la vista, e col tatto rassembra un pezzo di durissimo scoglio, fatto per adunamento di diverse fogge di sassi marini, di corallumi, e di altre marine congelazioni, e concrezioni, che elevandosi in monti, ed in colline di differenti altezze, formano diverse valli: ed in tali monti, colline, e valli sono effettivamente radicate, e vegetanti molte erbette, ed arbuscelli marini rappresentanti al vivo le selve, ed i prati di questo



sto piccolo , ed animato mondo ; e tra queste vere erbe , e tra questi veri arbuscelli abitano minutissime Conchiglie , e molti altri animaluzzi , scolopendre , lombrichetti , e vermicciuoluzzi , ogniuno de' quali sta intanato nella propria , e particolar sua casa , e cayerna , non casuale , ma quivi da se medesimo fabbricata . La Figura dell' animale è lunga , e biforcata . Tav. vigesima seconda , Fig. prima ; e nelle punte dell' uno , e dell' altro ramo della forca scorge si un forametto ritondo , aperto in una membrana , la quale sta nascosta tra' sassi . Per questi due forametti esterni , che si aprono , e si ferrano a piacimento dell' animale , esso piglia l' acqua , e poscia , se venga maneggiato , la sputa , per così dire , e la schizza molto lontano , in quella maniera appunto , che soglion schizzarla i Carnumi , e quelle Mentule marine , che stanno radicate negli scogli , e quell' altre ancora , che vagano pe' fondi del Mare . Tutta quanta la cavità interna di questo Microcosmo marino animato vien foderata da gentili , e tenere espansioni membranose , che servono a lui di cute , e racchiuggono le sue viscere , cioè il canale degli alimenti , i canali de' fluidi , il fegato , ed il cuore : E tutte queste sue viscere sono differentissime da quelle de' Carnumi , delle Mentule , e de' Pinci marini ; seco-

me differentissima è l' esterna , e l' interna figura dell' animale medesimo con la di lui sostanza , o carne ; la quale a giudizio del palato è tenerissima , e di un sapore simile a quello dell' Ostliche , e dell' Arfelle , le quali pur anch' esse anno il cuore . Ma quale è quel così vile , piccolo , e minutissimo , e quasi invisibile animalletto , che non abbia il cuore ? A tutte quante le generazioni de' viventi la Divina Provvidenza l' ha dato ; anzichè a molti Insetti non ne ha concesso uno solo , ma lo ha scompartito in molti , e molti piccoli cuoricini , ed io ne ho contati fino in venti nelle Scolopendre terrestri , ed un non piccolo numero ancora in quegl' Istici marini , de' quali parlerò a suo luogo , Tav. decimanona , Fig. quinta . Veggasi di tal solita , e consueta molteplicità de' cuori *Marcella Malpighi* nel celebre *Trattato del Verme da Seta* . Il famoso eruditissimo *Samuel Bociaro* ebbe una opinione similissima a questa del *Padre Filippo Buonanni* , mentre nel primo Libro della prima Parte degli Animali della Sacra Scrittura , favellando degl' Insetti s' indusse a dire . *De cætero hæc animalia maxime sunt imperfecta , quippe quæ nec venas habent , neque sanguinem , neque cor , neque iecur , neque pulmonem , neque vesicam , neque ossa , neque spinam , neque adipem . Taceo quod in plerisque visus , audi-*  
tus,

*rus, olfactus aut nullus est, aut hebetior.* Ma questo veramente grandissimo Litterato scrisse al tavolino, e scrisse quello, che in tal materia trovò scritto dagli altri Autori; ne si piccò, ne si prese pensiero di voler far da Filosofo esperimentatore, che non ha intenzione mai di affermar con certezza, se non quanto con gli occhi propri, dopo molte prove, e riprove, ha osservato.

Avendo io qui incidentemente mentovato il sovraddetto erudito Padre Buonanni, sembrerebbe, che io fossi in obbligo di rispondere ad alcune sperimentali opposizioni, che egli difensore della Generazione *ex putri*, ha, per onorarmi, voluto, fare alle mie Esperienze intorno alla Generazione degl' Insetti: e son quest' esse le sue parole nella Parte prima al Capitolo quinto. Non so come il Redi si opporrebbe alla speranza da me fatta allor che pigliati molti fiori detti Giacinti, e alquanto pestati gli posi in un vaso di vetro chiuso con coperchio di terra, aspettandone da quella massa infracidata qualche spontanea generazione; e dopo averlo tenuto per alcune settimane in un armario, vi trovai generati molti vermi di sostanza trasparente, e muccosa, che per il vetro sparsi scorrevano in qua, e là sempre inquieti; e quanto più erano disseccati, tanto più apparivano spiritosi. Eccone la figura, ingrandita però da

da un ordinario Microscopio . Hor questi , dopo esser  
vivuti due giorni , si convertirono in Crisalide , e da  
essa molti giorni dopo ne uscì una Farfalla di color del-  
la cenere con quattro ale , e sei gambe . Si come da  
altre cose putrefatte la sperienza mi ha dimostrato na-  
scer sempre una sorte determinata di vermi , e da cia-  
scuna farfalle , e moschini di specie uniformi . A que-  
sta Esperienza del Padre Filippo Buonanni io non  
voglio opporre cosa veruna : Solamente voglio  
supplicar la gentil cortesia del medesimo Padre a  
ritentarla di nuovo ; e ritentandola a ferrar bene  
con accurata diligenza il vaso , in cui riporrà i  
fiori de' Giacinti pestati ; avvertendo , che il  
coperchio combaci colla bocca di esso vaso , e  
che ne meno per immaginazione vi rimanga spi-  
raglio , o fessura veruna , con istuccar premuro-  
samente tutto quanto il giro delle giunture ; e  
di quello che sia per avvenire mi rimetto volen-  
tieri alla sincerità del suo giustissimo , ed incor-  
ruttibile giudizio , il quale son certissimo , che  
non vorrà mai farsi sofistico contra il vero ; e  
però di buona voglia son contentissimo , che non  
presti mai al mio dire alcuna credenza , se non  
quanto la forza delle prove da lui medesimo at-  
tentissimamente fatte , ed esaminate lo convincer-  
rà a credere , ed a giudicare : E questa tale  
esaminazione , come già scrisse un grandissimo  
Litterato,

Litterato , non solo da me non è sfuggita , anzi farà sempre desiderata : perciocchè il vero , conforme è sua proprietà , allora apparirà più certo , quando sarà mirato con occhio più fisso , e più perspicace . Ne si creda questo virtuosissimo Padre , che io dica ciò per burlarmene , come egli si compiace di affermare , perchè non è mio costume , nè mia inclinazione : E se qui ho menzionato il suo Libro , non ho avuto altro intendimento , che di mostrare al Mondo la stima , che io faccia dell' Autore , e del Libro medesimo , in cui sono sparse molte amene , e vaghe erudizioni , e molte nobili verità , tra le quali non si può però negare , secondo i dettami del mio rozzo , e corto intendimento , che non vi sieno mischiate alcune poche cose , appartenenti alla Storia naturale , che forse dalla verità si allontanano ; ed io non voglio qui recitarle ad una ad una per cagione del dovuto , e da me professato rispetto . E per questa medesima cagione piacemi di supplicare il medesimo *Virtuosissimo Padre Buonanni* a voler replicare quelle altre Esperienze , le quali lo anno spinto a credere , ed a scrivere , che *Ogni fiore , e ogni cosa , che impuridisce , produca sempre spontaneamente un tal verme determinato* , osservando con iscrupolosa , e disappassionata diligenza , quali razze , e quante di  
I animali

animali volanti si aggirino , ronzino , ed impuntino , si soffermino , e si nutrichino in quell'erbe , ed in quei fiori soppesti , che ne' vasi aperti debbono imputridire , o fermentare : quindi consideri i vermi , che vi nasceranno ; e consideri parimente quali razze di animali volanti scapperanno fuora , a suo tempo , da quegli stessi vermi ; e se somiglieranno a quei primi volanti , che furono veduti ronzare intorno , e fermarsi sopra a quell'erbe , ed a quei fiori posti in quei vasi aperti ; e dello avvenimento , conforme dissi , me ne rimetto in tutto , e per tutto al sincero , disappassionato , ed incorruttibil giudicamento del *Padre Buonanni* . Perchè poi più in una cosa , che in un'altra s'impuntino , e si posino gl'Insetti volanti , egli è facile il dirlo . Vi si posano , perchè vi sono invitati dall'odore , che fa trovarvi il loro proprio nutrimento , il quale non è proporzionato , ne conveniente in universale a tutte quante le razze . Vi depositano le loro uova , e le loro semenze , perchè i nati vermicciuoli vi troveranno , come in un nido , il convenevole alimento da poter subito nati con esso mantenersi , crescere , e ridursi alla perfezione . E mirabilmente acutissimo l'odorato degl'Insetti , e potrei raccontarne molte curiose osservazioni da me fatte . E' mirabile altresì il naturale

rale discernimento di tutti gli animali irragionevoli nel riscegliere i luoghi opportuni per mantenersi secondo le stagioni, e per farvi i loro nidi, e per gettarvi le loro uova. E perciò alcune, anzi moltissime razze di pesci viaggiano ogni anno costantemente in lontanissimi paesi. Viaggiano similmente gli uccelli; Alcune razze di essi uccelli fabbricano, e intrecciano sempre i loro nidi in alberi determinati; Altre ne' rami di mezzo, ed altre sempre nelle più alte cime. Altre razze nascondono i nidi fra le biade nel suolo della terra, altre nelle bucherattole de' ciglioni, e de' fossati, e tra le cannuce de' paduli, e de' laghi, altre sulle torri, su' tetti, per le muraglie, e per le case. Tra' pesci marini non tutte le razze buttano le loro uova nell'acqua; ma se ne trovano alcune, che scendendo in terra le sepoliscono sotto la rena, e sulle ripe de' fiumi, come avviene alle Tartarughe: Tra le razze de' medesimi pesci marini, che pur buttan l'uova nell'acqua, non tutte le gettano nell'acqua salata, ma ve ne sono certune, che montano a depositarle nell'acqua dolce: Ed alcuni altri pesci, che per lo più abitano nell'acqua dolce, calano a sgravarsi delle loro semenze nell'acqua marina, conforme posso affermare per lunga osservazione delle Anguille, che ogn'anno alle prime piog-

ge, ed alle prime torbide di Agosto, nelle notti più scure, e più nuvolose, e come dicono i pescatori, nel rimpunto della Luna, cominciano in grossi stuoli a calar da laghi, e da' fiumi alla volta del Mare; e nel Mare depositano le loro semenze, dalle quali semenze, poco dopo che son nate le piccole Anguilline, secondo che prima, o poi lo permette la stagione più rigida, o men rigida, esse Anguilline, salgono per le foci de' fiumi all' acque dolci, cominciando a salire verso la fine del mese di Gennaio, o poco dopo il principio di Febbraio, terminando per lo più intorno alla fine di Aprile; non in un sol passaggio, ma in più, e diversi con intermissione di tempo; ed in questi passaggi montano all' acqua dolce in così gran numero, che alcuni pescatori, i quali l' anno 1667. a mia richiesta pescarono in Arno dentro Pisa in quello spazio, che è tra 'l Ponte a Mare, ed il Ponte di mezzo, in cinque sole ore di tempo, ne pigliarono, non con altro arnese, che con gli itacci, più di tre mila libbre: Ed un altro pescatore pure in Arno un sol mezzo miglio in lontananza del Mare, in sullo spuntar dell' Alba, ne pescò più di dugento libbre, che erano così minute, e sottili, che ne andava intorno a mille alla libbra, delle libbre di Toscana, che sono di dodici onçe. Non  
foa



son però tutte le Anguilline, quando montano all' acqua dolce, della stessa minutezza; anzi elle sono di diverse grandezze, come si vede nella Tav. decimaquarta; dove tutte son disegnate al naturale, ancorchè quelle più grosse del numero 4. 5. 6. 7. sieno pochissime, e le più numerose sieno quelle del numero 1. 2. 3.

Se il *Padre Buonanni* avesse curiosità d' intendere che cosa sia avvenuto a me nel tentare quella sua Esperienza de' fiori de' Giacinti, e di altri fiori, secondo il corso delle stagioni, lo riferirò qui schiettamente in un piccolo *Diario*; protestandomi di nuovo, che non ho ambizione veruna, che egli a me dia fede; ma solamente con ogni ossequio più riverente, e sincero lo prego a soddisfarsi da se stesso con nuove, e reiterate esperienze, acciocchè più chiara egli possa, co' suoi nobili scoprimenti, svelare al Mondo la verità.

Ne' giorni, che corrono tra 'l duodecimo, ed il ventesimo di Febbraio fatti pestare fiori di Giacinti bianchi, e di Giacinti turchini primaticci, gli riposi in differenti vasi di vetro di bocca larga, e aperta: Ed in altri simili vasi aperti riposi fiori turchini di Epatica ovvero Erba Trinità dal fior doppio, fiori gialli di Farfara, fiori d' Erba *Paralitis*, o *Primulaveris* di fior turchino, fiori di Polmo-

Polmonaria, fiori di Clematide, o Vincapervinca, fiori di Elleboro nero, e fiori di Elleboro trifogliato. Non vi nacque mai animaletto alcuno, forse per la freddezza della stagione.

Il giorno 4. di Marzo pestata nel mortaio di marmo con pestello di legno una buona quantità di Giacinti turchini la divisi in quattro parti: Due parti ne riposi in due alberelli di vetro, e gli lasciai aperti senza coprirgli con cosa veruna. L'altre due parti le distribuij in due caraffe, e col cotone turata la bocca del loro collo, la ricoperfi con carta, e la fermai con buona legatura di spago, e tutt'a quattro questi vasi gli collocai insieme in una stessa stanza voltata a mezzo giorno sopra una stessa tavola. Dentro le due caraffe ferrate non ho mai mai veduto nascere alcun verme, ne alcuna farfalla, ne altro animaletto volante. Per non avere a replicarlo a volta per volta in tutte l'altre seguenti Esperienze di questo *Diario*, dico di nuovo, che lo stesso costantemente è sempre avvenuto in tutti gli altri fiori pesti, che ho tenuti in vasi di vetro ferrati: Ed ogni prova, che ho fatta, l'ho fatta sempre ugualmente a doppio, e in vasi ferrati, e in vasi aperti. Ne' due soprammentovati alberelli aperti, dove erano gli altri Giacinti turchini, posi mente, che il dì decimo di Marzo erano state

stare depositate molte piccole uova di mosche; onde ferrai subito con la carta; e da quell' uova poi cominciarono a nascere piccolissimi vermi, che parve, che un poco ingrossassero, ma non continuarono, anzi il dì 22. erano tutti morti, ne mai più in tutt' a due questi alberelli tenuti ferrati nacque animaletto veruno. Egli è ben vero, che nel principio di Maggio gli apersi; e perchè quella poltiglia de' Giacinti avea fatta nella superficie una crosta quasi rasciutta, la tolsi via, e continuando a tenere i vasi aperti, vi si posaron sopra frequentemente molti moscioni di quegli, che si aggirano intorno al vino, ed all' aceto, e perciò vi lasciarono le loro uova, dalle quali al tempo determinato uscirono altrettanti moscioni.

Il medesimo giorno quattro di Marzo suddetto feci la stessa prova con Giacinti bianchi, e vinati, ed avvenne lo stesso per appunto, che ho riferito de' Giacinti turchini.

Adi 12. di Marzo feci ammaccare altri nuovi fiori de' Giacinti. Il dì 20. vi osservai sopra de' vermi. Chiusi al solito i vasi colla carta, ma i vermi non vennero a bene, ne vi nacque alcuna Mosca, o Moscherino, o Moscione: onde il dì 20. di Aprile apersi di nuovo i vasi, acciocchè le Mosche, o altri piccoli Volanti potessero pascolarsi

larfi sopra quei Giacinti , che fi erano conservati molli , e morvidi . Dopo tre giorni vidi nati de' vermi in tutti i vasi , che subito furon ferrati , e dopo i consueti giorni nacquero di Maggio molte di quelle Mosche , che si aggirano intorno alle nostre menfe ; e tali Mosche furono di due differenti razze : alcune maggiori , ed alcune minori , come pur di due razze , e di due differenti figure erano stati i vermi . Le Mosche maggiori furono le prime a nascere , e le minori indugiarono alcuni giorni di vantaggio . Terminato che ebbero di nascere , e passati che furono molti giorni , riaperfi tutti i vasi , ed i residui del fracidume de' Giacinti in essi restati gli misi tutti insieme in un sol vaso aperto , legghiermente innaffiandogli con un poco di acqua comune : Tornarono le Mosche a pascolarvi sopra , e vi lasciarono di nuovo le loro uova , e dall' uova nacquerò i vermi , che a suo tempo comparvero Mosche , ma tutte di una sola razza ; ed erano come sbalordite , ed in pochi momenti morirono , ed alcune non arrivarono ad uscìr vive dal guscio .

In quei giorni , ne' quali si suol essere nella fonda de' Giacinti , io ne avea seccati all' ombra una gran quantità , che conservai ben rinvolta nella carta fino al primo giorno di Giugno ; ed allora misi quei fiori secchi a rinvenirsi nell' acqua tiepida ,

pida, e rinvenuti gli feci pestare, e pestati gli scompartij in quattro alberelli di vetro aperti. In capo a tre giorni vi comparvero molti di quei moscioni, che ronzano intorno alle tina del mosto ed intorno alle vinacce, ed alle botti del vino, e dello aceto; e fra essi, due giorni appresso, scorsi alcuni altri piccoli moscherini neri con l'ali molto più lunghe del lor corpo, armati di lunghe antenne sovra la testa, e talvolta vi scorsi ancora alcune poche mosche: Passati alcuni giorni guizzavano per quella poltiglia molti vermicciuoli. Serrai gli alberelli; ed al tempo determinato in tre di essi nacquero prima molti moscioni, poscia alcuni giorni dopo vi nacquero delle mosche: E di più, in capo ad alcun' altri giorni, nacquero molti, e molti moscherini neri con lunghissime antenne in testa, e con l'ali più lunghe del lor ventre; e vi nacquero parimente molti altri moscherini pur neri un poco più grossetti de' primi con cortissime antenne, e con l'ali non più lunghe del lor ventre: E di più nello stesso tempo vi nacquero certi altri moscioni più grossetti di quegli, che nacquero ne' primi giorni. Nel quarto alberello non vi nacquero ne moscioni, ne moscherini, ma solamente le mosche.

Per continuar le prove, il dì 20. di Giugno,

K

pesta-

pestate alcune cipolle di Giacinti turchini , riposti quella viscosissima pasta in vasi di vetro aperti . Il dì 26. ci vidi de' vermi , da' quali adi 10. di Luglio nacquero moscherini con l'antenne corte in testa , continuando a nascerne ogni giorno fino a tutto il dì 21. E queste bestiuolucce son lestissime , e velocissime al moto , ed appena nate si uniscono all' opera della generazione .

Reiterai l' esperienza con altre cipolle in altri vasi il dì 25. di Luglio , e subito vi furon fatte dell' uova , ma non vi nacque mai verme veruno e conseguentemente ne meno animali volanti . Per non partirmi da' Giacinti soggiugnerò qui appresso quanto mi è avvenuto co' Giacinti maggiori Indiani bianchi volgarmente chiamati Giacinti tuberosi . Il dì 11. di Luglio pestati i fiori , e messi in vaso di vetro aperto vi vidi sopra quasi subito molte , e molte uova , e poco dopo molti piccoli vermi , i quali camparono alcuni giorni , e poi si morirono senza esser quasi punto cresciuti di mole , eccetto che un solo , il quale era ingrossato , ed allungato ; ma il dì 22. pur di Luglio si morì ancor esso senza esser arrivato a fermarsi in ninfa , o crisalide , che vogliamo chiamarla . E lo stesso avvenne in altre prove del 18. del 29. e del 31. Luglio , del 7. del 16. del 20. e del 25. di Agosto essendovi solamente nati vermi ,

mi, i quali sempre morirono, ne mai arrivarono a poterfi far vedere in figura di animalletti volanti: E pure in differenti maniere io avea preparati quei fiori ora pestandogli, ora semplicemente fminuzzandogli con le cefoie, e calcandogli, e bagnandogli con acqua, acciocchè si mantenessero più morvidi. Nelle frondi de' medesimi Giacinti tuberosi avvenne talvolta il simile, che ne' fiori, ancorchè non sempre: Imperocchè il dì 29. di Luglio sulle frondi pestate subito vi furono fatte dell' uova, dalle quali nacquero moltissimi verminetti, che tutti appoco appoco si morirono, eccetto che uno, dal quale al tempo determinato scappò fuori una mosca torpida, e sbalordita, che non si condusse mai a poter distendere le raggrinzate sue ali per poter volare, e si morì ventiquattr' ore dopo di esser nata: Ma in tre altri vasi in differenti giornate, ancorchè vi si vedessero i vermicciuoli, non ve ne fu mai alcuno, che giugneste ad essere visibilmente moscherino, o mosca. Solamente in uno alberello pieno il dì 7. Agosto, pieno dico di frondi, e di gambi teneri di tuberosi ben pestati, vi furono partoriti subito due grandi mucchi di uova; onde fatto ferrare il vaso la mattina de' 9. di Agosto vi apparirono molti, e molti vermicciuoli, e il dì 26. tre mosche uscirono da' loro invogli, sic-

come ancora molti moscherini coll' antenne corte in testa , che subito tra di loro si unirono all' opera di nuova generazione : e di questi così fatti moscherini ne comparve una gran quantità nel corso de' due susseguenti giorni , e poscia nient' altro si vide .

Adi 17. di Marzo , pestai de' fiori bianchi di Leucoio con foglie di Draba . Gli misi in un vaso di vetro , e lo tenni aperto dieci giorni ; Quindi lo ferrai con la carta , e stette così ferrato fino al duodecimo giorno di Maggio , e non vi nacque mai animaletto veruno ; onde l' istesso giorno riaperli il vaso ; e perchè i fiori si erano quasi totalmente rasciutti , gli rammorvidai con l' acqua , e fra pochi giorni le mosche vi fecero sopra moltissime uova, dalle quali nacquero vermi , che a suo tempo comparvero mosche ordinarie , e di una sola razza .

Adi 20. di Marzo , nelle Giunchiglie di Lorena peste , e tenute per qualche giorno in vaso aperto , e poi ferrato non nacque mai animaletto veruno : E non usai la diligenza nel mese di Maggio , o di Giugno di aprire di nuovo quel vaso , in cui da prima le avea riposte .

Adi 19. di Aprile , nelle Giunchiglie odorate di Spagna in capo a due giorni vi vidi minutissimi vermi , che nel mese di Maggio divennero pic-



piccolissimi, e neri moscherini con l'antenne corte in testa, e così veloci, e così lesti, che pareano il moto perpetuo.

Adi 10. di Maggio pestai delle rose rosse, e le posi in due gran vasi di vetro aperti. Il dì 14. ferrai i vasi con carta. In uno di essi la mattina del dì 25. cominciarono a nascervi i moscioni, e continuarono a nascervene in grandissima quantità per dieci giorni, cioè fino a tutto il terzo giorno di Giugno. Nell'altro vaso la sera del dì 25. di Maggio vi si videro scappar fuori i primi moscioni, e fino al primo dì di Giugno ogni giorno se ne videro de' nuovi, ma non in così gran quantità, come nel primo vaso; e poscia ne nell'uno, ne nell'altro vaso non vi nacque mai più niente, ancorchè il dì 24. di Giugno io aprissi tutt' a due i vasi, e con acqua rammorvidissi quella rasciutta poltiglia delle rose rosse, e tenessi poscia i vasi per molte settimane continuamente aperti. Il dì 11. di Giugno pestate le roselline bianche damaschine osservai, che il dì 23. ed il dì 24. vi nacquero di quelli stessi moscioni, che eran nati sopra le rose rosse. Il dì 25. di Giugno peste le rose incarnate, e messi in due vasi aperti, e poscia ferrati; nel primo vaso il dì 7. di Luglio incominciarono a nascervi i moscioni, e continuarono per tutto il dì 9. ma  
fino

fino al dì 15. non vi nacque niente . Il mentovato dì 15. di Luglio ricominciarono a rinascervi altri moscioni più grossetti de' primi , e la loro nascita durò per tutto il dì 18. Il dì 25. riaperfi il vaso per lo spazio di 24. ore per vedere se altra generazione ne fosse avvenuta , e veramente il dì 6. di Agosto vi nacquero nuovi moscioni della razza di quei primi , che comparvero il settimo giorno di Luglio . Nel secondo vaso delle rose incarnate cominciarono a nascere i moscioni il dì 7. di Luglio durando per tutto il giorno seguente , ne mai più vi nacque altro .

Adi 12. di Maggio avendo messi de' fiori di Rosolaccio in un alberello di vetro aperto , e dopo quattro giorni serrato ; il dì 27. vi nacque un sol moscione : Ma il dì 15. di Giugno , ed il seguente vi nacquero molte mosche .

Il dì 14. di Maggio posti in vaso aperto fiori di Sonco aspro , e dopo cinque giorni serrato il vaso . Il dì 27. vi nacquero molti moscioni , ed intanto alcuni vermi attendevano a pascere , e pascendo ad ingrossare . Giunti al conveniente stato si fermarono , ed indurirono in Ninfe , ò Crisalidi . Il dì 10. di Giugno scapparono fuori alcune poche mosche , alcuni pochi moscioni , e moltissimi moscherini neri coll' antenne corte in testa ; e fino al dì 16. pur di Giugno continuarono ogni

Ogni giorno a vederfi nuove mosche , nuovi moscioni , e nuovi moscherini ; ma i tre giorni susseguenti comparvero solamente nuovi , e moltissimi moscherini .

Adi 16. di Maggio posti i fiori di Ligustro pestati in quattro vasi , due de' quali furono inaf-  
fiati con acqua , e dopo sei giorni serrati , non vi nacque mai cosa veruna , ancorchè ne' primi giorni le mosche vi posassero alcune poche delle loro uova .

Adi 6. di Giugno . Fiori di Arancio . Il dì 15. nati molti moscioni , ma molti più il giorno seguente . Il dì 29. cominciarono a scappar fuora le mosche , e continuarono per tutto il dì 4. di Luglio . Il medesimo giorno de' 4. nacquero moscherini con le antenne corte . Il dì 5. nati alcuni moscioni più grossi de' primi , che sono d' un altra razza , nati ancora altri moscherini con l' antenne corte , e altri con le antenne lunghe , e di queste due razze di moscherini , ne nacquero ogni giorno molti per fino a tutto il giorno decimo di Luglio .

Adi 14. Giugno , fiori di Gelsomini ordinari . Nacquero molti moscioni il dì 23. e continuarono a nascer ogni giorno fino a tutto il dì 28. Ma il 3. di Luglio fino all' 8. vi nacquero ogni giorno moscioni di quei più grossi ; e il dì 9.  
nacque

nacque una mosca, siccome ancora un'altra il dì 10. Il dì 11. nacque un moscione.

In altro alberello di Gelsomini pesti il dì 14. Giugno suddetto, nacquero moscioni il dì 23. e continuarono per tutto il dì 25. Il 3. di Luglio nacquero altri moscioni di quei più grossi, siccome i giorni seguenti fino al dì 12. Il dì 14. nati moscherini con l'antenne corte; siccome ancora il 17. il 18. e il 19. Nel qual giorno 19. oltre i moscherini nacquero parimente molti altri moscioni grossi. Il dì 20. molti altri moscherini, e moscioni grossi, ed i moscherini durarono a nascere ogni giorno fino a tutto il dì 26. Il dì 5. di Agosto, e il dì 6. di nuovo nacquero moscherini della stessa razza de' mentovati.

In altro alberello di vetro con Gelsomini pestati il dì 8. di Luglio, non nacque altro che un solo moscione il dì 19. Ed in altro alberello simile del suddetto 8. di Luglio, nacquero moltissimi moscioni pure ancora il dì 19. il dì 20. ed il 21.

In quei fiori, che in Firenze si chiamano Gelsomini del Gimè, pestati il dì 5. di Luglio, vi vidi sopra molte uova il dì 8., dalle quali nati i vermi, ne nacquero le mosche il dì 25. Ma il dì 4. di Agosto, si fecero vedere molti moscherini neri coll' antenne corte.

In

In altro vaso de' medefimi Gelsomini del Gimè, pestati il dì 9. di Luglio; il dì 19. del medesimo mese vi nacquero molti, e molti moscioni, e molti altri il dì 20. Il dì 29. una mosca, ed il 30. molte, e molt' altre; e vi nacquero parimente molti moscioni di quei grossi. Il 2. ed il 3. d'Agosto altre mosche; E in altro vaso pur de' 9. di Luglio di Gelsomini del Gimè. Il dì 28. e il dì 29. nati molti moscioni grossi. Il 30. altri moscioni simili, e quattro mosche. Il 31. altre mosche, e molti moscherini coll' antenne corte. Il 2. di Agosto un' altra mosca.

In altro vaso di Gelsomini del Gimè pestati il dì 26. di Luglio; La notte susseguente all' 11. di Agosto nacquero molte mosche. Il dì 12. due altre mosche. Il 14 tre altre.

In altro vaso pur del 26. di Luglio de' medefimi Gelsomini del Gimè, la medesima notte susseguente al dì 11. di Agosto nacquero due mosche. Il dì 15. nacquero due altre mosche.

In quattro vasi di Gelsomini di Catalogna, pestati il dì 6. di Luglio, non nacquero mai ne vermi, ne animali volanti.

In due altri vasi de' medefimi Gelsomini di Catalogna pestati il dì 21. di Luglio, vidi il giorno seguente molti piccoli vermi. Serrai i vasi con la carta, ma non vi nacque mai veru-

no animale volante, e i vermicciuoli si morirono.

In un altro vaso de' medesimi Gelsomini pestati il dì 6. di Agosto. Il dì 15. vi vidi alcune uova, ma non ne nacquero vermi, ne per conseguenza animaletti con l'ali.

In un altro vaso del dì suddetto con altri Gelsomini di Catalogna la mattina del dì 7. vi osservai moltissime uova, e infiniti minutissimi vermicciuoli, che non solamente vagavano sopra i Gelsomini, ma ancora su per le pareti del vaso di vetro. La sera del medesimo giorno si fermarono per le pareti del vaso senza muoversi, ed il dì 11. eran pur quivi fermi, e morti, e inariditi. Ne mai nacque alcuno animaluzzo con l'ali. Ed il simile per appunto avvenne in due altri alberelli, ne' quali lo stesso suddetto giorno de' 6. furon posti altri Gelsomini di Catalogna. Ed il simile parimente in quattro altri vasi, ne' quali rifeci la prova il dì 11. pur d' Agosto: In somma ne' vasi pieni di Gelsomini di Catalogna, a me non è mai accaduto, che i piccoli vermi sieno giunti alla loro perfezione di mostrarsi animali volanti.

Adi 17. di Giugno. Fiori di Ginestra. Il dì 7. di Luglio vi nacquero mosche ordinarie, e così il giorno seguente. Il dì 9. nati moscherini con l' antenne corte. Il dì 19. vi nacquero alcune mosche

mosche minori delle prime, e queste sono di una razza differente da quelle, ed il lor verme anch'esso è differente, imperocchè se il verme di quelle è in figura di cono, e per così dire, liscio, e fatto a anelli, il verme di queste piccole mosche è più schiacciato, e non liscio, e intorno intorno ha la pelle corredata di alcune punterelle a foggia di merletti: E questi son quegli stessi vermi delle mosche minori, de' quali feci menzione quando parlai de' Giacinti del dì 12. Marzo.

Adi detto, altri fiori di Ginestra. Il dì 7. di Luglio vi nacquero mosche ordinarie, e durarono a nascere dell' altre fino a tutto il dì seguente, e poscia non vi nacque mai nient' altro. Ma in due altri vasi de' medesimi fiori pestati il dì primo di Luglio vi vidi dell' uova, ma non ne nacque mai vermi, ne altri animali.

Adi 17. detto. Fiori latticinosi di Lattuga. Il dì 26. e il dì 27. nacquero molti moscioni. Il dì 8. e il dì 9. di Luglio nacquero altri moscioni di quei grossi. Il dì 10. e il dì 11. nacquero molte mosche.

Adi 18. di Giugno. Fiori di Viole garofane. Il dì sesto di Luglio nati moscioni di quei grossi. Il dì 7. nati altri moscioni simili, e molti moscherini con l' antenne lunghe in testa. Il dì 8. e il dì 11. un altro moscione. Il dì 12. e il dì 13.

una mosca per giorno ; e moltissimi moscherini di quegli , che anno l' antenne corte .

Adi 18. di Giugno suddetto . Fiori di Ciano Perfico odorosissimo volgarmente detti Ambrette . Il dì 11. di Luglio nate moltissime mosche . Il dì 12. niente . Il dì 14. , e il dì 15. nata una mosca per giorno . Rifatta la prova adi 26. di Luglio in quattro differenti vasi , non vidi mai nascer cosa veruna , eccetto che in un vaso , in cui nacquero due sole mosche il dì 15. di Agosto .

Adi detto . Fiori di Acacia . Il giorno diciannovesimo di Luglio , vi nacque una sola mosca , ne mai più vi nacque altro .

Adi 30. di Giugno . Fiori di Mortella messi in due vasi . Il dì 5. di Luglio vi vidi sopra alcune uova , ma non ne nacque mai niente . E niente altresì in un' altro vaso del medesimo giorno . Solamente in un grande orinal di vetro pieno de' medesimi fiori di Mortella non pestati vi nacquero moscherini con l' antenne corte , e di quegli ancora con l' antenne lunghe .

Adi 11. di Luglio . Fiori di Scarlattea . Non vi nacque mai altro , che un solo verme , e consequentemente una sola mosca piccola il giorno settimo di Agosto . Ma in un altro vaso con de' medesimi fiori non vi nacque mai nulla .

Adi 14. di Luglio . Sciamiti , ovvero Amari .  
ranti .



ranti. Il dì terzo di Agosto vi nacque una sola mosca ordinaria, e non altro. Ma in un' altro vaso, in cui pur riposi il dì suddetto 14. di Luglio de' fiori de' medesimi Amaranti, vi nacquero il dì 2. di Agosto moltissimi moscherini neri con l' antenne corte, e per cinque altri giorni seguenti ogni giorno ne nacquero moltissimi. Replicai la prova il primo giorno di Settembre in due altri vasi, ed in tutt' a due il dì 23. del medesimo mese nacquero moltissime mosche ordinarie. Per cinque giorni seguenti non vi nacque niente. Ma il dì 28. in tutt' a due i vasi vi nacquero moltissime di quelle mosche minori, che di sopra ho detto essere di una razza differente dall' ordinarie. E di queste stesse mosche ne vidi nascer sempre delle nuove ogni giorno fino a tutto il dì primo di Settembre.

Adi 14. di Luglio suddetto. Fiori di Anici in due vasi. Il dì 17. vi erano state depositate in tutt' a due i vasi moltissime uova; ma non ne nacque mai animale alcuno.

Adi 18. di Luglio. Fiori di Malva. In capo a poche ore vi furon fatte sopra molte uova. Il dì 21. eravi nato uno stuolo di vermi, i quali di giorno in giorno ingrossavano, ed il dì 26. erano più ingrossati, ed allungati, ma poi appoco appoco, tutti morirono, e marcirono, ne vi nacque mai nessuno animale alato.

Adi

Adi 21. di Agosto . Fiore indiano minore del Cefalpino ; Tanaceto Peruano del Cordo ; Tanaceto affricano di Altri ; Fiore affricano dello Svverzio , che in Firenze è chiamato Viola affricana minore vellutata . Quasi subito , che ebbi posto questo fiore in un vaso di vetro ; vidi subito , che vi si gettaron sopra delle mosche , e de' moscioni . Il dì 24. vi eran nati molti fortissimi vermi , che seguitarono a ingrossare fino alla giusta loro statura . La mattina del 12. Settembre nacquero molte mosche , e continuò a nascerne dell' altre fino a tutto il dì 14. E poscia non vi nacque più altro . Lo stesso avvenne con pochissima variazione in un altro alberello pur del dì 21. Agosto . Ma in altre simili Viole affricane minori vellutate messe in opera il dì 27. di Settembre vi furon bensì depositate dell' uova , ma non vi nacquero .

Adi primo di Settembre . Tanaceto affricano maggiore , Fiore indiano maggiore . Viola affricana maggiore . Il dì 2. vi vidi vermi , e uova . Il dì 8. ferrai il vaso . Il dì 14. vi nacque una gran moltitudine di moscioni , e una gran moltitudine ancora ogni giorno fino al dì 22. In un' altro alberello dopo aver continuato a nascer moscioni dal dì 15. fino al dì 19. da detto giorno 19. fino al dì 26. non vi nacque niente , ma il  
detto

detto di 26. cominciarono a nascervi moltissimi moscherini neri coll'antenne corte, e continuò la loro nascita per tutto il dì 28. In un terzo vaso pur del suddetto primo giorno di Settembre non vi nacque altro, che cinque, o sei moscioni il dì 15. Siccome poi in altro vaso de' 2. di Settembre nacquero solamente alcuni pochi moscioni.

Adi 12. di Settembre. Girasole, ovvero Fior del Sole Peruano, o Elitropio Peruano maggiore. Il dì 14. Ottobre vi nacquero le prime mosche. Ne' tre seguenti ne nacquero alcune altre poche.

Adi 27. di Settembre. Fiori di Colchico autunnale giallo in due alberelli. In tutt' a due il dì 29. le mosche vi fecero le loro uova, ma non ne nacque mai alcun verme.

Adi 23. di Ottobre. Orchis, o Testicolo minimo autunnale di fiore odorato. Non vi furon mai partorite uova, ne mai vi nacquero vermi, ne animaluzzi volanti.

Quali animalletti nascano sovra tutte le suddette sorte di fiori, e sovra altri ancora seccati all' ombra, e tenuti poscia in vasi aperti, e serrati lo riferirò nella Seconda Parte, dove mi viene più in acconcio. Ma dove sconsideratamente mi son lasciato trasportare? Torniamo alle

Chioc-

Chiocciolè, che io diceva avere il cuore così grande da poterfi scorgere senza l'aiuto del Microscopio; E diceva altresì, che i Lumaconi ignudi terrestri, e marini, e le stesse Chiocciolè terrestri col guscio anno gli strumenti della generazione, tanto ne' maschi, quanto ancora nelle femmine tutti fabbricati nello stesso modello. Forse i maschi, e le femmine delle Sanguisughe, o Mignatte anno la stessa somiglianza di strumenti; o per lo meno in tutte le Mignatte, che ho notomizzate, gli ho trovati tali, quali appunto gli ho fatti delineare nella Tav. decimaquarta Fig. nona. E se vi possano esser Mignatte, che gli modellino in altra foggia differente, non lo affermo, e non lo nego; ma solamente voglio dire, che non mi è accaduto il vederle. E quel che dico delle Sanguisughe di acqua dolce, lo dico altresì delle Sanguisughe di Mare, nelle quali ho sempre veduti similissimi gli arnesi, che si adoprano nel lavoro della generazione, ancorchè questi delle Sanguisughe marine sieno modellati molto differentemente da quegli delle Sanguisughe, che vivono nelle acque dolci; siccome differentemente son modellati i canali degli alimenti di queste due razze di animalletti acquatici. Tav. decimaquarta. Fig. ottava. Tav. vigesima. Fig. ottava. Ritorniamo a' Lombrichi terrestri, i quali, come

come accennai sono di una specie differente da queglii, che abitano nel corpo degli Vomini, e de' Brutti, ancorchè tutti sotto lo stesso genere sieno compresi.

I Lombrichi terrestri son di diverse fatte. Alcuni portano sul dorso poco lungi dalla testa una certa fascia rilevata a foggia similissima di una bardella senza l' arcione dinanzi. Altri non portano questa bardella. Tra queglii, che la portano, alcuni tondeggiano per tutta quanta la loro lunghezza tanto nel muso, che nella coda. Tav. decimaquinta Fig. terza. Alcuni ancorchè tondeggino nella lunghezza del muso, e del ventre, contuttociò anno la coda larga schiacciata, che termina in figura di foglia di Vliivo. Tav. decimaquinta Fig. prima, e seconda. Tra queglii, che non portano quella bardella, alcuni tondeggiano per tutta quanta la loro lunghezza, ed altri an la coda larga spianata, e fatta a foggia di una foglia di Vliivo. Tav. decimaquinta Fig. seconda, e tutte queste razze son lestissime, e vivissime al moto. Vi è la quinta razza di certi Lombriconi più torpidi, i quali sono grossissimi, come si può vedere Tav. decimaquinta Fig. prima, e non anno la bardella sul dorso, ne la coda a foglia di Vliiva; e quando si distendono, e si allungano arrivano alla lunghezza di più di un braccio; e questi non

M

assot-

assottigliano mai la coda a quella sottigliezza, alla quale arrivano tutte quante l'altre razze. Ve ne sono di alcune razze, che sempre si mantengono piccolissimi; di quelle che crescono, ed arrivano alla grossezza quasi del minor dito della mano di un uomo. Il colore esterno della pelle varia secondo la diversità delle terre, nelle quali abitano, e prendono l'alimento.

Quanto si appartiene all'interna fabbrica delle viscere, il canale degli alimenti lo trovo figurato in due modi. In quei Lombriconi grossi, e più torpidi degli altri della Tav. decimasesta, Fig. prima rassembra, che a prima vista abbia tre stomachi; Ma la verità si è, che quegli, che rassembrano stomachi, son tre fasce ritonde, rilevate, che in tre diversi luoghi cingono l'Esofago, e lo fortificano esternamente, e con espansioni tendinose si attaccano intorno intorno al petto, ed al dorso; e possono fare allungare, e scorcicare esso Esofago secondo il bisogno, e la volontà dell'animale Tav. decimasesta, Fig. seconda. Il secondo modo nel quale trovo figurato il canale degli alimenti, che è comune a tutte l'altre razze di Lombrichi terrestri, si è un lungo Esofago, che termina in un concavo, che è lo stomaco fatto a foggia di un cuore di pareti molto, e molto più grosse, e dure di quel, che sieno le tuniche  
di

di esso Esofago, e le tuniche altresì dell' intestino, il quale intestino continuato allo stomaco camminando a linea retta d'ogni intorno attaccato, e stretto dagli spazi de' muscoli circolari, che lo fanno apparire increspato, e fatto a celle, come si è l' intestino Colon, giugne a sboccare nel mezzo mezzo dell' ultima, e più sottil punta della coda Tav. decimaquinta, Fig. quarta, diversamente dall' intestino de' Lombrichi degli animali, che sbocca fuor del ventre poco prima, che arrivi all' ultimo della coda. Ma quell' intestino di tutti i Lombrichi terrestri è sempre pieno pienuissimo da capo a piede di un fior di terra sottilissima, ed impalpabile, che è il solo cibo, di che si pascono questi animaletti, senza toccar mai le radici, l' erbe, e gli altri frutti della terra; onde ottimamente *Plauto Cas. At. primo.*

*Post autem nisi ruri ervum tu comederis*

*Aus, quasi Lumbricus, terram.*

Non sono forse soli i Lombrichi terrestri a nutrirsi di questo elemento, imperocchè ho osservato, che quegli Insetti Marini vaganti per i fondi del Mare, che Priapi marini si appellano, anno soventemente piene tutte le loro lunghissime budella di sola minutissima arena. Ho osservato parimente, che le Folaghe tengono sempremai pieno zeppo il ventricchio di bianche minutissime pie-

truzzoline peccò più grosse della rena medesima ; tra le quali pietruzzoline talvolta vi si trova qualche filo di erba , o qualche piccola fogliuccia ; Il che forse a prima vista parrebbe , che potesse rinfrancar l' opinione del Chiarissimo *Gio: Alfonso Borelli* , il quale nel secondo Tomo de' *Libri del moto degli Animali* alla Proposizione 192. affermò , alcuni animali poterfi forse nutrire di sola terra arenosa , e nella Proposizione 194. poterfi sospettare , se gli uccelli prendano le pietruzze per cagione di alimento . Veggasi il mio Libro delle *Esperienze intorno a diverse cose naturali* , stampato in Firenze l' Anno 1671. in quarto . Ma il Borelli parlava sempre , e scrivea da quel grande , e savio uomo , che veramente egli era ; e però non disse assertivamente , che gli uccelli prendessero le pietruzze per cagione di nutrimento ; ma solamente lo accennò come per un suo sospetto . Ed in vero potrei scrivere di essermi accertato , che quelle pietruzzole inghiottite dagli uccelli non conferiscono alla loro nutrizione : Imperocchè in tempo di Verno rinchiusi in una gabbia un cappone senza dargli mai ne da mangiare , ne da bere , e passati , che furono cinque giorni interi si morì ; siccome altri capponi tenuti pur senza mangiare , e senza bere non vissero più che sette , otto , e nove giorni ; e pure aperti i lo-



ro ventrigli, vi trovai in tutti una considerabile quantità di pietruzzole, che aveano inghiottite prima, che fossero rinchiusi, ed in tempo di così gran bisogno non si erano consumate, ne passate in nutrimento. Ritentai la prova in un altro cappone, ed a questo somministrai continuamente acqua da poter bere, e nella cassetta della gabbia misi molte pietruzze numerate, acciòchè, se vinto dalla fame volesse cibarsene, potesse farlo a suo piacimento; Ma egli non le toccò mai, ancorchè ne' primi giorni della prigionia non facesse altro che bere ingordissimamente, e con frequenza. Quattro giorni prima della sua morte allentò grandemente il bere, e finalmente passato il ventesimo giorno si morì. Ed un' altro cappone tenuto in chiusa con la medesima libertà di poter bere arrivò a vivere ventiquattro giorni: Ed io dopo la lor morte ne' ventrigli di tutt' a due trovai le solite pietre, conforme le avea trovate ne' primi; e conforme le ho trovate ne' ventrigli di alcuni Colombacci, che dopo aver campato senza cibo, e senza bevanda chi dodici, e chi tredici giornate intere finalmente si morirono. Vn Aquila reale campò ventotto giorni senza mangiare; un' altr' Aquila simile in tempo del Sollione ne campò ventuno. Ventuno ne campò parimente un Avoltoio. Diciotto un Bozzagro,

ed

ed altrettanto una Albanella : E pure l' Aquila , l' Avoltoio , il Bozzagro , e l' Albanella , e tutti gli altri simili uccelli di rapina non costumano d' inghiottir volontariamente le pietruzzole , siccome non le inghiottiscono molti altri uccelli , che non anno corredato il ventriglio di quei muscoli così grossi , e così forti , che si vedono ne' ventrigli de' Capponi , de' Fagiani , dell' Oche , dell' Anatre , de' Cigni , delle Grue , e di altri uccelli , che sogliono soventemente beccare i sassolini . Gli animali non muoino così prestamente per cagione del digiuno come crede il volgo : Tra' cani , che ho fatti morir di fame vi sono stati di quegli , che senza mangiare , e senza bere son campati trentaquattro , e trentasei giorni . Vn piccolo cagniuolo ne' giorni più caldi della State arrivò fino a venticinque giorni senza bere , e senza mangiare , e molto più oltre sarebbe trascorso , se spinto dal gran rovello della fame non fosse saltato da un' altissima finestra . Vn gatto del Zibetto , che lena odorifera fu chiamato da Pietro Castello Messinese , indugiò a morire dieci giorni , e un grossissimo gatto salvatico ne indugiò venti . Venti giorni mi campò una Gazzella . Vn Tassio in tempo di verno campò un mese intero . I Topi domestici , e campagnuoli possono poco soffrir la fame ; imperocchè in molte prove , che ne ho fatte,

te, non son mai arrivati a tre giorni interi senza mangiare. Pel contrario le Tartarughe terrestri le ho condotte fino in diciotto mesi: Le Vipere fino in dieci; E come ho detto di sopra, un Lucertolone affricano campò più di otto mesi senza voler mai assaggiare veruna sorta di cibo. Ma queste tre ultime razze di animali sogliono per lo più naturalmente nell' Inverno o non cibarsi, o prendere scassissimo, e radissimo il nutrimento. Negli altri animali giova molto la robustezza, e l' età per poter lungamente soffrir la fame. Ma in molte generazioni d' insetti è naturalezza. Non è immaginabile quanto si trovino belle le viscere degli animali fatti morir di fame; il che dovrebbe servire per insegnamento, che la dieta ben regolata è la più sicura medicina per rimettere in sesto le viscere degli uomini, e per istasare gl' intrigatissimi canali, e andirivieni de' loro corpi.

Io diceva di sopra, che l' intestino di tutti i Lombrichi terrestri, per tutta la sua lunghezza è pieno di terra. Sdrucito quest' intestino dal podice infino allo stomaco, e ben ripulito da quella terra, si trova, nella cavità di esso intestino, un altro grosso canale, che vi serpeggia quasi per tutta la sua lunghezza, come se fosse un intestino dentro ad un altro intestino: Ho detto, quasi

quasi per tutta la sua lunghezza ; imperocchè non iscorre, come dice il VVillis, *toto ductu scilicet a cauda usque ad ventriculum* ; imperocchè quella estremità di questo canale , che giù per l' intestino va verso il podice , termina dentro alla cavità di esso intestino , in lontananza di quattro buone dita trauerse dall' apertura del podice , e poscia , sommamente assottigliandosi , fora la tunica del medesimo intestino , e cammina alla volta del podice fra la tunica mentovata , & il dorso ; siccome l' altra estremità superiore , quando è arrivata ne' contorni dello stomaco , ne fora la tunica , e passa esternamente alla volta della testa con una somma sottigliezza di canale . Non tutti i Lombrichi lo anno figurato nella stessa maniera : imperocchè ne' Lombrichi con la coda a foglia di Vliua per tutta quanta la cavità dell' intestino conserva quasi una simil grossezza ; e dallo stomaco fino a mezzo l' intestino sembra esternamente di pareti lisce , ma il restante sembra rugoso di rughe minutissime trasversali . Tav. decimaquinta , Fig. quinta . Pel contrario ne' Lombrichi di coda ritonda , e che non anno la bardella sul dorso , in vicinanza dello stomaco apparisce grossissimo , e tutto intagliato a strisce longitudinali fino al mezzo del suo corso ; ma poscia grandemente assottiglia , e svaniscono quelle strisce ,

isce, le quali strisce son veramente altrettanti canali, che imboccano tutti in questo canal più sottile. Vedi la Tav. decimasesta, Fig. terza. E tanto basti intorno al canale degli alimenti: solamente soggiugnerò, che nelle Lamprede si trova un quasi simil canale, che cammina, e scorre per tutta la lunghezza dell' interna cavità dell' intestino; e questo canale delle Lamprede non è altro, che una vena, che nata nel fegato, fora l' intestino là dove egli si accosta al fegato, e accompagna nello entrarvi da una glanduletta rotonda, e da una valvula, scorre per l' interna lunghezza dell' intestino; e verso il podice, forando di nuovo la di lui tunica, ne scappa fuori, e va ad imboccare in una grossa arteria, che serpeggia per tutta la lunghezza del ventre della Lampreda.

I Lombrichi, ne quali si veggono quei globi bianchi osservati dal *Villis* intorno al cuore, ne anno quattordici, cioè sette per banda situati in linea retta, lungo il petto, e questi sono i più piccoli, e non maggiori de' granelli di panico, pieni di un liquor bianco simile al latte. Oltre questi quattordici globi anno otto altri globi, o sacchetti più vicini al cuore molto più grossi delle vecce tutti pieni di materia latticinoso bianchissima, tra la quale si scorgono molte minute

N

nova

uova ritonde . Sei di questi sacchetti son figurati come fiaschette col collo strozzatoio ritorto , o diritto secondo le positure , Tav. decimaquinta , Fig. sesta . Gli altri due più vicini allo stomaco sono un poco maggioretti , e di figura alquanto diversa , come si vede nella medesima Tav. decimaquinta , Fig. sesta . Ne si dee dire sbaglio del *VVillis* primo osservatore , se nel primo Libro *de Anima Brutorum* Cap. 3. affermò due soli essere i globi , o sacchetti , che contengono l' uova , e ne mostrò la figura nella Tav. quarta , Fig. prima ; imperocchè talvolta avviene , che niuno di questi sacchetti abbia in se racchiuse l' uova , ma solamente contenga materia latticinosa . Talvolta un solo sacchetto , o due , anno l' uova , e gli altri ne son privi , o se non ne sono totalmente privi , ne anno così poche , che non così alla prima si scorgono tra quella materia latticinosa . Talvolta poi tutti a otto son così pieni di uova , che nel fine di Marzo , per tutto Aprile , e nel principio di Maggio ne ho trovate sedici , diciotto , venti , venticinque per ogni sacchetto . E non solamente ne son pieni , ma di più si trovano alcune uova sciolte intorno ad essi sacchetti , e giù per la cavità del ventre , ma più d' ogni altro luogo , nella estremità della coda intorno a' fianchi dell' intestino ; le quali uova escono poscia

poscia per forami aperti sull' orlo del podice , e sovente ve ne ho contate fino in dugento , essendosene totalmente scaricati tutti i sacchetti , i quali sacchetti in quello stato , rimangono pieni di una certa spuma bianca , simile alla chiara d' uovo sbattuta , o alla saponata . Non però in tutte quante le sorte de' Lombrichi mentovate di sopra si trovano tali sacchetti pieni di uova figurati , e situati nella maniera , e nella quantità suddetta : io gli ho trovati solamente in tutti quei Lombrichi , che anno la coda fatta in foggia di foglia di Vlivo figurati nella Tav. decimaquinta , Fig. prima , e seconda . Gli altri Lombrichi non anno ne quei quattordici globetti bianchi , ne gli altri otto sacchetti pieni di uova ; anno bensì intorno all' Esofago , ed intorno al cuore alcuni pochi , e piccoli corpicciuoli bianchi pieni di materia come latticinosa , ne' quali non ho mai trovato l' uova , e particolarmente in quei grossissimi Lombriconi più torpidi , che nella Tav. decimaesta son rappresentati alla Fig. prima , i quali per tutta quanta la coda sono internamente serpeggiati da molti canaletti trasparenti , e pieni di limpidissima acqua .

Intorno a que' sacchetti pieni d' uova si aggira con vari intrighi , ed avvolgimenti un grosso canale pieno di sangue , che a prima vista sembra



come varicoso per le frequenti appiccature, e cammina attaccato sopra tutta la lunghezza dell'intestino fino alla coda.

Nel considerare così fatte, e tediose minuzie mi venne in pensiero di far qualche esperienza intorno a' Lombrichi terrestri, per rinvenir quali sieno le cose nocive, e facili a cagionar loro la morte, per poter poscia farne l'applicazione a' Lombrichi del corpo umano, ed accertarmi almeno per barlume, e per conghietture, se veramente quei medicamenti, che da' Medici si adoperano, sieno valevoli ad ammazzargli; e se alcuni cibi possan promoverne la generazione, conforme da essi Medici comunemente si crede.

I. Nel mese di Marzo unsi ben bene diversi fogli con olio controveleni della Fonderia del Sereniss. Granduca: Altri ne unsi con olio da Bachi della medesima Fonderia: Altri con olio da Bachi de' Monaci Cassinensi della Badia di Firenze. Quando i fogli ebbero succiato tutto l'olio, e che si erano rasciutti, ne feci tanti cartocci, ed in ogni cartoccio rinchiusi quattro Lombrichi, e in capo a cinquant' ore in circa gli trovai tutti morti; ma perchè nello stesso spazio di tempo trovai morti altri Lombrichi ferrati in cartocci di semplice carta non unta con quegli oli medicinali; perciò pensai esser necessario far l'Esperienza per altri  
verfi



versi , giacchè l'asciuttezza della carta , conforme per altre prove poscia mi accorsi , cooperava molto alla morte de' Lombrichi .

2. Co' sopradetti tre oli unsi gentilmente alcuni vasi di vetro , in modo però che l'olio non colasse nel fondo . Misi quattro Lombrichi in ciascuno di essi , aggiugnendovi di quella terra grassa , nella quale i Lombrichi erano stati trovati ; e ferrai benbene i vasi con carta ben unta con quei medesimi oli . La verità si è , che vi camparono quindici giorni , e più ancora farebbono campati , se più ve gli avessi lasciati dimorare . Molte altre volte ne ho rifatta la prova , e mai non ne è morto , ne pur uno . Or qui si consideri , che utilità può portare l'ugner tutto giorno il naso , le tempie , la fontanella della gola , il lato sinistro del petto , e l'ombelico , anzi tutto il ventre inferiore de' fanciulli a fine di ammazzare i Lombrichi , che vivono nel loro stomaco , e ne' loro intestini . La ragione per la quale aggiunsi quella terra si è , perchè i Lombrichi temono fortemente dell'asciutto , ed a tenergli in vaso di vetro senza punto di umido prestamente si muoiono , e non ve n'è alcuno , che arrivi vivo alla fine del terzo giorno , o poco più : oltrechè senza terra farebbono privi del necessario alimento .

3. Unsi

3. Vnfi quattro Lombrichi con olio contro Veleni ; quattr' altri gli vnfi con olio da Bachi , e quattro con quello de' Monaci Cassinensi , e subito unti gli riposi in vasi di vetro separati , che pur erano unti co' medesimi oli ; e vi aggiunsi la necessaria quantità di terra , e di più spruzzai sopra la medesima terra alcune gocciole di quegli oli . In capo a ventiquattr' ore non ne era morto veruno ; onde di nuovo vi spruzzai altre gocciole de' medesimi oli . E pur di nuovo il giorno seguente eran tutti vivi , e di nuovo vi lasciai cadere sopra altre gocciole , procurando sempre , che qualche gocciola toccasse quei vermi , i quali non vollero mai morire ; ancorchè dopo queste reiterate unzioni continuassero a star chiusi in que' vasi per lo spazio di quindici giorni , e che nel duodecimo giorno di nuovo io colassi in ogni vaso , dodici , e quindici gocciole di olio . La stessa esperienza , e nella stessa maniera per appunto la rifeci con olio d' Ipericon delle spezierie preparato , e tinto con replicate infusioni de' fiori del medesimo Ipericon ; E l' Esperienza ebbe lo stesso avvenimento di quella , tentata co' sovraddetti tre oli . E pure quel *Paracelso* , che da molti è tanto stimato , e riverito , nel suo *Libro de' Lombrichi* , volle con lo scriverlo dar a credere , che l' Ipericon sia un potentissimo medicamento contra

tra i Lombrichi ; anzi , che applicato eternamente sopra 'l ventre inferiore faccia loro mutar luogo , e fuggire . Ma con qual' occhiale si vede tal mutazione di luogo , e tal fuga nella riposta cavità degl' intestini ? Chi è quel Linceo , che con l' acutezza della vista possa arrivar colà entro ? Baie , Baie , per non dir ciurmerie . Ma che ! queste delle applicazioni esterne sono almeno baie per lo più innocenti , e non vagliono per lo più a far danno . Più criminali son quelle de' medicamenti , che si fanno prender per bocca .

4. Coll' olio di Vlive unsi , e riunsi quattro Lombrichi , e così unti gli ferrai in vaso di vetro con quella stessa terra , della quale soglion nutrirsi , e vi dimorarono vivi più di quindici giorni . In due vasi di vetro pieni d' olio , immerfi due Lombrichi grossi , e vi dimorarono ventiquattr' ore senza morirvi , ancorchè pareffero molto acquacchiati . Gli trassi fuor di quell' olio , e gli lasciai liberi in vaso pieno di terra umida , dove uno di essi morì nel terzo giorno , e l' altro arrivò vivo fino al sesto , ancorchè sempre apparisse torpido , e mal-vivo : Nulladimeno si vede , che sebbene l' olio è dannoso a' Lombrichi , contuttociò non è loro quel potentissimo , e subitaneo nimico , che suole veramente essere a molte , e molte altre sorte d' Insetti , come sono le Mosche ,  
le Ve-

le Vespe , le Pecchie , gli Scorpioni , i Grilli cantatori , le Grillotalpe , o Talpe dell' Imperato , che da noi Toscani son chiamate Zuccaiuole , i Lumaconi ignudi , i Vermi da seta , tutte le razze di Bruchi , le Scolopendre marine , le Migniate , o Sanguisughe , e molte , e molte altre generazioni di simili animaletti , a' quali , per qual cagione , l'olio sia nimico tanto mortale , veggasi il dottissimo , ed oculatissimo *Marcello Malpighi* nella sua famosa *Dissertazione de' Vermi da seta* a carte 30. della Edizione di Londra del 1669.

5. Posi della terra umida in vaso di vetro , v' incorporai un poco di Triaca , e vi posai quattro Lombrichi , i quali si cacciarono subito sotto di essa terra . In capo a ventiquattr' ore non eran morti . Vi aggiunsi un altro poco di Triaca , e continuai ad aggiugnervene ogni giorno un poco fino al quarto ; ma i Lombrichi si mantennero sempre vivi , e lesti . La stessa Esperienza si verifica parimente coll' Orvietano , e col Mitridato per molte prove , che ne ho fatte . Or se questo è vero , come è verissimo , qual gioventamento può portare a' fanciulli il far prender loro , a furia di cessate , e di strapazzi , una piccola porzioncella , o di olio controveleni , o di Triaca , o di Mitridato , o di Orvietano ? Ma se questo non può giovare , tanto meno gioveranno quegli

quegli impiastri di Triaca , che si applicano al cuore , ed all' ombelico . Io non voglio già negare , che a fare una poltiglia di Triaca , o di Mitridato , o di Orvietano stemperata con un tantin d'acqua , o di vino , i Lombrichi messivi non se ne muoiano prestamente . Ma come è egli possibile far prender per bocca tanta quantità di Triaca , che i vermi dello stomaco , e degli Intestini vi si possano impantanar dentro ? Ma su : sia possibile il trangugiarla , il danno , che farà la Triaca , e l' Mitridato , e l' Orvietano , non sarà egli maggiore dell' utile di ammazzar quattro bachi ? Ma concesso , che non possa nascerne detrimento alla Sanità , son costretto a dire , che se i Lombrichi muoiono nella poltiglia della Triaca , e del Mitridato , e dell' Orvietano , non vi muoiono per la virtù della Triaca , ma bensì vi muoiono per cagione del mele , che così largamente entra nella composizione della Triaca , e di quegli altri due Lattovari , conforme io mi dichiarerò meglio in altre seguenti esperienze .

6. Ho tenuti i Lombrichi a nuotare nell'acqua comune in vasi di vetro . Vi sono vissuti sedici , diciotto , e venti giornate senza mangiare ; Dopo l'qual tempo cavati dall' acqua , e messi fra la terra anno ricominciato a mangiare , e di bianchi , che erano divenuti nell'acqua , anno ripre-

O

so il

so il color pristino senza mostrar segno di voler morire. S' ingannò *Tommaso Museto* quando nel secondo Libro Cap. 42. del suo Teatro degl' Insetti volle scrivere. *Sicut Lumbrici terrestres in aqua haud diu vivunt, ita etiam aquatici in arida positi cito intereunt.*

7. Stemperai nell' acqua comune una giusta quantità di Aloè soccotrino polverizzato in modo, che l' acqua ne divenisse tinta, e amarissima. In questa tintura misi quattro Lombrichi, i quali parve subito che se ne sbalordissero, ma la verità si è, che vi si mantennero vivi ventiquattr' ore, ed in questo tempo uno di essi quattro cominciò a sbucciarsi della cuticola, principiando dalla coda, ed arrivando quasi fino a mezzo del dorso, e del ventre, dove la buccia si raggruppò a foggia di un cercine intorno intorno avvolto. Passate ventiquattr' ore, cavai dall' acqua, amara i quattro Lombrichi, e gli misi in vaso di vetro tra la terra umida aggiuntovi qualche piccola porzioncella di Aloè polverizzato, e vi camparono vivi molti, e molti giorni. Reiterai la prova nella stessa tintura con quattro Lombrichi. Per tre giorni interi non vi morirono; ma in capo al quarto giorno gli trovai tutti morti. Come dunque si ha da credere, che l' Aloè sia quel potentissimo, e presentaneo ammazzatore  
de'

de' Lombrichi, come lo celebrano gli Scrittori? Se i Lombrichi, con lo stare infusi nella sua amarissima tintura, indugiano quattro giorni a morirvi, come può esser vero, che la lor morte ne' corpi umani provvenga dallo impiastrare il bellico con Aloè incorporato con fiele di Bue, e con aceto? Se l' Aloè cotanto amaro è così poco efficace, come potranno essere valorose le foglie verdi di Pesco peste, ed impiastrate con aceto sul ventre?

8. *Dioscoride* nel Cap. 101. del secondo Libro vuole, che' la decozione amara de' Lupini contratta, e con pepe cacci i vermi fuor del corpo; e che la stessa utilità si ricavi dal mangiare i medesimi Lupini amari stati infusi, e rinvenuti nell' acqua; e dal lambire, o bere la loro farina mescolata col mele. Io so di certo, che i Lombrichi terrestri tenuti nella decozione amarissima de' medesimi Lupini vi campano molti giorni.

9. Vaglia però il vero in una forte bollitura amarissima di Assenzio talora vi son morti in vent' ore, altre volte in ventiquattro, ed altre volte anno indugiato fino a trenta. Di più auendo stemperata un poca di terra con la suddetta bollitura, e ridottola in foggia di una tenera, e lunga melmetta, tutti i Lombrichi, che vi furono messi, morirono in trent' ore. Talvolta nelle bolli-

ture più leggieri , e nelle semplici infusioni vi son vissuti fino in quarantott' ore .

10. Di quel seme , che Semenzina , ò Seme santo appellasi nelle Spezierie , ne feci una buona , e piena infusione nell' acqua comune calda , e per due ore la tenni a bagno maria , e quando ella fu poi ben fredda , senza cavarne quel seme vi misi quattro Lombrichi , i quali in sett' ore vi morirono . Innacquai quell' infusione con altrettanta acqua comune , e mettendovi quattro altri Lombrichi , vi morirono in ott' ore . Vi è dunque qualche ragione , che la Semenzina confettata con Zucchero sia frequentemente usata nelle Spezierie per darla a i fanciulli travagliati da' vermi .

11. Infusi nell' acqua comune alcuni pezzettini di Agarico , ed un' ora dopo , senza levar l' Agarico , vi aggiunsi quattro Lombrichi , i quali in trentasei ore vi morirono .

12. In una piena infusione di Rabarbaro polverizzato fatta in acqua comune , e ben colata , e spremuta , misi a nuoto quattro Lombrichi , e vi morirono in venti ore ; siccome in trentasei ore morirono altri messi in quella stessa infusione , ma però innacquata con altrettanta acqua pura . In quella prima infusione non innacquata , dopo che pel corso di dodici ore vi ebbero dimorato quattro Lombrichi , gli trassi fuori , e diedi loro libertà



libertà in un vaso di vetro pieno di terra, dove continuaron a vivere molti, e molti giorni.

13. Avendo tenuto per dieci ore infuso in acqua comune fredda un pemo di *Coloquintida*, colai l'infusione, che era amarissima, e vi misi quattro *Lombrichi*. Morirono tutti nel termine di quattordici ore. Nella medesima infusione, temperata con altrettanta acqua, certi altri *Lombrichi* vi morirono in ventiquattr' ore. Alcuni, che erano stati immersi due ore in quella infusione essendone cavati, e messi fra la terra, vi durarono vivi dieci giorni, e di passo.

14. Feci infusione di tre dramme di foglie di *Sena* in tre once di acqua comune alle ceneri calde: la colai, e la colatura raffreddata la versai sopra quattro *Lombrichi*, che stavano in un vaso di vetro, dove morirono tutti nel termine di quindici ore.

15. Avendo fatta una buona, e lunga infusione di *Corallina* in acqua comune a bagnomaria, raffreddata che fu, senza cavarne la *Corallina*, vi misi dentro quattro *Lombrichi*, i quali indugiarono a morirvi fino al settimo giorno. Come si puol egli credere al *Mattiolo*, ed a tanti, e tanti altri Scrittori di Medicina, che affermano con certa esperienza, la *Corallina* esser valorosissima contro i vermi de' fanciulli?

16. In

16. In un vaso di vetro posi una mezz' oncia di pepe polverizzato , e stemperatolo con sei once di acqua comune , v' immerfi quattro Lombrichi de' più grossi ; e morirono tutt' a quattro in meno di mezz' ora , lasciando nel fondo del vaso una gran mocciaia . Morti che furono e cavati del vaso , a quella stessa acqua impepata aggiunsi sei altre once di acqua pura , e messovi a nuoto quattro altri Lombrichi , morirono in capo a tre ore : Scolai otto once di quell' acqua , ed in sua vece aggiunsi otto once di acqua pura , ed i Lombrichi , che vi immerfi morirono in tre ore . Siccome vi morirono in quattr' ore altri Lombrichi , dopo avere decantate di bel nuovo altre otto once di acqua impepata , e rimessavi otto once di acqua pura . Decantai tutta l' acqua del vaso versandola in un altro vaso di vetro , ed in quest' acqua decantata , senza che in fondo avesse la poltiglia del pepe pesto , i Lombrichi vi morirono in dodici ore . Ma una grossissima Cavalletta vi morì subito , che ve l' ebbi tuffata .

17. In un alberello di vetro poste due dramme ben polverizzate , e passate per istaccio di quel famoso Febbrifugo Americano , che chiamasi China china , ci versai quattr' once di acqua comune , e due ore dopo v' immerfi quattro Lombrichi , i quali vi morirono in quarantasei ore .

18. Feci sfregar benbene tutta l' interna cavità di un vaso di terra con spicchi di aglio , e lasciati i medesimi spicchi infranti nel fondo del medesimo vaso vi posi sei Lombrichi , tre grandi , e tre piccoli . Parve subito , che da quell' odore , e dal toccamento di quegli agli , i Lombrichi ne patissero , e ne rimanessero sbalorditi , e mogi . Gli ricorperfi poscia di terra grassa , acciocchè potessero nutrirsi , e fra quella terra feci mescolare alcuni altri spicchi di aglio minutamente tritati , ed i Lombrichi , tanto i grossi quanto i piccoli , vi si conservarono vivi una ventina di giorni ; e più ancora vi si sarebbono mantenuti , se più lungo tempo io ve gli avessi lasciati stare .

19. Stemperai del Mele di Spagna in un poco d' acqua comune ; e messovi quattro Lombrichi , vi morirono tutti in un terzo di ora . Ne rifeci molte volte la prova , e sempre tornò a capello , con lo svario solamente d' un mezzo ottavo d' ora prima , o poi . Or come può esser vera quella opinione tanto comune , e cotanto creduta infallibile , che le cose dolci non solo non ammazzino i vermi , ma che di più sieno cagione della lor generazione , e de' loro tripudi , e gavazzamenti ? Or non è egli più facile , e più sicuro a' fanciulli infestati da' vermini il dar da bere una dolce , e grata bevanda di acqua melata , che tanti ,  
e tanti

e tanti altri amari, ed ostichissimi beveroni proposti da gli Autori di Medicina?

20. Sciolsi una considerabile quantità di Zucchero raffinato nell' acqua comune, e v' immerfi quattro Lombrichi; I due minori morirono in poco più tempo di un ora. I due più grossi indugiarono due ore. Aggiunsi a quell' acqua inzuccherata altrettanta di acqua pura, e in due ore i Lombrichi vi morirono tutti. A quell' acqua inzuccherata, ed inacquata aggiunsi di nuovo altrettanta acqua pura; ed i Lombrichi vi morirono nello spazio di sette ore. Reiterai queste esperienze col Zucchero rottame, e tornarono tutte a capello con pochissimo svaro. Or non sarebbe egli un gentil rimedio a' poveri fanciulli assetati, ed afflitti da' vermi, dar da bere di belle giare di acqua semplicemente raddolcita col Zucchero? o di acqua cedrata dolcissima, e odorosissima? Ho nominato la cedrata perchè, i Lombrichi messi a guazzare nell' acqua di scorze di Cedrato stillata a stufa in due ore vi muoiono: E di più si osservi, che nella pietra, dove si lavora il Cioccolato feci macinare una buona quantità di scorza gialla de' Cedrati freschi separata totalmente dal bianco, e ridotta che fu impalpabile, ne ricopersi grossamente il fondo di un alherello di vetro, e poscia vi posai sopra quattro Lom-

Lombrichi, che cominciarono subito fortemente a divincolarsi, ed a scontrarsi, segno manifesto, che il giacere in quella poltiglia non era di lor gusto. Dopo di che misi loro addosso un'altra poca di quella poltiglia; ed i Lombrichi in meno di un ora si morirono tutti, siccome altresì morirono tutti alcuni altri, che vi posi, reiterando l'esperienza per aver' indubitata certezza dello evento. Il Zucchero è così potente nimico de' Lombrichi, che se si metterà in vaso di vetro uno di essi Lombrichi, e s'impolvererà benbene con Zucchero fine polverizzato in modo, che possa rivoltarvisi sopra, si vedrà morire in pochi momenti. In pochi momenti ancora muoiono col Zucchero polverizzato quegl' Insetti di Mare, che Scolopendre marine si appellano; ma nell'acqua inzuccherata non vi muoiono con quella velocità, con la quale soglion morirvi i Lombrichi terrestri. Infìn le Mignatte, o Sanguisughe temono l'acqua inzuccherata, che le fa morire in poco più di ventiquattr' ore.

21. Mescolai due once di Siropo violato solutivo con due once di acqua comune; e quattro Lombrichi vi morirono in meno di un quarto d'ora. Vi aggiunsi quattr' once di acqua; ed i Lombrichi vi morirono in pochissimo più di tempo, che i primi. Aggiunsi di nuovo ugual quan-

tità di acqua , e pur i Lombrichi vi morirono in poco più di due terzi di ora . E di nuovo aggiuntavi nuova acqua , indugiarono altri Lombrichi a morirvi più di quattr' ore . Anno molta ragione i Medici per estermiare i vermi de' fanciulli , a costumar frequentemente il Siroppo di Cicoria composto ; Imperocchè e' può valorosamente farlo non solo perchè è composto col Zucchero , ma perchè ancora nella sua composizione entra il Rabarbaro . Vi sono però molti Giulebbi più gentili , e più grati al gusto , che posson produrre con ugual facilità lo estermio de' vermini , come sarebbe il Giulebbo di mele appie , il Giulebbo di fior d' Aranci , il Giulebbo di Gelsomini , quello di fiori di Borrana , di scorze di Cedrato , di agro di Cedro , ed altri simili , che in vece di essere aborriti da' fanciulli , possono essere golosamente da loro desiderati .

22. In una determinata quantità di acqua comune riscaldata al fuoco , e quasi bollente sciolfi quanto sal comune delle Saline di Volterra vi si può naturalmente sciogliere , finchè il Sale rimanesse sotto l' acqua nel fondo del vaso non liquefatto . Colai l' acqua , e lasciatala freddare , osservai , che i Lombrichi vi morivano in pochi momenti . Temperai quest' acqua salata con altrettanta acqua pura , ed i Lombrichi vi morirono

no momentaneamente come i primi. In un quarto d'ora vi morirono altri Lombrichi, ancorchè di nuovo con altra acqua comune avessi temperata quella salata. Ed avendola di nuovo temperata, e sempre con ugual quantità di acqua comune, i Lombrichi vi morirono in due ore. Ne rifeci l'esperienza più volte non solamente con quel sale di Volterra, ma ancora col sale fossile di Etiopia, e col sale pur fossile delle miniere di Vilisca ne' contorni di Cracovia in Polonia, e sempre avvenne la morte con le stesse velocità accennate. E con le stesse velocità vi muoiono le Scolopendre marine, che pur sono avvezze naturalmente a dimorare nell'acqua falsa del Mare. Vi muoiono altresì velocemente i Lumaconi ignudi; e le Mignatte Sanguisughe; ma le Mignatte appena toccano quell'acqua, che subito gittan per bocca quanto sangue anno in corpo, e dopo alcuni pochi guizzi intirizzate si muoiono, e rimangono in quell'acqua galleggianti. E cosa nota, che i Chirurghi, quando voglion far vomitar alle Mignatte quel sangue, che dalle vene emorroidali succiarono, le impolverano di sale. Di qui si può facilmente conietturare di quanto profitto a coloro, che patiscono di vermini, possian essere le acque del Tettuccio, e del Bagnuolo, le quali, oltre il poter ammazzare i vermini, gli portano

ancora con la loro corrente fuor del corpo. Questi motivi di speculazione riescono molto facilmente verificati in pratica, ed io posso sinceramente affermarlo per molte esperienze, che ho vedute con essa acqua del Tettuccio, e del Bagno.

23. Le suddette prove fatte col sal comune, col sal fossile di Etiopia, e col sale pur fossile delle miniere di Vilisca le rifeci col Salgemma, col Vitriuolo di Cipri, e con l' Allume di Rocca; e tutte riuscirono come quelle. Il più possente è il Salgemma, ed ugualissimo al sal comune; dopo del Salgemma è il Vitriuolo, e dopo del Vitriuolo è lo Allume di Rocca. Il salnitro pareggia la forza anch' egli del sal comune, e degli altri sali fossili.

24. Nell' acqua comune quasi bollente infusi, per dodici ore in vaso di vetro, una buona quantità di Mercurio. In quell' infusione, raffreddata che fu, senza cavarne il Mercurio, misi quattro Lombrichi, i quali vi morirono nello spazio di vent' ore.

25. In un orinaletto di vetro da stillare riposi una buona quantità di Mercurio in modo tale, che fosse coperto altamente tutto il fondo. Sopra esso Mercurio posai un grossissimo Lombrico, il quale subito cominciò fortemente a divincolarsi, ed  
a gittar



a gittar molta spuma, e molta viscosità, ed in ventiquattr' ore si morì tutto intirizzito, e convulso. Replicai l'esperienza con un altro Lombrico più grosso del primo; nel tempo delle ventiquattr' ore non era per ancor morto; ma si conosceva mal vivo, e tutto convulso; e così mal vivo, e convulso continuò a vivere un altro giorno, e poscia morendo rimase come il primo intirizzito, e indurito. Replicai l'esperienza con sei Lombricuzzi minori. Fecero al solito molsfuma, e quattro di essi morirono in capo alle sedici ore; gli altri due un poco più grossetti indugiarono fino alle ventiquattro; e posì mente, che ad intirizzare, e a divenir convulsi cominciavano dalla coda; e se io gli traeva fuor del Mercurio, si moveano bensì con la testa, ma con gran difficoltà si strascinavan dietro il restante del lor corpo. Fu lodevole avvertenza degli antichi Medici lo usar contro i vermini, ed il Mercurio stesso, e l'acqua in cui fosse stato infuso il Mercurio.

26. Stemperai una considerabil quantità di Terra sigillata nell' acqua comune in modo, che nel fondo del vaso facesse buona posatura. I Lombrichi giacevano placidissimamente in quella fanghiglia, ed a loro piacimento di quando in quando si aggiravano per quell' acqua torbida, dove dimoraro-

morarono venti giorni , senza che ne morisse mai ne pur uno . Più di venti giorni ancora rimasero vivi molti Lombrichi nell'acqua di Nocera , la quale , come ognun sa , è carica di miniera di bolo . E pure alcuni moderni Autori affermano , che quest' acqua è un potentissimo rimedio contro i vermi de' corpi umani .

27. Nella stessa maniera feci la prova con la pietra Bezaar orientale , e coll' occidentale ancora , e non conobbi queste due famosissime pietre ne poco , ne punto più valenti della Terra Sigillata nell' uccidere i vermi .

28. Più valorosa è l' Acqua arzente , anzi valorosissima ; imperocchè appena vi si son tuffati i Lombrichi , che subito vi muoiono con grandissima prestezza : E questi Lombrichi morti nell' Acqua arzente sono ottimi per farne notomia . I Grilli neri cantatori , le Talpe dell' Imperato , i Lumaconi ignudi , e le Sanguisughe muoiono nell' Acqua arzente al par de' Lombrichi . Le Sanguisughe vi vomitano il sangue ; i Lumaconi ignudi vi lasciano una indicibile quantità di moccicaia viscosa , e rappresa : e quindi avviene , che in questa maniera sieno facili ad esser maneggiati , e tagliati , che per altro i Lumaconi riescono fastidiosissimi a notomizzarli tanto vivi , quanto morti per la loro lubricità .

29. Con

29. Con celerità poco minore di quella dell'Acqua arzente gli uccide ancora il vino, e bianco, e rosso, e dolce, e non dolce. E l'aceto non meno del vino toglie loro la vita; dal che si può argomentare non essere stabile l'opinione di coloro, che credono, che quelle minutissime, e quasi invisibili anguillette, le quali col Microscopio si veggiono talvolta guizzar negli aceri, sieno fortissimi Lombrichi terrestri poco prima usciti dall'uova.

30. L'agro di Limone spremuto è un poco più pigro dell'aceto, e del vino; conciossiacosachè i Lombrichi vi soglion campare un ora, ed un'ora e mezzo, e talvolta ancora due. Ma avendone fatta la prova col sugo dell'Arance dolci nostrali, di Portogallo; col sugo spremuto da' Limoni grossi, e dolci di Galizia, e di Portogallo, e col sugo parimente delle Lime dolci di Valenza, tutti i Lombrichi e grossi, e piccoli vi morirono nel solo tempo di una mezz'ora, o poco più.

31. Premetti dell'Vva stata appiccata per lungo tempo al palco, e dentro al suo sugo vidi morire i Lombrichi nel termine di mezz'ora, e rimanervi come induriti, e quasi rifeccati: E pure si crede, che tutte le generazioni di frutte cooperino molto alla generazione de' vermi ne' fanciulli.

ciulli . Io l' ho per una falsissima credenza . Si mastichi delle mele , delle pere , delle albicocche , delle pesche ; ed in quella masticatura si immergano i Lombrichi , e si vedranno rimaner privi di vita in pochissime ore . Lo stesso avviene a' Lombrichi tenuti in vaso di vetro , in cui sieno delle ciliege ammaccate , e spremute , delle susine tanto agre , e acerbe , quanto dolcissime , e mature , delle fragole bianche , rosse , e moscadelle , e di quelle altresì grossissime , che son chiamate Magiostre .

32. Se i frutti ammazzano i bachi , ancora i fiori gli ammazzano . Feci pestare de' bottoni di Rose rosse nel mortaio di marmo col pestello di legno, e perchè erano poco sugosi gli spruzzai di acqua comune , e fattane come una poltiglia , vi morirono in quattr' ore tutti quanti que' Lombrichi , che vi adoprai , iterandone , e reiterandone l' esperienza . Lo stesso avviene con le rose incarnate , e co' fiori di Arancio , ma ne' fiori di Mughetto vi muoiono in meno di mezz' ora .

33. Nell' acqua comune bollente feci una piena infusione di foglie di Rose incarnate , e la tenni per ventiquattr' ore alle ceneri calde , e fattane forte espressione v' immerse molti Lombrichi . Alcuni morirono in sedici ore , altri in ventiquattro . Vn simile effetto , presappoco , fa l' infusione

sione delle rose rosse, de' mughetti, e de' fiori d' arancio.

34. Nell' acqua di fiori d' arancio stillata a stufa, nell' acqua rosa, nell' acqua di fiori di mortella sempre ho veduto morirvegli in pochi momenti, e quando anno indugiato a morire, al più al più sono arrivati ad un ora, o ad un ora e mezza, e sempre, particolarmente in quella di fiori di mortella vi an lasciata una gran quantità di moccicaia viscosissima. Tali stillate acque odorifere, si vede per esperienza, che son molto nemiche degl' Insetti tanto acquatici, quanto terrestri. Le Mignatte, o Sanguisughe vi muoiono in poco più di un ora. Le Zuccaiuole, o Talpe dell' Imperato vi muoiono molto più presto delle Mignatte, e per lo più in mezz' ora; non perchè quelle acque, come semplici acque, le affoghino, ma bensì perchè elle sono acque stillate, e odorose: Imperocchè queste Zuccaiuole, o Talpe dell' Imperato nell' acqua comune di pozzo, di fiume, o di fontana vi si mantengono sempre nuotando a galla per un lunghissimo tempo; ed io ve l' ho tenute vive per cinque giorni, e per cinque notti continue. I Lumaconi ignudi messi nell' acqua comune procurano a tutta lor possa di uscirne arrampicandosi per le lisce sponde de' vasi di argento, di vetro, e di terra inietriata,

Q

e non

e non potendo scapparne vi si mantengono vivi molte ore ; e se talvolta parendo morti si cavan fuor dell'acqua , e si tengono all'asciutto , si conosce chiaramente , che non son finiti di morire , perchè appoco appoco ricominciano a muoversi , e tornano francamente agli usati ufici della vita : Ma gittati nelle soprammentovate acque odorifere subito vi si sbalordiscono , vi si scontorcono , non anno forza di poterne scappare ; ed in un ora , o in due , vi muoiono totalmente , e poco prima , o poco dopo secondo la grossezza , e robustezza loro . Le Scolopendre marine ancorchè nate , e nutrite nell'acqua salata , se le ho tenute nell'acqua dolce di pozzo , vi si son conservate vive più di venti giorni interi senza cibo ; ma nell'acqua rosa , nell'acqua di fiori di Arancio , ed in quella di fiori di mortella stillate non vi son mai visse più di mezz'ora , e forse non vi son arrivate . Con la medesima prestezza , anzi molto maggiore , par che vi muoiano le Scolopendre terrestri ; ma ancorchè elle rassembrin morte , in verità non lo sono ; e tratte all'asciutto fuor di quell'acque appoco appoco ricominciano a ripigliare il moto , e a dar segni di vivere .

35. Al pari dell'acque odorifere stillate sudette , l'acqua di Gramigna ammazza i Lombri-  
chi , e morendo vi gettano gran viscosità , e vi  
pati-

patiscono moti convulsivi , e' morti che sono , rimangono come intirizzati . L'acqua di Puleggio , e l'acqua di Timo producono quasi gli stessi effetti , e quasi con la stessa prestezza .

36. In dieci ore ho veduto morirgli nell'acque di Triboli , di Calamento , di fiori di Sambuco tutte stillate a stufa . Nell'acqua di Scorzonera vi son campati molti giorni ; molti giorni altresì nell'acqua d' Isopo , e di Salvia . Mi astengo volentieri dal noverare altre acque , perchè è facile pigliare degli sbagli circa i tempi del morire , vedendosi sovente delle stravaganze ; o per cagione di esse acque , o per cagione de' modi dello stillarle , o per cagione de' Lombrichi medesimi , o più piccoli , o più grandi , o cavati di fresco dal terreno , o tenuti in casa per gran tempo , e conseguentemente qualche poco infievoliti . La verità si è , che in tutte le sopradette prove ho adoperate sempre acque stillate a stufa in orinali di terra con cappelli di vetro , e non mi son mai servito dell'acque stillate a campana di piombo .

37. Crede il Volgo , e lo scrivono molti Autori , che l'acqua stillata da' Lombrichi terrestri sia un potentissimo rimedio contro i Lombrichi medesimi . Per ritrovarne la verità feci prendere due libbre di Lombrichi , e lavati che furono con acqua , e poscia ben dall' acqua rasciutti gli feci

Q 2

stillare

Stillare in orinale di vetro a Bagnomaria : L'acqua, che ne stillò , fu diciassett' once raccolta in tre diversi recipienti per osservare la differenza tra la prima, e la seconda, e tra la seconda, e l'ultima. I Lombrichi messi nella prima acqua, e nella seconda vi camparono otto giorni, quelli messi nell'ultima acqua vi durarono vivi quattro soli giorni.

38. Impolverati i Lombrichi col Tabacco polverizzato muoiono in pochi momenti. Lo stesso giuoco fa loro la Cannella, ed il Pepe, ma non con tanta prestezza quanto il Tabacco. Anco la polvere della spazzatura delle stanze gli uccide, ed in somma ogni maniera di polverè. Siccome ogni maniera di sale.

39. Io so molto bene, che può essermi giustamente opposto, che sarebbe stato miglior pensiero tentar tutte le soprannarrate esperienze, non co' Lombrichi terrestri, ma con Lombrichi usciti de' corpi degli uomini, o trovati ne' corpi di animali di altra spezie. Non lo nego: Ma egli è d' uopo, che io mi difenda coll' affermar sinceramente, che è cosa, che ha molto, e molto del difficile, per non dire dell' impossibile. Imperocchè i Lombrichi, che abitano ne' corpi degli uomini, e de' bruti, non si possono per lo più aver vivi a sua posta, ne è facile lo avergli in quella quantità, che è necessaria a far bene l'esper-



esperienze, ed a rifarle per assicurarsi con certezza dell' evento. In oltre dandosi il caso, conforme talvolta avviene, che si abbiano vivi, certa cosa è, che usciti fuor del corpo degli animali, per necessità in qualche spazio di tempo naturalmente debbon morire: Laonde è molto dubbioso il conoscere con evidenza, se la lor morte provvenga naturalmente per trovarsi fuor di quel mondo, nel quale nacquero, o pure ella sia cagionata dalla forza de' medicamenti. Di più a chi mi facesse quella giusta, e ragionevole opposizione io potrei dimandare, quali evidenti, sicure, confermate, e visibili esperienze abbiano i Libri de' Medici per mostrare, che un tal qual si sia medicamento uccida, e cacci fuor del corpo umano i vermini; ovvero qual cibo, o qual dolce manicaretto, o qual bevanda vi sia, che si possa dir con certezza, che ella gli generi, o per lo meno, che ne fomenti la generazione, e la nascita, e la conservazione. Si cammina per lo più anco ne' Libri de' Medici al barlume delle conietture, e delle apparenti probabilità, il che non è poco; E fuor de' medicamenti evacuanti, e fuor delle Piene, e delle Inondazioni, mosse da' Cristieri, e da Vomitori acquosi non si può affermar in questa materia de' vermini cosa veruna di certo: Ed anco questo certo, appresso i Medici

Medici più prudenti , ha le sue limitazioni , e forse , anzi senza forse , le sue incertezze , e le sue eccezioni . Nulladimeno riferirò qui tutte quelle poche esperienze , che mi è stato possibile di tentare co' Lombrichi de' corpi degli animali ; e che per esse ho potuto comprendere , che alcune cose , le quali si adattano a' Lombrichi terrestri , si adattano altresì a' Lombrichi degli animali .

40. I Lombrichi de' corpi umani , se si tengono all' asciutto , lo temono grandemente , e si muoiono in breve tempo ; e morti si rasciugano , e si seccano , ed in tal maniera seccati si possono conservare lungamente ; E se mai se ne volesse osservare internamente le viscere , basta tenergli infusi per alcune ore nell' acqua , perchè facilmente vi rinvergono , e tornano nel loro stato ; come se fossero morti pochi momenti di prima .

41. Questi suddetti Lombrichi nell' acqua comune pura , e semplice , , e fresca di sua natural freschezza , gli ho mantenuti vivi fino in settimana , ed anco talvolta fino in settant' ore .

42. Il simile mi è avvenuto nell' acqua di Nocera , e nell' acqua comune di fontana , e di pozzo , in cui era stata infusa una buona quantità di terra Sigillata : E pure da molti Scrittori si celebra la terra Sigillata , e l' acqua di Nocera ,  
come

come una potentissima estermiatrice de' vermi de' fanciulli.

43. Nell' acqua infusavi la Corallina macinata vi son campati vivi più di sessantà ore . E più di trenta ore vissero due di que' medesimi Lombrichi nell' acqua fatta amara dall' Aloè .

44. Nelle infusioni di limatura di corno di Cervo , di avorio , d' ugnà della gran Bestia , di corno di Rinoceronte fatte in acqua comune vi stanno come se fossero in acqua semplice non infettata dalla virtù di quei famosi medicamenti .

45. In quell' acqua totalmente pregna di sale, che ho mentovato al numero 22. vi muoiono con prestezza , ma con prestezza maggiore muoiono nell' acqua arzente , conforme ho scritto avvenire a' Lombrichi terrestri , con questa differenza però , che i Lombrichi degli uomini son più resistenti alla forza delle medicine di quel che si sieno i Lombrichi terrestri , il che non parrebbe credibile , se l' esperienza non lo facesse vedere , la quale altresì fa vedere , che siccome i Lombrichi terrestri son velocissimi , e lestissimi al moto , così i Lombrichi de' corpi umani , fuor di essi corpi , sembrano pigriissimi , lenti , e quasi che dissimulati , e stolidi .

46. Siccome i Lombrichi terrestri , e molti altri Insetti muoiono nell' acque stillate odorife-

re, così i Lombrichi de' corpi umani muoiono al più lungo in dieci ore nell' acqua rosa, nell' acqua di fiori d'arancio, ed in quella di fiori di mortella. Ma i piccoli Lombrichetti bianchi nati di poco, e gli Ascaridi appena toccano quell' acque, che vi muoiono.

47. Sciolta nell' acqua fresca una buona quantità di Zucchero in modo che l' acqua diventi simile ad un Giulebbo vi muoiono nel tempo di tre, o di quattr' ore al più; E ne ho fatta la prova fino in sei volte.

48. Scrissi al numero ventinove che il vino uccide con gran celerità i Lombrichi terrestri, ed ora lo confermo; Ma nello stesso tempo soggiungo, che i Lombrichi de' corpi umani immersi in esso vino mi son trovato a vedervegli vivere qualche non breve tempo. Vno di essi vi scampò più di ventiquattr' ore. Un altro arrivò alle quaranta; Ed il terzo arrivato vivo fino a settantaquattro ore, parve che poi morisse, ma la verità si è, che dalla testa fino alla metà del corpo, per alcune altre ore, gli rimase qualche oscuro residuo di vita, che si fece più manifesto nel tagliarlo. Il popolo crede fermamente, e vi sono molti Valentuomini, che lo predicano ad alta voce, che il vino è l' unico, il solo, ed il più esperimentato rimedio per uccidere quei vermi,

mi , che abitano entr' a' corpi umani . Se ciò fosse vero non si vedrebbe mainella nostra Italia il malore de' vermini .

49. L' odore dell' olio Controveleni , e degli oli da Bachi non sembra nocivo punto ne poco , e ne meno sembra nociva una leggiera unzione co' medesimi oli . Avendo avuti due Lombrichi subito che furon gettati fuor del corpo , ne unsi uno gentilmente con olio da Bachi , e l' altro con olio Controveleni , e poscia gli misi in un vaso umido di acqua , e ferrai il vaso con fogli molto bene unti co' medesimi oli , e pure i Lombrichi vi camparono quasi che quarant' ore .

50. Alcuni vermi , che trovai negl' intestini di un pesce Tamburo , de' quali favellerò appresso , al suo luogo , gli unsi benbene , altri con olio Controveleni , altri con olio da Bachi senza però trargli fuor degl' intestini , e durarono a vivere manifestamente trentasei ore , ancorchè fossero di già passati alcuni giorni , da che il pesce Tamburo era morto .

51. Co' Lombrichi tondi degl' intestini di un Gatto unti co' sovraddetti oli non ho rinvenuto cosa veruna da poterne favellar con fondamento di certezza stabile ; Imperocchè alcuni morirono in breve , altri camparono alcune ore non ostante che fossero assai sottili , e smunti .

R

52.

52. Tutte le sovraddette esperienze intorno a' Lombrichi de' corpi umani sono state da me tenute solamente con quella specie di Lombrichi, che dagli Autori di Medicina si appellano *Lumbrici teretes*, seu *rotundi*, e non con quell' altre due razze mentovate *Ascarides*, e *Lumbrici tati*; e he meno con la quarta maniera, che son detti *Cucurbitini* dalla similitudine, che sembrano avere co' semi della Zucca. E qui sia il fine delle esperienze da me fatte intorno alla morte de' Lombrichi per ripigliare il racconto delle Osservazioni intorno agli Animalì viventi, che si trovano in altri Animalì viventi.

Negl' intestini de' Gatti abitano frequentemente i vermi. *Marco Aurelio Severino* nella quarta parte della *Zootomia* affermò di aver veduto un Lombrico nell' intestino duodeno. Io talvolta n' ho trovato uno, e talvolta due, e talvolta fino in otto, e in nove, e fino in trenta non solamente ne' Gatti casalinghi, ma altresì ne' Gatti salvatici, che stanno per le foreste: E di più in uno stesso animale nel medesimo tempo ne ho scoperti di tre differenti razze. I primi lunghi, ritondi, e similissimi esternamente a' Lombrichi lunghi, ritondi degl' intestini degli uomini, se non che anno il capo alquanto differente, Tav. decimasettima, Fig. terza. I secondi bianchi  
lattati

lattati non più lunghi di un piccolo pinocchio mondo, che stanno con una loro estremità tenacemente attaccati all' interna tunica degl' intestini; e talvolta si scortano, e rigonfiano in se medesimi come tante borse; e talvolta si allungano un poco, e si torcono in mezzo cerchio: Potrebbon forse ridursi alla specie de' vermi cucurbitini. Tav. decimasettima, Fig. quarta. I terzi bianchi ancor essi, e lattati, lunghi, non ritondi, ma piani, e fatti a sezioni, che si scortano, e si allungano a lor piacimento a lunghezza così grande, che se alle volte appariranno lunghi quattro, e sei dita traverse, si possono distendere alla lunghezza di due spanne; e di nuovo a lor piacimento posson tornare a scorciarsi attaccati agl' intestini con una delle loro estremità, nella quale scorgonsi quattro punti, che talvolta appariscon neri, e talvolta come turchinici; che meglio si ravvisano quando questi vermi sollevano quella estremità dal pasto degl' intestini, Tav. decimasettima, Fig. prima, e seconda. E di questa razza se ne trova ancora ne' Cani, ne' Lupi; e negli uomini. Anzi mi sovviene, che un braccio da fermo venuto da' paesi di Spagna durò sette, o otto mesi continui a gettar per secesso ogni giorno ogni giorno una grandissima, ed incredibile quantità di tutt' a tre queste razze

di vermi , che ne' Gatti hò detto ingenerarsi ; onde il povero braccio era ridotto a tal termine , che per la magrezza tutte l'ossa apertamente mostrava : Ed è cosa degna di considerazione , che i Lombrichetti degl' intestini di questo cane aveano per appunto l'istessa figura di quegli degl' intestini de' gatti con quella testa a foggia di freccia , disegnati nella Tav. decimasettima , Fig. terza , onde scorgeasi chiaramente , che erano di razza differente da quegli , che anno per loro abitazione i reni de' medesimi cani , e le glandule de' loro esofaghi .

Il mesenterio di una Lepre tra tunica , e tunica l'ho veduto esser tutto tempestato di certe gallozette , o idatidi trasparenti piene di acqua limpidissima , di figura di un seme di popone col beccuccio in una dell'estremità bianco , e non trasparente . E sono di diverse grandezze , altre non maggiori de' granelli di miglio , altre come granelli di grano , altre come semi di popone , e di cocomero ; e quivi tra tunica , e tunica se ne stanno senza avere attaccamento veruno ad esse tuniche , Tav. seconda , Fig. terza . Non è solo il mesenterio ad esser gremito di simili idatidi ; imperocchè moltissime ne covano sotto la prima tunica esterna di tutto quanto il canale degli alimenti , e molte , e molte come se fossero animali



animali semoventi stavano libere, e sciolte nella gran cavità del ventre inferiore; e molte erano rinchiusse sotto la tunica, che veste il fegato; e molte altre profondamente nascoste, aggruppate a mucchi, e legate insieme nel fegato medesimo; e questo del fegato erano le maggiori di tutte, essendovene tra esse qualcuna più grande di quel che si sia ogni gran seme di zucca. La vescica del fiele di questa stessa Lepre era molto differente di figura da quella, che sogliono aver le Lepri, che naturalmente somiglia ad una pera col gambo. Ma qui, in vece di vescica, vedevansi nel fegato due grandi, lunghe, e sterminatamente grosse ramificazioni pienissime di bile, nella quale nuotavano diciotto di quei vermi di figura somigliante qualche poco al pesce Sogliola, che nelle mie *Osservazioni intorno alla generazione degl' Insetti* accennai trovarsi non di rado ne' fegati delle Pecore, e de' Castroni, e che da' Macellai Fiorentini son chiamate Bisciuole: Onde mi venne dubbio se quelle gallozzole acquose di figura di seme di popone, o di zucca potessero per avventura essere gli embrioni, per così dire, di questi vermi, che abitano nel fiele, e che tali col crescere, e col perfezionarsi diventassero; Ma non saprei con certezza affermarlo, ne mai ho saputo chiarirne, ancorchè in moltissime  
altre

altre Lepri io abbia osservate, le suddette gallozzole, e vi abbia usato qualche poco di diligenza; per ritrovar pur con certezza, che cosa fossero, e che acqua fosse quella, di che erano piene, ne presi una considerabile quantità, e la feci lungamente bollire nell' acqua di pozzo, ma l' acqua di esse gallozzole non si rapprese mai, come suole al fuoco rappigliarsi, e congelarsi il siero, che si separa dal sangue, l' acqua che si trova nelle vesciche fatte da vescicatori, e come parimente si condensano, e si rappigliano quell' uova, che si trovano ne' testicoli, femminili, o ovaie de' quadrupedi, conforme ho osservato, nell' uova delle Leonesse, dell' Orse, delle Vacche, delle Bufale, dell' Asine, delle Daine, delle Cerve, e di altri animali pur quadrupedi. Si mantenne dunque sempre fluida l' acqua delle gallozzole, come fluida si mantiene al fuoco, ne si rappiglia, ne si congela quell' acqua, o quel siero, che cavano fuori da' corpi umani per secesso, i medicinali purganti, conforme molte, e molte volte ne ho fatta l' esperienza. In altre Lepri ho scoperto ne' loro intestini, e particolarmente nel colon, alcuni lombrichetti sottilissimi, e bianchissimi non più lunghi di quattro, o sei dita traverse.

Morì un' Orso ne' Serragli del Serenis. Gran  
duca

duca mio Signore. Nell' osservar la curiosa fabbrica de' Reni di quell' Animale, posi mente, ehè fra la membrana adiposa, ed un'altra membrana, la quale a foggia di un sacco contiene dentro di se molti, e molti piccoli reni distinti, e separati l' uno dall' altro, fra la membrana adiposa, dico, e fra quel sacco vidi, che eran situati molti invogli, o vescichette membranose, ciascuna delle quali racchiudeva un lungo, sottilissimo, e bianco lombrichetto: Anzi vi erano di quelle vescichette, che ne racchiudevano due; e di quelle altresì, che ne racchiudevano fino in tre. Gli stessi piccoli reni racchiusi nell' gran sacco, tra la loro membrana propria, ed il parenchima, erano gremiti delle medesime vescichette verminose, ma di mole assai minori di quelle situate tra la membrana adiposa, ed il gran sacco contenente il grappolo, per così dire, de' piccoli reni. Ne' Delfini, nelle Foleghe, o Vitelli del Mare, ne' Buoi, ne' Bufoli, nelle Lontre, e nelle Tartarughe marine ho veduta la fabbrica de' reni simile a un dipresso, e fatta, quasi sul modello di questa degl' Orsi; ed ho osservato, che tutti i piccoli reni, ognuno dipressè, vien corredato dalla natura di tutti quegli arnesi, canali, e cavità, di cui necessariamente guerniti sono i reni grandi di tutti gli altri animali:

hi: ma non mi son mai imbattuto a trovarvi de' suddetti Lombrichi, o vescichette verminose. Le ho ben trovate in un pesce Aquila, di cui parlerò a suo luogo.

Nelle cacce dell' Ambrogiana fu ammazzato un Caprio, al quale, intorno al rene sinistro, si era raggruppato un grande, e duro ammassamento glanduloso, che racchiudeva da tutte le bande non solamente esso rene sinistro, ma ancora tutti i più grossi canali sanguigni del ventre inferiore; e tale ammassamento glanduloso era così sterminato, che arrivava al peso di cinque libbre, ed oltre al racchiudere il rene, racchiudeva ancora in se stesso sei grossi sacchetti; alcuni de' quali eran grossi quanto una noce, ed altri molto maggiori: E tutti nella cavità delle loro doppie tuniche contenevano una materia di color filigginoso, e di sostanza, e consistenza simile alla Manteca; e tra questa materia stavano raggruppati tanti, e tanti sottilissimi Lombrichetti di differenti lunghezze, che arrivai a contarne fino in quattrocento. Per altro il Caprio era bello, e grasso con tutte l'altre viscere nel loro stato naturale, e fin nel rene stesso, racchiuso in quello sterminato glanduloso ammassamento, non appariva ne pure una minima magagna.

Gli esofaghi de' Lupi, de' Tassi, degl' Istrici, de' Leo-

de' Leoni , e de' Cani gli ho trovati qualchevolta eternamente bernoccoluti di certi bitorzoli glandulosi di varie grandezze , pieni di minuti , e rossi Lombrichetti anch' essi di diverse grandezze . Ma non meno , che negli esofaghi suddetti , sotto la prima esterna tunica degli stomachi delle Volpi ho veduto soventemente grandi , e folti mucchi di grosse glandule abitate ancor' esse da quei medesimi Lombrichi .

De' vermi , che si trovano nella testa , e nel naso de' Cervi , e de' Castroni , da' quali vermi son parimente infestate le Gazzelle , ne favellai nelle *Osservazioni intorno alla Generazione degl' Insetti*.

Sotto la radice della coda de' Tassi , tanto maschi , quanto femmine , sta aperta una larga caverna , che , nel suo fondo ferrato , divideasi quasi in due cellette , dove stagna copiosamente una certa poltiglia viscosa , e bianca , di odore ferino , grave noiosissimo , che vi geme , come accade ne' Gatti del Zibetto , se però la comparazione è a proposito tra una cosa odorosissima , ed un'altra fetidissima , vi geme dico , e vi trasuda dalle bocchette di numerose glandule , delle quali , per così dire , è lavorata a musaico non solamente la volta della caverna , ma ancora tutte le pareti , ed i fianchi , ed il pavimento . Sono esse glandule di differenti grandezze , alcune simili alle

S                      lenti ,

altre simili alle vecce, altre simili a' lupini; e queste più grandi in alcuni Tassi, ancorchè non in tutti, mi è accaduto rinvenirle talvolta essere il ricettacolo di sottilissimi lombricuzzi bianchi, non più lunghi di quel che si sia l'ugna del dito minore di un uomo. Di simili lombricuzzi ne ho trovati parimente in due cavernette delle Lepri femmine, e de' maschi; ma queste cavernette delle Lepri non son situate immediatamente sotto le radici della coda; Anzi nelle Lepri sotto le radici della coda è aperto il forame del podice, quindi poco più avanti verso il ventre si trovano le due cavernette, e nello spazio di mezzo tra l'una, e l'altra scappa fuori ne' maschi il membro genitale; ma nelle femmine, nello stesso spazio di mezzo tra una cavernetta, e l'altra, vi è lo squarcio di una fessura lunghetta, la quale altro non è che la porta della natura. Da tal fessura s'innalza una massiccia Clitoride, soda, dura, acuta in punta, e quasi della stessa grossezza del membro genitale de' maschi, ancorchè non sia aperta, ne scanalata, come aperto, e scanalato si trova esso membro genitale. Questa così fatta Clitoride credo che sia stata la cagione, che il volgo de' Cacciatori vadasi ridicolosamente immaginando, che le Lepri sieno tutte Ermafrodite, cioè che ogniuna di esse sia insieme, e maschio, e femmina;

na; e nell' opera della generazione abbia abilità per far gli ufici della femmina, e del maschio.

Tre aperture esterne si veggono nella pelle sotto la coda delle femmine de' Topi domestici, e di quegli altri Topi, che Topi acquaiuoli si chiamano, e che abitano nelle bucherattole de' greppi di quelle fosse, per le quali corre l' acqua. La prima apertura trovasi immediatamente sotto l' appiccatura della coda al dorso, ed è il forame per cui il Topo si scarica dello sterco: Poco più avanti, a linea retta verso il ventre, stassi la seconda apertura circolare, che introduce in una cavernetta, nella quale sbocca il capo, e l' orifizio dell' utero con un orlo intorno intorno di vari risalti. Un poco più avanti a linea retta pur verso il ventre, trovasi la terza apertura a foggia d' un grosso, e ciondolante capezzolo tutto di lunghi peli coperto. L' apertura di questo capezzolo fa strada ad una grotticella, nel di cui fondo sta rilevata una papilla coperta con una membrana simile, quasi che diffi, ad un prepuzio. Tal papilla è forata in punta, ed in essa termina il canale della vescica urinaria; e questa papilla della vescica urinaria è messa in mezzo da due altre minori papille aventi un piccolo forame, in ciascuno de' quali termina il collo di due glandule, o sacchetti situati sotto la pelle, che cuopre l' anguinaie, da' quali due sacchetti, se

sieno spremuti con le dita, subito schizza fuori una materia di colore, e di consistenza somigliante per lo più al latte; ma di fetore stomacoso e stucchevolissimo. Tra questa materia così schifa trovai unavolta moltissimi vermicciuoli simili a soprammentovati de' Tassi, e delle Lepri, ma però più minuti. Anco i Topi maschi vengono forniti di questi due sacchetti dell'anguinaie; ma se nelle femmine il loro collo termina, e riesce là dove sbocca la vescica dell'orina, ne' maschi riesce, e termina nell'orlo del prepuzio con particolari piccolissimi orifizi. In tali sacchetti de' maschi non mi è mai avvenuto di trovarvi de' vermi, che se ciò fosse avvenuto, poteva valere a fiancheggiar un Valentuomo del nostro Secolo, che porta opinione, che lo sperma di tutti gli animali sia pieno d'infiniti minutissimi vermicciuoli, visibili solamente agli occhi armati di Microscopio d'intera perfezione.

Io andava rintracciando per mio passatempo alcune cognizioni intorno al cervello, ed al moto degli animali; ed a questo fine avendo più volte cavato il cervello a molte generazioni di volatili, e di quadrupedi, ed osservatone gli eventi, mi venne pensiero di veder quel che succedesse nelle Tartarughe terrestri; e ad una di quelle, nel principio di Novembre, fatto un  
largo



largo forame nel cranio , cavai pulitamente tutto il cervello , rinettando bene la cavità , a segno tale , che non ve ne rimase ne pure un minuzzolo : lasciando poscia scoperto il forame del cranio , misi la Tartaruga in libertà , ed essa , come se non avesse male veruno , si movea , e camminava francamente , e si aggirava brancolando ovunque le piaceva : ho detto brancolando , perchè dopo la perdita del cervello , serrò subito gli occhi , e non gli aprì più mai : la Natura intanto vera , e sola medica de' mali , in capo a tre giorni con una nuova tela di carne coprì , e ben serrò il soprad detto largo forame del cranio , la dove mancava l'osso ; e la Tartaruga non perdendo mai la forza del camminar liberamente a sua voglia , e del far ogni altro moto , visse fino a mezzo Maggio , sicchè ella campò sei mesi interi . Quando fu morta osservai la cavità , dove sole-va star il cervello , e la trovai netta , e pulita , e totalmente vota , eccetto che di un piccolo , e secco , e nero grumetto di sangue . Son viste ancora altre molte Tartarughe terrestri , alle quali nella stessa maniera ne' mesi di Novembre , di Gennaio , di Febbraio , e di Marzo cavai tutto quanto il cervello ; con questa differenza però , che alcune si moveano di luogo , e si aggiravano a lor piacimento , ed altre ancorchè

ancorchè vivessero lungo tempo senza cervello ; nulladimeno non si mossero mai di luogo , ancorchè facessero altri movimenti . E ho detto , che vivessero lungo tempo ; imperocchè quelle , che camparono meno dell' altre , arrivarono a cinquanta giorni di vita , e l' altre passarono molti , e molti mesi senza morire . Non son sole le Tartarughe terrestri ad aver questa virtù di viver lungamente , e di muoversi di luogo prive totalmente del cervello , ma ciò avviene ancora alle Tartarughe di acqua dolce , e ne ho fatta la prova in molte , e molte di esse , ancorchè elle non sieno così resistenti , ne di sì lunga durata , come sono le terrestri . Credo , che ancora le Tartarughe di Mare possan lungamente vivere senza cervello , perchè ad una di esse , che recatami di Portoferraio era stata lungamente fuor del Mare , e perciò molto acquacchiata , e fievole , feci cavar il cervello , e campò più di sei intere giornate : Quando cominciai a far queste Osservazioni la Corte di Toscana trattenevasi alle deliziose cacce dell' Ambrogiana , ed io del muoversi , e d' un così lungo vivere delle Tartarughe senza cervello favellandone un giorno per ischerzo coll' Illustriss. Signore Marchese Cammillo Coppoli Gentiluomo della Camera del Sereniss. Granduca , e con altri Signori , mi replicò esso Signor Marchese di ricordarsi

cordarsi d'aver veduto molti anni addietro, che le Tartarughe sogliono lungamente vivere senza la testa, e che lo avea osservato quando certi Medici misteriosi, e forse della stessa scuola di certuni introdotti scherzosamente nelle Commedie Franzesi dal famosissimo Moliere, per guarire una gran Dama di una certa sua infermità, tagliavano di netto la testa alle Tartarughe, e facevano con gran misterio stillar subito tutto quel loro freddo sangue sulle reni della medesima Dama, e le Testuggini poi senza testa continuarono a viver molti giorni. Volli chiarirmene; onde nello stesso mese di Novembre fatto recidere il capo ad una grossa Testuggine, lasciai, che dalle tagliate vene del collo ne sgorgasse tutto quel freddo sì, ma coloritissimo sangue, che potè sgorgarne, e la Testuggine continuò a vivere per ventitre giornate; e che ella veramente fosse viva riconosceasi, non già perchè ella si muovesse di luogo, come potean far quelle, alle quali era stato cavato il cervello; ma bensì perchè punta, o stuzzicata ne' piedi anteriori, o posteriori ella con gran forza gli tirava in dentro, e diversi altri moti facea. E perchè da qualcuno potea forse dubitarsi, che quei moti fossero, per così dire, una forza, o di intirizzamento, o di molla, e non moti di un vivente, quindi è che per chiarir bene

bene il fatto, tagliato il capo a quattro altre Tartarughe, e scolatone tutto il sangue, ne aperfi due dodici giorni dopo, e vidi chiaramente il cuore palpitante, e vivo insieme co' moti del residuo del sangue, che entrava, ed usciva dal cuore, il qual sangue si rassomigliava nel colore ad una scolorita lavatura di carne, o ad una linfa, che avesse presa un poco di dilavata tintura di rosso. Ora quel che fa quì presentemente al mio proposito si è, che aprendo una di queste Tartarughe senza testa, la quale era grossissima, osservai lo stomaco totalmente voto, e pulitissimo, siccome pulitissimo era tutto il canale degl' intestini eccettuatone l' intestino Retto, dove era qualche arido cacherello: Ma un gozzo, o seno assai capace, e ritondo formato dall' intestino Colon era tutto pieno di così gran quantità di piccolissimi vermicciuoli vivi ammonticellati insieme, che giugnievano ad essere molte migliaia; conciossiachè in questa sola Tartaruga tutti insieme pesavano un quarto di oncia, e ne andava più di cinquecento al grano, sicchè questi vermicciuoli di questa Tartaruga passavano il numero di settantadue mila. Ed in vero, che in più di cento Tartarughe terrestri, che ho osservate molte volte in tutti i mesi dell' Anno, in tutte quante costantemente, senza eccettuarne veruna, ho trovati  
i sud-

i suddetti vermicciuoli nel gozzo del Colon , e talvolta non solamente in esso gozzo ; ma altresì nell' intestino Retto , con qualche notabil differenza però del numero de' vermi . Nelle Tartarughe di acqua dolce , ed in quelle del Mare non ne ho mai trovato ne pur uno ; ancorchè molte , e molte ne abbia osservate per la alta Generosità del Sereniss. Granduca mio Signore .

In un Cigno del Giardino di Boboli , che morì , di tanta , e di così indicibile , e sparuta magrezza , che non era se non ossa , e pelle , e nello sterno appena appena si riconosceva qualche smunto vestigio di quei grossi , e forti muscoli pettorali , che lo ricuoprono , osservai la cavità del ventre piena d' infiniti lombricuzzi lunghi la maggior parte quanto una lunga spanna , sottilissimi , e bianchi , de' quali potei noverarne più di dugento , insieme con molti altri simili , che se ne stavano chiusi , e aggruppati dentro a tutto il canale degli alimenti , e dentro altresì a' due lunghissimi intestini ciechi . Il dottissimo *Giorgio Girolamo Velschio* nell' erudito suo Libro *de Vena Medinensi* fa menzione , e porta la figura di simili Lombrichi osservati da lui , e dallo *Spigelio* nelle Allodole , e ne' Calderugi .

Fra gli Scrittori della Falconeria son noti quei vermicciuoli , da' quali sono infestati internamen-

te i Falconi , e che , per rassomigliarsi alle lunghe gugliate , o fili di sottilissimo refe , dagli Strozzi son nominati Filandre . Di queste Filandre io n' ho vedute moltissime volte in tutte quante le razze de' Falconi ; e sono Lombrichetti bianchi lunghi più di un terzo di braccio , e grossi quanto quella corda del violino , che diceasi il canto , e talvolta ancora più grossi , ed abitano per lo più in vicinanza de' polmoni ammassati , e aggrovigliati come in due sacchetti trasversali appoggiati ad essi polmoni , quasi che a prima vista questi sacchetti sieno due di quelle vesciche , alle quali i medesimi polmoni somministrano quell' aria , che per essi polmoni degli uccelli fa passaggio nella funzione del respirare . Se ne trova però non di rado qualcheduna vagante , e sciolta nella cavità del ventre inferiore , e si trovano tanto ne' Falconi addomesticati , e pasciuti dagli Strozzi , quanto ne' Falconi salvatici , e ramminghi . Ho usata ogni possibile diligenza per chiarirmi se , oltre i Falconi , ancora gli altri uccelli di rapina sieno infestati dalle Filandre , ma non l' ho mai rinvenuto , ancorchè io abbia in molti anni sviscerati molti Avoltoi , Sparvieri , Bozzagri , Albanelle , Nibbi , Poane , Astori , Gheppi , Aquile Reali , e Aquile Pescatorie . Vna sola volta in un Aquila Reale ritrovai alcuni pochi

pochi vermini rossi non più lunghi di quattro dita traverse in quegli spazi, che sono tra 'l Peritoneo, e le quattro paia di muscoli dell' Addomine, e stavansi quivi rannicchiati, e raggomitolati, come se si pascessero di certa poca di pinguedine gialletta, che in quegli stessi spazi si scorgea. Negl' intestini degli Sparvieri, e nel loro stomaco soventemente si acquattano Lombrichetti bianchi, sottili, e corti; Ed una sola volta sovviemmi di aver posto mente, che tutto il fegato di uno di essi Sparvieri era gremito di tubercoletti bianchi non maggiori delle vecce, e pieni di una materia simile al burro, tra la quale in ogni tubercoletto stavasi un piccolo vermicciuolo bianco. Ma intorno al ceppo delle spaziose, rilevate, circolari, e increspate orecchie d' uno di quei Barbagianni, che sono d' una razza più orecchiuta dell' altre, ed anno il rostro, e l' ugne nere, ho trovato sotto la pelle, che veste il ceppo di esse orecchie, molti, e molti Lombrichi non così lunghi, come soglion essere le Filandre de' Falconi, ma molto più corti, ed anco un poco più grossetti, a segno tale, che aperti, e viscerati poteasi manifestamente riconoscere, che per la differente fabbrica delle viscere erano d' una spezie differente da quella de' Lombrichi terrestri.

In due Pernici bianche con i piedi pennuti, di quelle, che nascono, e abitano ne' Monti Pirenei, e che erano mantenute nelle Vccelliere del Giardino di Boboli, ho osservati i loro grossi, e lunghissimi intestini ciechi abitati da molti, e molti minutissimi lombrichetti: Ho detto lunghissimi intestini ciechi, perchè ogni piccola Pernice bianca de' suddetti Monti Pirenei suole a foggia delle Pernici, e delle Starne d' Italia naturalmente avere i due ciechi intestini così lunghi, che il più lungo di essi due, essendo disuguali tra di loro, si estende alla lunghezza d' uno, e mezzo de' miei palmi, il che è considerabile in un così piccolo uccello, il quale è minore, e men pesante d' un piccion grosso; e pure il piccion grosso ha gl' intestini ciechi così corti, che appena arrivano alla lunghezza dell' unghia del dito indice d' un uomo. Ma che rammento i piccion grossi, e torraiuoli, i Colombacci salvaticchi, l' Accegge, i Corvi, le Ghiandaie, i Falcinelli, le Cicogne, i Gabbiani, o Mugnai, le Garavine, i Palettoni? se tutti gli uccelli di rapina o grandi, o piccoli, che sieno, eccettuatone i Barbagianni, i Gufi, le Strigi, o Nottole, ed altri rapaci notturni, anno cortissimi i loro due intestini ciechi? E l' Aquila Reale stessa, che è un Augello così grande, che talvolta pesa diciotto, e di-



e diciannove libbre , ed ha così lunghe l'ale , che misurate dalla punta delle penne maestre d' un ala sino all' estremità delle penne dell' altra arriva alla misura di quattro braccia , e mezzo , ed anco più , di misura Fiorentina , 'e pure i suoi intestini ciechi non son più lunghi di quel che si sieno quegli delle Colombe , e de' soprammentovati uccelli , anzi son forse più corti ancorchè un tantino più grossetti .

In un Guso trovai qualche Lombrichetto rosso per tutta quanta la lunghezza del canale degl' intestini , ma nella cloaca di essi intestini in vicinanza del forame del podice vi erano ammonticellati ; e non solamente erano nella cavità ; ma di più , alcuni se ne stavano tra tunica , e tunica di essa cloaca ; e di più , due di essi erano penetrati in un de' due canali ureteri , ogniun de' quali con la sua particolare apertura sbocca nella medesima cloaca in vicinanza delle due rilevate papille de' vasi spermatici , che metton foce ne' contorni di essa cloaca , e quivi , come in tutti gli altri uccelli , fan l' ufficio di due membri genitali , Tav. decimasettima , Fig. settima . Per tutta la lunghezza del condotto intestinale de' Pipistrelli ho qualche volta trovato di simili vermi ; ma , tanto questi de' Pipistrelli , quanto quegli del Guso non eran così lunghi come le Filandre de'

Falco-

Falconi ; anzi che appena arrivavano alla lunghezza di tre dita traverse . Molto più corti ancora di questi , e di una veramente impareggiabile minutezza erano certi altri vermicciuoli nella parte interna della pelle di un Pipistrello , ed ogniuno di essi stavasi racchiuso in una piccolissima glanduletta attaccata ad essa pelle .

Bizzarri sono i Lombrichetti , che ho una sol volta veduti sotto la pelle della Cicogna ; imperocchè sono di un colore così rosso , e acceso , che non cedono al più vivo cinabro , non più lunghi di quattro dita traverse , ne più grossi di quella corda del violino , che diceasi la mezzana , potendosi credere , che abbiano quel colore , perchè si pascano della pinguedine situata sotto la cute , la qual pinguedine nelle Cicogne è di un dorè , che pende molto al rosso , siccome rossa è ancora tutta la cute . Sei de' medesimi Lombrichetti ma un poco più grossi , e più lunghi vagavano nella cavità dell' Addomine , non meno rossi di quegli , che abitavano sotto la pelle . Nella cavità parimente del ventre de' Corvi Reali , e di quei Corvi minori , che son chiamati Cornacchie , e di quei più piccoli ancora della terza spezie , che pur son detti Cornacchie , ho osservato raggirarsi Lombrichi simili a quegli delle Cicogne , con la differenza però , che questi de' Corvi , ancorchè

chè fossero della stessa grandezza, e figura, non erano rossi come quegli delle Cicogne, ma bensì bianchi lattati, e pieni di un fluido trasparente, in cui, scorgevasi a nuoto le viscere.

Le ugne, siccome ancora il rostro di tutti gli uccelli, se sieno cotte nell'acqua, si separano facilmente da quella dura guaina, nella quale l'osso del rostro, e delle ugne se ne sta naturalmente inguantato. Va' Aquila decrepita stata lungamente in un ferraglio avea fuor di misura ingrossate le dita, ed il tarso del piede destro, tutto pieno di grossi, e rilevati bitorzoli. Morì finalmente di suo male, o di vecchiaia; e osservato quell'ingrossamento del piede, conobbi, che internamente tutti quei bitorzoli erano pieni di minutissimi, e quasi invisibili vermicciuoli gialli, i quali col rodere si erano anco aperta la strada a penetrare fra la guaina, e l'osso dell'ugne a tal segno, che l'osso scorgeasi tutto quanto, per così dire, tarmato, e traforato.

Gli uccelli acquatici non anno nel loro Esofago quel gozzo, che vi anno i Galli, e tutto il genere gallinaceo, le Pernici, le Starne, ed altri simili; e nel genere de' Rapaci lo Sparviere, il Falcon pellegrino, e l'Albanella. Ma se gli uccelli acquatici son privi del gozzo, non son già privi di quelle tante, e tante glandulette, delle qua-

le quali internamente è corredato l' Esofago di tutti gli altri uccelli , la dove esso Esofago si avvicina ad unirsi allo stomaco , e che spremute esse glandule versano un fluido molto necessario al lavoro della macerazione , e digestione del cibo inghiottito . Queste glandule in alcune razze di uccelli son più folte , in altre razze son più rade , in alcune son minutissime , e quasi non rilevate dal piano , e in altre razze son più grosse , e con le loro bocchette , e canaletti si veggon molto dalla superficie dell' Esofago rilevate . Tra gli Esofaghi più doviziosi di tali glandule , dovizioso-ssimo si è l' Esofago di quell' uccello acquatico , che da' Cacciatori di Toscana , per esser egli bianchissimo con qualche fregio di penne nere , e col ciuffo in testa parte bianco , e parte nero vien chiamato col nome di Monachetto ; di cui si può veder la figura pulitamente delineata appresso *Francesco Villughbeio* nella Tav. sessagesimaquarta della sua Ornitologia al titolo *Albellus*. Disli che l' Esofago ne è dovizioso-ssimo : Imperocchè avvicinandosi allo stomaco ingrossa grandemente le sue pareti per la lunghezza di tre buone dita traverse , e tale ingrossamento vien cagionato dalle soprammentovate innumerabili foltissime glandulette . Nelle pareti esterne glandulose dell' Esofago di questi uccelli appellati Monachetti ho veduto

duto alcune volte rilevarsi nello spazio , che è di mezzo tra 'l muscolo , e la membrana glandulosa , certi tubercoletti biancheggianti , che da me gentilmente separati , e tratti fuora , sono stati trovati aver la figura simile ad un fiaschetto col collo , la di cui bocca fosse divisa in due ritonde aperture , per una delle quali pareva , che un vermicciuolo cavasse fuora soventemente la sottilissima sua testa : E veramente sdruciti per lo lungo quei tubercoletti vi ho trovato sempre in ciascuno di essi un verme sottilissimo nel capo , e nella coda , ma molto tronfo , e grosso nel ventre ; e sta colà dentro raddoppiato in modo , che per una apertura della bocca del fiaschetto può cavar fuora la testa , e per l'altra apertura può cavar fuora la coda per isgravarsi degli escrementi . Il fiaschetto , o borsetta contenente il verme è bianco di pareti grosse , e forti , e internamente tutte piene di piccole fossette con qualche somiglianza a quelle delle auricole del cuore . In essa borsetta , o fiaschetto non ha il verme internamente alcuna attaccatura , o connessione , ma vi sta totalmente sciolto . Nell' interno del verme agli occhi miei non è stato possibile osservar per la minutezza , che il canale degli alimenti tutto pieno di una materia nericcia , ed un lungo , ed intrigato avvolgimento di sottilissimo , e bianco

V  
filo

filo , che non può esser altro che l' arnese appartenente alle cose della generazione, Tav. ventunesima, Fig. decima. Di simili vermicciuoli racchiusi in quei mentovati tubercoletti dell' Esofago ne ho veduti una sola volta in due di quei Merghi , o Marangoni , che soglion pesare intorno alle quattro libbre , ed in Toscana dall' avere il rostro fatto a foggia di sega son detti Segaloni , o Seroloni , ed in Venezia si appellano Serole , e son quegli stessi , che dal Gesnero furono appellati col nome di *Mergus Longiroster* .

Nella Cloaca intestinale de' Maschi delle Garze bianche sbocca l' intestino retto con una particolare apertura ; vi sboccano parimente quattro rilevate papille situate in mezzo cerchio ; delle quali le due del mezzo sono molto maggiori delle due laterali ; e le due maggiori non son altro , che le due papille de' canali ureteri ; e le due minori sono i due membri genitali , de' quali son corredati tutti gli augelli . Queste quattro papille si trovano situate in mezzo cerchio sull' orlo di una apertura ritonda , e molto maggiore di una lente , e tale apertura introduce in una cavernetta totalmente nel suo fondo ferrata , e senza veruna riuuscita , ed è quella stessa che prima fu osservata da *Girolamo Fabbrizio* nelle Galline , ed a' nostri tempi da *Regnero de Graaf* ne' Galli . In questa

questa cavernetta delle Garze due volte mi sono imbattuto a trovar molti vermicciuoli bianchi altamente appiccati alle sue pareti ; Ma se ciò due sole volte è seguito , molte , e molte altre mi è avvenuto di trovar di simili vermi ammucchiati nella cavità di tutto il lungo canale degli intestini delle medesime Garze a tal segno , che non di rado anno passato il numero di cento ; ed essendo bianchi lattati stannosi così altamente appiccati con la bocca alle pareti interne della cavità del canale , che difficilmente se ne possono staccare senza lacerazione o dell' intestino , o de' vermi stessi , e sono così bizzarri , che di quando in quando a loro piacimento mutano figura , come si può vedere nella Tav. ventunesima , Fig. nona , dove sono delineati al naturale .

In tutte quante quelle moltissime Murene , che da me sono state considerate nel corso di molti anni ne' mesi di Dicembre , di Gennaio , di Febbraio , di Marzo , e di Aprile , in tutte quante , senza eccettuarne veruna , ho sempre veduti minutissimi vermicciuoli vivi , racchiusi dentro ad alcune vescichette , o tubercoletti giallognioli , i quali tubercoletti appariscono di differenti figure , essendo altri ritondi , altri ovati , altri lunghi , ed altri ritorti in foggia della lettera S ; E si trovavano piantati senz' ordine veruno sotto la tunica

esterna dello stomaco , e per tutta quanta la lunghezza esterna degl' intestini , e per tutto quanto il fegato , e ne' muscoli ancora di tutto quanto il ventre tra lisca , e lisca ; e talvolta tra tunica , e tunica della vescica urinaria ; e talvolta ancora piantati nella tunica esterna delle ovaie di esse Murene ; delle quali ovaie insieme con la vescica urinaria , si può veder la Figura nella Tav. decimaottava , Fig. prima , ancorche non vi sienò delineati i tubercoletti , che racchiuggono i vermi. Il celebre *Marco Aurelio Severino* nella quarta parte della *Zootomia* osservò nelle Murene questi tubercoletti , o vescichette , ma gli vide solamente negl' intestini , e non pose mente , che racchiudessero de' vermi : anzi credette , che fossero semplici glandule *supplentes fortasse anfractus* , per servirmi delle sue stesse parole . Di simili tubercoletti verminosi ne ho scoperti qualche volta ancora ne' Gronghi , ma non già universalmente in tutti , come , senza eccezione veruna mi è avvenuto in tutte le Murene . Sovvienmi , che in un Grongo , che pesava trenta libbre ; osservai , che intorno intorno alla vescica urinaria si alzavano grandi ammassamenti di quei tubercoletti tutti bianchi , chiari , e trasparenti , altri ritondi grossi come ceci , altri come granelli di pepe , altri come granelli di miglio , altri lunghetti , e simili  
a' gra-



a' gránelli di grano , e d' orzo ; altri lunghi quanto un pollice traverso , altri più lunghi di quattro dita pur traverse , e grossi quanto una penna dell' ale de' Capponi , e non solo si vedevano all' intorno della vescica urinaria , e sul ramo maestro de' inolti , e molti canali ureteri , e su' reni stessi la dove si uniscono in un sol corpo , e tra tunica , e tunica della vescica piena di aria , e tra tunica , e tunica di tutto il canale degli alimenti , e del Mesenterio . Per lo più questi tubercoletti anno due tuniche , e son pieni d' un' umore acquoso chiaro ; ed un poco viscosetto , dentro al quale umore stassi un verme bianchissimo . In somma questi tubercoletti son simili a quegli delle Murene con questa sola differenza , che quegli delle Murene gialleggiano , e questi de' Gronghi son bianchissimi , e l' umore in essi contenuto è un poco più viscosetto nelle Murene di quello che si sia ne' Gronghi , Tav. decimaottava , Fig. quarta .

In tutte le razze dell' Anguille , cioè nelle Anguille fine , nelle Anguille paglietane , ne' Gavonchi , e ne' Musini ho soventemente , ma non sempre , scoperto ne' loro intestini alcuni minutissimi vermi bianchi , ed alcuni neri , i quali stanno per lo più profondamente addentati , e fitti con una delle loro estremità nella tunica interna

terna di essi intestini . Osservati questi vermi col Microscopio , si veggion fatti in figura di un cono , nella di cui base è situata la testa , dalla quale soventemente soglion cavar fuori , e ritirare in dentro una proboscide , o corno con la superficie , per diverse piccolissime punte , ineguale , o per dir meglio , spinosa .

Quel pesce di Mare , che da' Pescatori Livornesi è chiamato Pesce Argentino , per aver la pelle senza scaglia veruna , liscia , di color d' argento , velato di mavè , io credo , che sia un pesce della spezie delle Sfirene . Nell' osservare uno di così fatti Pesci Argentini , che pesava otto libbre , ed era lungo quasi due braccia , e tre quarti , trovai in una cavità del ventre inferiore starvi otto animaletti vivi ; bianchi nella testa , e nel busto ; e gialli nel restante del lor corpo , e non molto dissimili da quelli soprammentovati degl' intestini dell' Anguille . Si scorciavano questi animaletti , e si allungavano come le Lumache ; e come le Lumache appunto aveano la testa armata di quattro cornetti , o per di meglio , di rampini duri , e forti ; e con essi rassiccavansi così fortemente alle pareti interne di quella cavità , nella quale si stavano rinchiusi , che non mi fu possibile farne staccare certuni senza tagliar con le forbicette quella parte della cavità , che  
adden-

addentavano . Quando spontaneamente si allungavano, stendevansi per la lunghezza più di quattro dita traverse ; e rientrando in loro , e scorciandosi divenivano più corti di un pinocchio mondato : E questi sono quegli stessi vermi dello stesso Pesce Argentino , de' quali favella Monsig. Niccolò Stenone nel volume secondo degli Atti Danici Osserv. ottuagesimanona : imperocchè fin l' anno 1666. quella Osservazione del Pesce Argentino da quel Dottissimo Prelato fu fatta nelle mie stanze in Livorno mentre vi era la Corte , e son queste le sue parole . *Circa finem intestini recti latebant intra abdomen plura animalcula conchilijs hianthinis a Fabio Columna descriptis similia , nisi quod testis carent .*

In un' altro Pesce Argentino maggiore del suddetto , che pesava dieci libbre , e si stendeva alla lunghezza di tre braccia , e un ottavo da me osservato l' anno 1674. non erano nella suddetta cavità i mentovati vermi , ma bensì in tutta quanta la cavità del ventre inferiore , e ne numerai più di cinquanta totalmente bianchi , e di differenti grandezze ; e stavansi sdraiati , e appiccati a lor piacimento altri sopra il fegato , altri sopra lo stomaco , e sopra tutto 'l canale degli alimenti , ed altri sopra i lunghissimi testicoli , ed altri totalmente si appiattavano sotto la prima tunica,

tunica, e dello stomaco, e degl' intestini, e del fegato. Oltre i suddetti vermi stavansi pure nella cavità del ventre inferiore azzannando le viscere molti altri minutissimi vermicciuoli di testa bianca, e nel restante del corpo di color ranciato di figura simile a' Lombrichi, se non che il lor capo era grossetto, e di figura Romboidale. Di più nella medesima cavità del ventre inferiore vagavano più di dugento Lombricuzzi bianchissimi non più lunghi di due dita traverse; Ne solamente vagavano per la cavità del ventre, ma alcuni stavano altresì sotto la prima tunica delle viscere: Tutti quant'erano vivi, siccome lo erano parimente le altre due razze, ancorchè fossero passati due giorni interi dalla morte del pesce; ed erano così fieri, che continuarono a campar tre altri giorni, dopo che gli ebbi cavati fuor del ventre, e adagiati in un piatto con le viscere del pesce medesimo; Onde in questo tempo ne misi alcuni a nuotare nel vino; e quei grossi della prima spezie vi camparono due buoni terzi d' ora; e poscia rannicchiati morirono; siccome in meno d' un terzo d' ora morirono quei ranciati della seconda spezie; ma i Lombricuzzi vi si mantennero manifestamente vivi più di dieci ore. Di simili Lombricuzzi se ne trova alle volte piena l' interna cavità fatta a chiocciola dell' intestino di

no di quel pesce, che da noi Toscani vien chiamato Gattuccio, e dall' *Aldovrando* fu descritto sotto nome di *Catulus*.

Il Peritoneo della Vipera marina è doppio; e forma come un gran sacco, la di cui bocca rivolta verso la coda è larghissima. Tal sacco internamente ancor esso è doppio per una membrana, che, quasi un tramezzo, lo divide per lo lungo in due. Nel fondo di uno di questi sacchi del Peritoneo sta nascosta la milza lunga quattro dita traverse, e alquanto più grossa d'una grossa penna da scrivere, che tale appunto l'ho veduta in una Vipera marina, che pesava trentaquattro once, ed era lunga due braccia, e un terzo. Sù questa milza s'inalzavano alcune vescichette, ciascuna delle quali racchiudeva un piccolissimo Lombrico ravvolto a chiocciola. Di simili vescichette appariva tempestato tutto il Peritoneo, e più soltamente la dove la destra, e la sinistra membrana di esso si attaccano allo stomaco. In molte altre Vipere marine, che in molti anni ho notomizzate, non ho mai più rinvenuti così fatti vermi del Peritoneo, e della milza. Ho ben veduto molte volte ne' mesi di Gennaio, e di Febbraio, e di Marzo, che i loro intestini sono pieni di una certa poltiglia bianchiccia, e gialleggiante, grossa, e consistente, come un latte vici-

X

no al

no al quagliarsi , la qual poltiglia , quando è cotta nell' acqua , si condensa con qualche somiglianza all' albume dell' uovo cotto pure nell' acqua. In essa poltiglia si trovano frequentemente certi vermicciuoli sottilissimi lunghetti , e trasparenti , come se fossero di chiarissimo cristallo , eccetto che in una parte del lor corpo , nella quale si ravvisano certi minutissimi filamenti bianchi aggrovigliati , ed aggruppati insieme .

Nell' interna ultima estremità dell' intestino retto di un piccolo pesce Spada , che pesava intorno a venticinque libbre , ho trovato molti vermi bianchi lattati , di grossa testa , lunghi quattro , o sei dita traverse , e grossi quanto una delle più sottili penne da scrivere , della figura disegnata al naturale nella Tav. decimanona, Fig. prima . Alcuni di tali vermi non solamente si acquattano , e si raggirano dentro l' intestino ; ma di più , avendolo in più luoghi traforato , se ne stanno con una estremità racchiusi nell' intestino medesimo , e con l' altra estremità son penetrati nel concavo dell' Addomine . E quando son vivi ad ogni momento mutan figura , si allungano , si scortano , si allargano , si spianano , si ristringono , e si assottigliano .

In un altro pesce Spada non solamente mi sono imbattuto a veder simili vermi ; ma di più su quella

quella tunica , che a guisa di guaina , o di sacco , racchiude entro di se tutta la massa del canale degl' intestini , trovai una volta alzati molti tubercoletti , ciascuno de' quali conteneva un minutissimo vermicciuolo bianco , che veduto col Microscopio rassomigliava ad un piccolo Lombri- co terrestre pelofo . Di tali tubercoletti verminosi , ma più piccoli assai ne vidi scabrosa quella borsetta , che pende , per così nominarlo , dal membro genitale di questo medesimo pesce . Imperocchè questo , che ho chiamato membro genitale del pesce spada , è lungo otto , o dieci dita trasverse , più , o meno secondo la grandezza del pesce : Egli è di sostanza durezza come se fosse cartilaginoso , internamente tutto scanalato , in una dell' estremità chiuso , e nell' altra aperto con manifesta apertura : Poco men che nel mezzo si ripiega ; e forma una borsetta , la qual borsetta racchiudesi dentro ad un globo di sostanza quasi glandulosa . La borsetta , ed il canale tutto del membro soglion per lo più essere pieni di una materia non dissimile dal latte Tav. decimanona , Fig. terza .

Vn grossissimo Pesce marino della razza degl' Aselli , lungo un braccio , e mezzo , avea per la lunghezza dell' intestino duodeno una linea di nove conserve pancreatiche , o nove intestini ciechi ,  
 X 2 che

che gli vogliam dire . L' intestino cieco di mezzo era il più lungo di tutti , e gli altri laterali si facean sempre tanto più corti quanto più da quel di mezzo si allontanavano . In questi così fatti intestini ciechi trovai alcuni vermi vivi bianchi piani, lunghi sei dita traverse , e larghi quanto sarebbe larga l'ugna del dito minore della mano di un fanciullo ; e come quegli dell' intestino retto del pesce Spada , si allungavano , e si scorciavano a lor voglia , e si accomodavano , e si spianavano in diverse , e strane figure , talvolta circolari in figura di un giulio ; talvolta rappresentavano la figura del pesce Sogliola ; talvolta quella di una fiaschetta col collo bene spianata , e talvolta molte altre figure capricciose , e bizzarre . Tav. ventunesima , Fig. prima ; seconda , terza , e quarta . Nell' intestino retto di questo medesimo pesce stavansi rammucchiati due gran gruppi , o matusse di Lombrichi lunghi , e ritondi , che nel ventre sembravan grossi quanto una penna dell' ala d' un colombo torraiuolo , e verso la testa , e la coda andavano sempre proporzionalmente assottigliando fino a terminare in tutt' a due l' estremità in sottigliezza della punta d' un' ago ordinario da cucire . Apparivano di differenti lunghezze , ed i più lunghi arrivavano a due braccia , e con lo stirargli gentilmente con le mani si potevan disten-



distendere fino a quattro braccia : E se dopo stirati si lasciavano in libertà tornavano alla naturale lor positura. Certuni di questi posti nell'acqua marina, o nell'acqua dolce di fontana vi si conservarono vivi per lo spazio di dodici ore , e quel che rassembra più curioso si è, che lasciarono quella ritondezza , che pareva naturale , e divennero piani , ed assai bene larghi . Certaltri messi sopra d'un foglio , in capo a dodici ore si trovarono quasi totalmente asciutti , e rassembravano macchiati d'infiniti , e foltissimi punti neri : Ma rimessi nell'acqua , dopo quattr' ore , cominciarono a muoversi , e a divincolarsi dando segni più che manifesti di esser ancor vivi , e lasciarono quella nera punteggiatura . In un altro Pesce simile , non solamente vidi i medesimi vermi negl' intestini ciechi , e nell' intestino retto , ma di più nella cavità più bassa del duodeno la dove nello spazio di mezzo tra il più corto intestino cieco , e il vicino al più corto , mette foce il canal del fiele , ne trovai una gran mataffa , che sviluppata , e contati i vermi , arrivarono al numero di trentaquattro . Tav. ventunesima , Fig. quinta .

Quel pesce , che da' Pescatori Livornesi , e Provenzali è chiamato Nocciuolo è un pesce cartilagineo della spezie de' Cani , e talvolta è così grande , che arriva col suo peso alle trecento libbre.

bre . Vno di questo peso era lungo sei braccia ; ed il di lui fegato , che distendendosi in due lobi , che mettendo in mezzo lo stomaco camminano per tutta la lunghezza di esso stomaco , era nella superficie esteriore tutto pieno di vermi simili a queglii degl' intestini ciechi dell' Afello ; e quivi sopra tutt' a due i lobi stavano sdraiati , e sovente ancora a lor piacimento rannicchiati , ed avevano così tenacemente con la bocca azzannato esso fegato , che piuttosto , che volere staccarsi dal morso , lasciavansi strappare , e tagliare in minutissimi pezzi .

Ne' nostri Mari pescasi, ancorchè di rado, un certo pesce , che da' Pescatori Livornesi chiamasi pesce Tamburo , il quale , s' io non m' inganno , può ridursi [ benchè con qualche piccola differenza ] alla specie di quello , che dal *Salviano* fu nominato *Mola* , e dal *Rondolezio* fu detto *Ortragoriscus* ; ed in vero che nell' esterna figura del corpo molto si rassomiglia alle Figure , che ne portano questi due Autori , e con essi l' *Aldrovando* , e il *Ionstano* . Vn tal pesce fin l' anno 1674. mi fu donato dal Sereniss. Granduca Cosimo Terzo mio Signore , mentre nel cuor dell' Inverno io mi trovava nella deliziosa amenissima Villa di Castello . Arrivava col suo peso alle cento libbre , tutto coperto di pelle aspra ruvida simile a quella degli Squadri,

Squadri, delle Centrine, e di altri simili pesci Cartilaginei. Quattro sole erano le pinne, coperte, e vestite da quella stessa pelle ruvida, che vestiva tutto il restante del corpo; e le due minori di esse situate accanto a' due forami delle branchie. Delle due maggiori l'una era piantata quasi nel mezzo del dorso, e l'altra nel ventre inferiore in vicinanza del Podice. Nell'estremità posteriore, che termina larga quanto è la larghezza maggiore di tutto il ventre non vi era pinna veruna, ne, per così dire, contrassegno di coda. Due erano i forami delle branchie, uno per banda. Sotto ciascun forame nascevanfi quattro grandissime branchie accompagnate da una molto minore dell'altre quattro. La bocca più che piccola in riguardo alla sterminata grandezza dell'animale, è veramente così piccola, che una Torpedine, che non arrivava al peso di sette libbre avea lo squarcio della bocca il doppio più grande della bocca di questo pesce Tamburo. Nelle mascelle superiori per dinanzi in vece di denti stava radicato, in mezzo cerchio, un solo osso tagliente, ed un altro simile osso nelle mascelle inferiori. Nelle fauci in vicinanza dell'imboccatura della gola si alzavano molte spine assai ben lunghe acute ricurve pungentissime, e durissime. Lo stomaco appariva poco mag-

maggior della grossezza degl' intestini , i quali intestini , avendo pareti sterminatamente grosse , si allungavano alla misura di otto braccia , e ravvolti in più giri chiudevansi in un sacco , o guaina , conforme di sopra ho accennato degl' intestini del pesce Spada . Tutto lo stomaco , e tutti gl' intestini gli trovai pieni , pienissimi di una poltiglia bianca senza verun' altro contrasegno di cibo , o di escrementi . In quella poltiglia bianca stavano impantanati venti vermi di color bianco sudicio con figura similissima a quella de' vermi dell' intestino retto del pesce Spada ; con questa differenza però , che questi del pesce Tamburo erano quattro volte maggiori di queglii , ed aveano l' estremità della coda biforcata , scorgendosi , tra l' un rebbio , e l' altro della forca , manifestamente l' apertura del podice , nella quale terminava di questi vermi l' intestino , nel di cui canale , siccome ancora nello stomaco stagnava un poca di quella poltiglia bianca , in cui impantanavansi i vermi . Le estremità de' due rebbi della coda ancor esse erano aperte , ed in esse terminavano due rami de' canali spermatici . Ne' maschi questi due rami erano più lunghi di queglii delle femmine , e nelle due estreme guaine chiudevano due membri genitali molto appuntati , siccome l' ultime due guaine

guaine delle femmine terminavano pure nè due rebbi della coda forcata con manifeste aperture; e prima che il lor tronco principale si diramasse in due rami, dilatavasi in una cavità ovale tutta piena di minutissime uova.

Il cuore di questi vermi appariva di figura rozza-mente esagona, e dall' alto di esso nasceva l' Aorta, che poco dopo diramatafi in tre rami col ramo principale si attaccava all' interno della cavità di tutto il ventre, e ad essa sempre attaccata si rivolgeva a scendere verso la coda, e qui vi giunta, allargandosi in una cavità simile ad un nodo; si univa con la vena cava; e la vena cava serpeggiando attaccata sul dorso del canale degli alimenti saliva, per così dire, a metter force nel cuore. Tav. ventesima, Fig. prima, seconda, terza, e quarta.

Sette canali, o sacchi, o borse con la bocca aperta, e sciolta si mirano dentr' al ventre del pesce Seppia femmina volgarmente detta Pesce Calamaio: Ma nel ventre de' Calamai maschi cinque soli di quei canali, o sacchi si trovano. I primi due canali del maschio, sono l' intestino, e la borsa dell' inchiostro; ed anno le loro estremità unite insieme, che terminano, e sboccano nel podice; e son messi in mezzo da due altri sacchi membranosi, che anno connessione con le

Y

bran-

branchie. Il quinto sacco, che, s'io forse non m'inganno, appartiene all'ufizio della generazione, racchiude dentro di se un corpo bianco fredo, e lungo almeno quattro dita traverse, e grosso poco men d'una penna da scrivere, e avvolto in più giri. Oltre di tal corpo, questo mentovato quinto sacco racchiude ancora dentro di se un altro piccolo sacchetto con un canale avvolto ancor esso in più giri, pieno di una materia bianchissima, e viscosa. Tutto il restante della capacità del sacco maggiore, è piena, pienissima, zeppa d'infiniti corpicelli bianchi non attaccati a cosa veruna, ma sciolti, e separati l'uno dall'altro, quasi che sieno tanti vermicciuoli lunghi poco men di due dita traverse, ed assai sottili. Considerati coll'aiuto del Microscopio paiono in una delle due loro estremità ferrati: Nell'altra estremità sono aperti, e dall'apertura scappa fuori spontaneamente un canale trasparentissimo, dentro al quale si scorge un corpicciuolo lungo serpeggiante, e bianco. Tav. seconda, Fig. seconda: E ciò avviene non solamente in tutti quanti i maschi delle Seppie, ma altresì in tutti i maschi de' Polpi, ed in tutti quegli parimente delle Lolliginj, che per altro nome da noi Toscani, con vocabolo più simile all'origine greca, son chiamati Totani. Ne' Polpi ne ho trovati de'  
molti

molti grossi , e lunghi più di quattro , ed anco più di sei dita traverse , che nella parte loro più grossa appariscono bianchi lattati , e nel restante diafani , e se si cavan fuora del loro sacchetto , si scorge in essi qualche oscurissimo moto , ma facile all' ingannare . Se si mettono a nuoto nell' acqua dolce , gettano ancor essi per una delle loro estremità un lunghissimo , sottilissimo , e bianchissimo filo , che si avvolge in molti , e molti giri , e s' intriga a foggia di una scompigliata matassa di refe aggrovigliato ; Ma se si mettano in acqua salata , non sogliono produrre tale effetto . Di quel che sieno , debbo favellarne nella seconda Parte . Per ora basti il dire , che il Volgo de' Pescatori , porta credenza , che l' Anguille sieno partorite dalle Seppie , da' Totani , e da' Polpi : E per confermazione del suo credere , non distinguendo i maschi dalle femmine , mostra nelle Seppie , ne' Totani , e ne' Polpi questo sacco pieno di vermicciuoli , e dà loro il nome di Anguilline . Ma queste sono baie , e novелlette da Vecchierelle .

I Polpi anno il canale degli alimenti fabbricato con molta somiglianza a quello degli uccelli ; imperocchè l' apertura della bocca è armata di un rostro nero , simile al rostro di un Perrocchetto , o di un Pappagallo ; L' Esofago è guernito del

gozzo , il ventriglio è muscoloso , e di pareti grossissime , e sotto il ventriglio pende dall' intestino , un altro intestino , o appendice cieca . In un grossissimo Polpo femmina , che pesava diciotto libbre , della razza di queglii , che anno solamente cinque gambe , e non otto , osservai che il ventriglio era tutto esternamente bernoccolato , ed ogni bernoccolo racchiudeva un verme bianchissimo , e vivo , di figura piana , con una poca di codetta in una delle sue estremità . Tra le carni ancora del ventre apparivano de' medesimi bernoccoli , che racchiudevano la medesima razza di vermi , la figura de' quali fatta nella natural grandezza si può vedere nella Tav. vigesima-terza , Fig. prima , dove , per chi ne avesse curiosità , ho aggiunto la Figura di tutto 'l canale degli alimenti non solo del Polpo , ma ancora della Seppia , e del Totano .

In un Dentice , in una Ombrina , ed in un grossissimo Grongo non solamente trovai verminoso tra tunica , e tunica tutto il canale degli alimenti ; ma trovai altresì de' vermini tra tunica , e tunica di quella vescica piena di aria , che la natura ha conceduta ad una gran parte de' pesci tanto d' acqua dolce , che di acqua salata , la qual vescica da' Pescatori , con molta ragione , è chiamata il nuotatoio ; imperocchè in vero ella è di gran  
gran



gran giovamento al nuoto di quei pesci, che ne sono corredati, ed al loro reggersi a galla, ed al loro ruotarsi a lor voglia, ed allo scendere, ed al salire nell'acque. Nel nuotatoio parimente d'una grossissima Anguilla trovai una volta alcune vescichette, ciascuna delle quali avea un verme non di quegli osservati negl'intestini delle medesime Anguille, ma bensì di quegli, che si assomigliano alla razza de' Lombrichi: e perchè *Girolamo Cardano* nel suo *Libro della varietà delle cose* affermò positivamente, che l'Anguille son prive di tal vescica piena d'aria, perciò mi farò lecito qui appresso il descriverla.

La vescica, o nuotatoio, dell'Anguilla è composta di due tuniche proprie, e di una terza tunica comune all'altre viscere, ed è quella stessa, che deriva dal Peritoneo. Delle due tuniche proprie l'esterna riceve molti, e molti serpeggiamenti di vasi sanguigni, il che avviene ancora internamente nella tunica propria interna, le pareti della quale son tempestate di minutissime glandule miliari, e particolarmente intorno alle radici di quel canale, che da questa vescica dell'aria va a sboccare nell'Esosfago in vicinanza dello stomaco. Ella è di figura, quasi che dissi, di un fuso con l'estremità assai grosse, ed ottuse. L'estremità superiore termina poco sotto il  
fegato

fegato in quell' angolo , che fanno lo stomaco , e l' intestino ; e l' estremità inferiore finisce in quell' angolo , che fanno i due reni la dove in un sol corpo si uniscono insieme . Alcune poche volte ho trovato dentr' a questa vescica un'altra vescichetta minore della stessa figura appunto della sua maggiore , e corredata anch' essa di molte ramificazioni sanguigne , e d' infinite minutissime glandule .

Dal mezzo di tutte le vesciche , o nuotatoi dell' Anguille esce un canale assai largo composto di una membrana trasparente , e più sottile di quelle , che compongono la vescica stessa , il qual canale uscendo , come ho detto , dal mezzo della vescica , cammina sopra di essa , ed alle sue esterne pareti attaccato sino a quella estremità superiore , che termina nell' angolo , che fanno lo stomaco , e l' intestino ; quindi assottigliandosi , e ristringendosi , va a metter capo nell' Esofago in vicinanza dello stomaco ; e per esso canale può uscire , ed entrare l' aria .

Dove questo canale suddetto esce dalla vescica , si veggono in essa vescica due corpi rossi quasi semiritondi , i quali con le loro estremità tendinose vanno a formare le due tuniche proprie della vescica , e ricevono vasi sanguigni portanti , e riportanti il sangue ad essi corpi .

Ma

Ma se il *Cardano* s'ingannò nel credere, e nello affermare, che l' *Anguille* non avessero la vescica dell'aria, s'ingannò altresì nel darfi ad intendere, che tutte quante le altre generazioni de' pesci fossero corredate di così fatta vescica: Imperocchè egli è vero sì, che molte generazioni la hanno, ma e' ve ne sono alcune, le quali ne sono totalmente prive.

Tra quei pesci, che ho osservati, ho rinvenuto averla il *Grongo*, il quale ha la vescica d'aria figurata per appunto come quella dell' *Anguille*, averla altresì la *Murena*, la *Vipera di Mare*, la *Sfrena*, il pesce *Spada*, l' *Ombrina*, il pesce *San Piero*, l' *Organo*, la *Gavotta*, tutte le sorti di *Rondini*, di *Tordi*, e di *Merli di Mare*, la *Minchia di Re*, la *Sardina*, l' *Ago primo del Rondelezio*, l' *Ago di Aristorile*, ovvero *Ago secondo del medesimo Rondelezio*, il *Nasello*, il *Dentice*, il *Barbio*, la *Lasca*, la *Tinca di Lago*, e di *Fiume*, la *Tinca di Mare*, la *Reina*, la *Scarpa*, il *Carpione*, la *Trota*, la *Cheppia*, il *Luccio d'acqua dolce*, e d'acqua salata, il *Pesce Perso*, il *Lucertolone marino*, e molti, e molti altri ancora, che cosa troppo lunga farebbe a voler numerare. Tra quei pesci, che ho trovati non aver tal vescica, o nuotatoio, sono la *Lampreda*, la *Triglia*, l' *Acciuga*, la  
Ragana

Ragana per altro nome detta Dragone Marino, la Palamita, il Pesce Tamburo, il Pesce Prete, che Vranoscopo dagli Scrittori si appella, il Delfino, lo Squadro, il Pesce Porco per altro nome detto Centrina, l'Aquila, o Pippistrello, tutta quanta la generazione delle Razze, la Torpedine, la Ferraccia, la Rana pescatrice, il Pesce Spinello, che Galeus spinax dagli Scrittori si chiama insieme col Nocciuolo, che Galeus levis vien detto, il Pesce Gattuccio, il Cane carcaria, ed in una parola tutte le forte de' Cani Marini, lo Scorpione maggiore, il Ghiozzo d'acqua dolce, ed altri. E siccome altri Pesci anno il nuotatoio, o vescica d'aria, ed altri ne sono totalmente privi, così vi è molta differenza tra essi nuotatoi; conciossiachè alcuni nuotatoi anno una sola cavità, o ventre, come quegli dell'Anguile, de' Gronghi, delle Murene, delle Spade, delle Trote, delle Cheppie, degli Aghi, de' Lucci, de' Tordi, de' Merli, delle Sirene, de' Dentici, de' Naselli, delle Tanude, de' Pesci Persi. Altri nuotatoi anno due cavità, o ventri, come quegli del Barbio, della Lasca, della Tinca di acqua dolce, della Reina, del Carpione, della Scarpa, e del Pesce Rondine. Altri nuotatoi son distinti in tre cavità, o ventri, come quegli della Tinca di Mare, della Gavotta, e del Pesce chia-

chiamato Organo. In una sola sorta di pesci trovai fin l'anno 1667 il nuotatoio distinto in quattro cavità; da tre delle quali cavità si spiccava un canale, e questi tre canali uniti poscia in un solo mettevano foce nel principio dello stomaco. Che sorta di pesci fosse questa, non era noto a veruno de' Pescatori; anzi tutti quei di Livorno, e della Riviera di Provenza confessavano di non aver mai veduti de' simili: e per esser tutti per di fuori tinti di un color d'oro seminato di macchie rosse gli chiamavano Pesci d'oro, e credevano, che potessero forse ridursi alla specie de' Tordi, ma veramente ad osservargli con diligenza erano molto differenti da essi Tordi: Di più la loro bocca era totalmente sdentata, e pel contrario il Pesce Tordo ha non solamente quaranta acutissimi denti nelle mascelle, ma intorno all' Esofago ha per lo più in circa settanta altri denti. In oltre nel Pesce Tordo non pendono intestini ciechi, o canali pancreatici, che gli vogliam chiamare, dall'intestino duodeno; ma in questi Pesci d'oro pendevano quattro intestini ciechi d'ordinate disuguali lunghezze, Tav. sesta, Fig. prima, Tav. terza, quarta, e quinta.

Il dottissimo, ed esperimentatissimo *Gualtieri Needam* nel suo utilissimo, e diligentissimo *Libro de formato fœtu* scrive, che quei pesci, ne quali

Z

si tro-

si trovano le mascelle armate di denti, anno la vescica dell' aria con una sola cavità; e pel contrario quei pesci, che anno le mascelle sdentate, anno la vescica dell' aria in due cavità spartita. E' vero, io nol nego, che la Tinca, la Reina, la Scarpa, la Lasca, il Barbio, ed altri simili pesci, che non portan denti radicati nelle mascelle, ma situati bensì nella volta carnosa del palato, o in alcuni offetti posti all' imboccatura dell' Esofago, anno la vescica dell' aria con doppio ventre; ma e' vi sono ancora de' pesci dentati nelle mascelle, i quali anno una tal vescica di ventre doppio, come si può vedere nel Pesce Rondine, nella di cui bocca due ordini di denti si trovano, e come pel contrario si può osservare nella Cheppia, o Laccia, la quale è guernita d' una vescica avente una sola cavità, e pure le mascelle della Cheppia non solamente sono sdentate, ma è sdentato altresì tutto quanto il palato, e tutte le parti vicine all' imboccatura dell' Esofago, ed in somma la Cheppia non ha dente veruno, se non si volesse dire, che sull' estrema punta de' suoi labbri superiori, si sente al tatto, e malamente si scorge una poca di ruvidezza a foggia di sega. Di più il Pesce Perfo ha la vescica dell' aria con una sola cavità, e pure ha le mascelle lisce, e totalmente senza denti; ancorchè l' estremità de' labbri  
fia

sia tempestatà di finissimi, e piccolissimi denti, de' quali ne son parimente tre filari nel mezzo del palato, ed altri ne sono verso il fine del palato medesimo; e tutta la parte ancora delle branchie, che sta volta verso il palato, è aspra per cagione d' altri minutissimi denti, e trovansi in vicinanza della foce dell' Esofago due ossetti romboidali aspri, e dentati, e non dissimili da' quegli, che si trovano nelle Tinche.

Alcuni nuotatoi, o vesciche piene d' aria anno le tuniche più grosse, altri nuotatoi le anno più sottili. Alcuni sono attaccati pertinacemente al dorso, ed è impossibile lo staccargli intieri senza la totale lacerazione di essi; altri son quasi onninamente staccati, o con pochissimo attaccamento. Certi stanno quasi quasi totalmente nascosti sotto le viscere, e non appariscono all'occhio subito che è aperto, e sparato il pesce, come avviene nell' Anguille; ne' Gronghi; ne' Naselli; nelle Sirene, o Pesci Argentini, ne' quali Pesci Argentini il nuotatoio, o vescica piena d' aria sta in un seno particolare serrato dalle costole, nel qual seno la sola suddetta vescica, ed i reni si racchiudono, totalmente separati dall' altre viscere, ed a segno tale, che chi aprisse il ventre ad un Pesce Argentino, crederebbe a prima vista, che egli fosse privo di quella vescica.

piena d'aria, se non si risolvesse a penetrar più indentro per via del coltello: E pure quella vescica è molto grande, e molto visibile: Imperocchè in un Pesce Argentino, che pesava otto libbre, e mezzo; e dalla punta del muso fino all'estremità della coda era lungo due braccia, e tre quarti, la vescica era lunga due terzi di braccio Fiorentino, dentro la quale appariva una grande striscia composta da un'ammassamento di corpi rossi, e carnosissimi similissimi a que' due corpi rossi, che si trovano nella vescica d'aria dell'Anguille all'imboccatura del canale, che da essa vescica va a sboccare nell'Esofago, o nello stomaco.

Il famoso, e veramente grandissimo Geometra Giovanni Alfonso Borelli nella prima Parte del Libro del Moto degli Animali alla Proposizione dugentesima undecimaprima affermò, che questo suddetto canale, per cui può uscire, ed entrare l'aria nel nuotatoio, o vescica, partendosi da essa vescica va ad insinuarsi, ed a metter capo nel fondo dello stomaco de' Pesci: E son quest'esse le sue parole. *Quod postea aer prae dictae vesicae piscium multiplicari novum aerem sorbendo, & minui eromendo superfluum per os, possit, prout necessitas equilibrium eorum exigat, suadet ex canali manifesto, licet subtili, & stricto prae dictae vesicae, qui in fundo stomachi desinit, & frustra factus esse non potest.* Non  
in tut-



in tutti i pesci mette capo quel canale nel fondo dello stomaco, conforme per avventura parve a questo grand' uomo; anzi, per dire il vero, in una sola specie di pesci ho trovato, che nel fondo dello stomaco egli termina, e s' impianta; e questa è la specie delle Lacce, o, Cheppie.

- Nelle altre generazioni di pesci mette focca o nella gola, o nel principio dello stomaco, o nel mezzo della lunghezza dello stomaco medesimo. Ne in tutte quante le generazioni è ugualmente manifesto questo canale: Imperocchè se ne' pesci di acqua dolce per lo più si vede, e si trova a prima vista, e senza difficoltà veruna; pel contrario in molti pesci di Mare non così subito si trova, e si ravvisa; e ci vuole una particolar premurosa diligenza, e pazienza per rinvenirlo, a segno tale, che in alcuni, ancorchè sia, probabilissimo, e certissimo, ch' ei vi sia, io molte volte non ho saputo rinvenirlo: Ma da me medesimo ne incolpo la mia poca diligenza, e destrezza, congiunte forse con qualche mia insolita impazienza. E tanto basti intorno alle vesiche piene d' aria de' pesci per tornare agli animali, che si trovano in essi pesci.

La Grancevola è quel Granchio marino, che da *Ulisae Aldrovando* vien chiamato *Pagurus furmina Venetorum*. Due sono le sue ovaie, e tutt' a due  
anno

anno il lor principio intorno alle quattordici brancie , quindi camminando in su verso lo stomaco , ed arrivatevi , si rivoltano in giù verso la coda , e camminando pel mezzo del dorso vanno formando varij giri , fino a tanto , che arrivano in vicinanza della coda dove si uniscono in un sol corpo . Ciascuna di queste ovaie suol esser ordinariamente lunga un braccio in circa , ed intorno al loro mezzo si comunicano , e si uniscono tra di loro con un canale a traverso , che è quasi della stessa grossezza delle ovaie , e come l' ovaie anch' esso è pieno di uova . In lontananza di otto dita da questo canale a traverso , da ciascuna dell' ovaie nasce un canaletto , il quale va a scaricarsi dell' uova per due forami esterni , aperti in una gran cavità ossea , coperta dalla coda della Grancevola , e l' uova così partorite , che sempre sono di un color accesissimo di corallo , restano attaccate a otto paia di pinne , o corpi cartilaginei concavi , il dintorno de' quali è pelofo , siccome di piccoli , e folri mucchietti di peli è pelofo ancora tutto il convesso della coda , la qual coda composta di sette articolazioni , serve , come dissi , di coperchio a quella gran cavità ossea , nella quale sono aperti quei due forami esterni , pe' quali escon l' uova fuor del corpo della Grancevola , e si attaccano a que' peli , dove attaccare  
acqui-

acquistano , a mio credere , il principio della loro covatura . In vna di queste Grancevole osservai , che la dove le ovaie si uniscono in un sol corpo , era appiccata tenacemente ad esso corpo dell' ovaie una vescichetta grossa quanto una nocce , dentro la qual vescichetta trovai vna materia viscosa di colore dorè , e tra essa materia viscosa si trovano acquattati sedici vermicciuoli vivi dello stesso colore larghetti , spianati con qualche somiglianza a' semi rossi del Cocomero , se non che questi vermi nella loro estremità più larga erano falcati come si può vedere nella Tav. ventesimaquarta , Fig. e. F. F. F.

Altri simili ; similissimi vermi ho trovati in dua vescichette di una Locusta . L'una di esse vesciche stava attaccata allo stomaco , e l' altra al principio della destra ovaia . Le ovaie della Locusta son per appunto della stessa fabbrica di quelle delle Grancevole .

Tra le razze delle Mentule marine ve ne è d' una certa razza , che da' Pescatori son dette Pinci marini , la quale non nuota , ne si aggira pe' fondi del Mare , come fanno certe altre razze di Mentule , ma sta sempre con una delle sue estremità radicata , senza mai distaccarsene , o ne' gusci dell' Ostrie , o di altre Conchiglie , o negli scogli , o muri de' Porti , e delle darsene , o di qual

posson ridursi al genere delle Mentule, ancorchè di differente spezie da' Pinci, e da quell' altre Mentule, che si aggirano pe' fondi del Mare; perchè nell' interna fabbrica delle viscere sono totalmente differenti. Di più sul dorso, e su' fianchi de' medesimi Pinci, oltre i suddetti Carnumi si trovano ancora attaccate alcune piccole Conchiglie univalve, della razza di quelle, che dagli Scrittori son chiamate Balani. Stando dunque i Pinci attaccati allo scoglio con le radici della estremità posteriore, non anno in questa estremità apertura veruna; ma bensì anno due aperture nella estremità anteriore, perchè questa estremità anteriore si dirama in due tronchi internamente scanalati, uno de' quali è più lungo, e più grosso; e l' altro più corto, e più sottile; e tutt' a due anno la loro apertura in punta, con questa differenza, che l' apertura del tronco maggiore per lo più è di figura ottangolare, e quella del tronco minore è esagona. Nell' interno del tronco minore vicin' all' apertura terminano due canaletti uno sottile, e bianco tutto, fuor che nella estremità, nella quale è rosso di un rosso accessissimo, ed è tutto pieno di un liquor bianchissimo simile ad un latte grossetto, e consistente, e questo canaletto appartiene all' opera della generazione, e tutti i Pinci lo anno tanto i Maschi, quanto le Femmi-

ne . L' altro canaletto , che pur termina nell' interno del minor tronco , è molto più grosso del canaletto bianco , ed è l' intestino , dal quale si scaricano le fecce fuor del corpo dell' animale . Nell' interno del tronco maggiore , che è la bocca si scorge una larga , e lunga cavità , nella quale si stanno nuotando alcuni animaletti viventi . In tutte quante quelle Mentule , o Pinci , che ho osservati molti anni alla fila ne' mesi di Gennaio , di Febbraio , di Marzo , e di Aprile , e di Luglio , in tutti quanti senza eccettuarne veruno ho sempre trovati questi animaletti , che sono di un color nericcio , e bigio picchettato di nero mentre son vivi ; ma , quando si cuociono nell' acqua , diventano d' un color rosso acceso , ne son maggiori di un piccolo granello di grano , non duri , ne armati di crosta , anzi teneri , e che strinti fra le dita si ammaccano subito , e si disfanno senza resistenza veruna . Il lor numero non è sempre lo stesso ; Imperocchè in alcuni Pinci talvolta non ne ho trovati più di cinque , in alcuni sei , in alcuni altri fino in sette , ed anco fino in otto , ed in nove , e ne' maggiori fino in dodici ; e si mantengon vivi ancorchè le Mentule sieno state sradicate dagli scogli , e sieno morte di due giorni , e forse anco di tre . La lor figura maggior del naturale veduta col Microscopio si

rap-

rappresenta nella Tav. ventunesima al numero 7. nella quale è ancora la figura del Pincio Marinella sua grandezza naturale contrassegnata col numero 6. Se questi piccoli vermicciuoli sieno nati in quella cavità della Mentula, o pure essendo prima nati nel Mare, si ritirino, e si appiattino spontaneamente in quella, come in una grotta, o pure vi sieno allettati dalle Mentule per tenervegli come in un vivaio, o conserva, per potere al bisogno cibarsene, non è di mia conoscenza, ne di mia intenzione il favellarne adesso.

Mi fu portato in Livorno un Animaletto marino della figura, e grandezza perappunto disegnata nella Tav. ventesimaquinta, Fig. prima, e seconda, a cui piacemi di dar nome di Spinoso marino, o d' Istrice marino. Questo avea il ventre per di sotto di color bianco liscio, non peloso, ma con rughe rette trasversali, e rilevate, come tanti cordoni. Dal capo, fino alla coda nell' uno, e nell' altro de' lati del ventre era tutto circondato come da tanti pennellini di setole. Ne contai ventisei per ogni banda; sicchè in tutto furono cinquantadue. In altri però di questi animaletti ho contati i suddetti pennellini fino al numero di quaranta per banda, essendo quegli delle estremità molto minori, e meno setolati di quegli de'

mezzi . Ogni pennellino maggiore avea chi cinque , chi sei , chi sette , chi otto setole dure , e pungenti , e chiuse , per così dire , come in una penna , o guaina . Queste setole sembravano tutte di color nericcio , e filiginoso , eccetto quella del mezzo , la quale essendo sempre la più lunga , e la più grossa , ella è parimente sempre di color d'oro lustrante , che alcuna volta rassembra velato di verde , secondo gli sbattimenti della luce . La guaina , o penna , dentro la quale a foggia di pennello racchiuse , e congegnate stanno queste setole , è corredata de' suoi tendini , e de' suoi muscoli per potersi muovere , e drizzare , e per potere altresì sguainar le setole , e per poterle ritirar' in dentro a sua voglia nelle guaine . I fianchi poi dell' animaletto intorno intorno son tutti setolosi , ma con pennellini minori , aventi però le setole più lunghe , e molte di esse meno pugnenti , e più flosce , e pieghevoli . Il dorso per tutta quanta la sua lunghezza , e per la larghezza di un pollice si rimane liscio senza setole di sorte veruna , ma tutto coperto di una ammaccata peluria gialliccia simile a quella sbavatura , che circonda esternamente i bozzoli de' vermi da seta . Dall' una delle estremità si apre il forame della bocca , all' intorno della quale pendono due antenne , o cornetti carnosì flosci , e bianchi .

Nell'

Nell' altra estremità opposta scorgesi il forame del podice . Nella cavità del ventre mirasi un canaletto di color purpureo accessissimo , e tutto fatto a globetti distinti l' uno dall' altro , il qual canaletto, dal sito della bocca, dove è un poco più grosso, scorrendo per tutto il ventre, va a terminare molto più sottile in vicinanza del podice , e questo si è il cuore diramato in molti piccoli cuori . Nella medesima cavità del ventre sta situato lo stomaco di sostanza bianca dura , e quasi quasi cartilaginosa . L' intestino senza avvolgimenti va diritto alla volta del podice ; ma dal piloro fin quasi per tutta la lunghezza dell' intestino pendono due ordini paralleli d' intestini ciechi , ed in ogni ordine se ne numerano venti , e questi quaranta intestini ciechi pieni di escrementi bigi , e nericci si diramano in diversi scherzi di ramificazioni , che s' intralciano verso la pelle tra quei muscoli , e tra quei tendini , che servono al moto di que' soprammentovati pennellini di setole . Quindi tutti essi intestini ciechi trapassano con la loro cieca estremità , ed entrano in altrettante guaine , le quali guaine non istanno nella cavità del ventre , ma sfondano , e riescono in un' altra gran cavità , che occupa per di sopra tutto quanto il dorso , e la schiena dell' animale da capo a piedi , e queste tali guaine circondate intorno intorno



terno da una espansione membranosa, formano la figura di quaranta ventarole col manico; e tale espansione membranosa è doppia, e internamente scanalata, e tra una membrana, e l'altra vi corre un fluido limpidissimo, che talvolta negonfia il lembo, Fig. terza, e sesta, Tav. ventesimaquinta. Spinto il fiato artificiosamente con un sifone nello stomaco, non solamente gonfia lo stomaco, ma gonfia ancora l'intestino principale, e gonfiano parimente tutti gli altri quaranta intestini ciechi, entrando in essi il fiato per le quaranta aperture, che si vedono internamente in quel principale intestino. La cavità, nella quale stanno racchiusi lo stomaco, e gl'intestini, l'ho trovata tutta piena d'acqua salmastra. L'altra cavità, che occupa il dorso anch'essa l'ho veduta pur piena della medesima acqua, e vi entra per un largo, e rotondo forame aperto esternamente nel mezzo della pelle del medesimo dorso. Nell'acqua di questa cavità dorsale osservai, che nuotavano otto vermicciuoli minutissimi, che veduti col Microscopio rappresentavano la figura disegnata nella Tav. ventesimaquinta, Fig. quarta, ed erano tutti trasparenti, come se fossero di finissimo cristallo di Murano. Il dotto mio amico *Oligerio Jacobo di Danimarca* nel Volume Terzo degli *Atti Filosofici*, e *Medici Danesi* al Cap. quarto, ed al Cap. cinquan-

cinquantacinque fa menzione di un animaletto marino molto simile a quello, che qui di sopra da me è stato descritto, e se io l'ho nominato Spinoso marino, o Istrice marino, egli lo nomina *Vermis Aureus*, e *Eruca marina*: Ma parmi, che nell' interna fabbrica delle viscere vi sia gran differenza tra l' animaletto da me descritto, e quello di cui fa menzione esso *Oligerio iacobeo*.

Nel fine del ventre inferiore del Delùno femmina verso la coda scorgefi esternamente una valletta, o fossa lunga un ottavo di braccio, nel principio della quale si apre un orifizio, che è l' esterna porta della natura femminile, accanto alla qual porta nella medesima valletta pur si apre un altro orifizio, per cui la vescica urinaria si scarica dell' urina. Nel fine della valletta evvi un altro terzo orifizio continuato con l' intestino retto. In oltre sovra i due lunghi argini della valletta medesima si veggono due piccole fessure una per argine, e da ciascheduna di esse scappa fuori una certa papilla, che è il capezzolo dell' una delle due poppe, con le quali il Delùno allatta i suoi parti. Ogni capezzolo può allungarsi, e scorciarsi, ed ha nella sua estremità un forame, per cui intromessa una lunga tenta, entra per lungo spazio in un lungo canale interno, scorrente per un gran corpo glanduloso, e questo largo canale  
interno

interno è tutto pieno di celle , o per dir meglio , di sacchetti membranosi , alcuni de' quali tengon la bocca volta verso il capo del Delfino , ed altri pel contrario la tengon voltata verso il capezolo della poppa . Quel primo , che nel principio della valletta ho detto esser la porta della natura femminile dà l' entrata in una larga , e spaziosa cavità , nel fondo della quale rilevasi una grossa papilla aperta in punta , ed increspata , alla base della quale in uno de' suoi lati si stende un' ala semicircolare , e membranosa , grossa , e dura . A prima vista questa aperta grossa , e rilevata papilla si crederebbe , che fosse il capo dell' utero , che introducesse ne' due corni di esso utero ; ma non è vero : Imperocchè questa papilla sbocca in un' altra cavità , o caverna minore della prima ; e nel fondo di questa seconda cavità stassi rilevata un' altra grossa , e grande papilla aperta in punta , e nell' apertura increspata come la prima : E siccome alla base della prima da uno de' lati si stende un ala semicircolare membranosa , e dura , così alla base di questa seconda si stende un altra simile ala . Dall' apertura di questa seconda papilla si entra in un canale , o passaggio assai largo , e lungo cinque buone dita traverse , nel fondo di cui sono aperti due orifizi uno più angusto dell' altro , e per questi due orifizi si passa ne'

fa ne' due corni dell' utero assai lunghi , e passano la lunghezza di un terzo di braccio di misura Fiorentina. Ogni corno dell' utero nella sua estremità accostasi al proprio testicolo , che in figura , ed in grandezza rassomigliasi giusto giu' o ad una mandorla mondata , e bianca , ed attentamente osservato , scorgesi gremito di minutissimi uova . Tanto quella prima cavità maggiore della natura femminile mentovata di sopra , quanto la seconda cavità minore posi mente una volta , che erano nel loro interno scabrose per alcune vescichette , o globetti rilevati di varie grandezze , ed ognuno di questi globetti racchiudeva un piccolo vermicciuolo col corpo fatto a mezza luna . Di simili globetti verminosi ne osservai alcuni altri sotto la prima esterna tunica del lunghissimo canale degli alimenti : Ho detto lunghissimo canale , perchè in questo Delfino , che pesava dugento libbre Fiorentine di dodici once l' una , e non era il suo corpo più lungo di tre braccia , e un terzo , il canale degli alimenti arrivava alla lunghezza di quarantatre braccia Fiorentine : E per tutta quanta la sua interna cavità , e particolarmente in quella degl' intestini crassi , e più vicini al podice vagavano sciolti alcuni di quei medesimi vermicciuoli , che stavano acquattati in quei globetti . In questo stesso Delfino osservai due princi-

B b

palissimi

deriva, gli ho trovati pienizeppi di bile. In questo lungo attaccamento del canal biliario con l'intestino vi è molta, e molta similitudine tra' condotti biliari del Delfino, e quegli della Lontra animale quadrupede. Ma quello, che fa a mio proposito si è, che il canal biliario del Delfino subito che è scappato fuor del fegato, viene tutto quanto intorno intorno circondato, e strettamente ben cinto da un corpo glanduloso, che fa l'ufizio forse del Pancreas, il qual corpo glanduloso è così grande, che nel Delfino, del quale io parlo, arrivava al peso di diciannove once, e tutto quanto esternamente era tempestato di piccole vescichette, ogniuna delle quali racchiudeva il suo verme. L'esser questo canale biliario tutto cinto, e coperto da quel corpo glanduloso può aver indotto alcuni nobilissimi Scrittori antichi, e moderni ad affermare, che il Delfino è privo di fiele. Non solamente questo corpo glanduloso era pieno di vesciche verminose; ma ne erano piene altresì due grosse glandule attaccate a' lati dell'intestino retto, due altre glandule pendenti dalla estremità de' due lobi del polmone, quattro altre simili glandule unite alla tunica esterna del primo stomaco, e molte, e molte altre pur grosse glandule adiacenti tra un corno, e l'altro dell'utero, e negli spazi che corrono tra un re-

ne, e l'altro. Il cervello non era verminoso; ed in questo Delfino era naturalmente di così gran mole, che arrivava al peso di trentasei once; ed in un altro Delfino, che pesava trecentotanta libbre, il suo cervello arrivava alle cinquantotto once, il che in un pesce è degno di considerazione; mentre i pesci per ordinario, piccola, e molto lieve anno la mole del cervello; come può vedersi nel Cane Carcaria descritto in Firenze dal dottissimo *Stenone*, perchè pesando quell'animale più di tremila libbre, non giugnava ad avere tre once di cervello: E mi sovviene, che io stesso ho trovato in una Tartaruga marina di sessantanove libbre il cervello suo non arrivar al peso della sesta parte di una miserabile oncia; ed in una Volpe marina, che tutta intera, e non isventrata, era ventotto libbre, il cervello essere un solo quarto di oncia. Dirò di più. Un Tonno ben netto dagl' interiori, e pesante trecentonovanta libbre passava di poco un ottavo d' oncia di cervello; ed un altro Tonno di trecentoquarantadue libbre pur netto ancor esso da tutte le viscere non arrivava col peso del cervello a quell'ottavo dell' oncia. Onde credo che possa affermarsi per cosa singolare, e non più osservata, che tra gli animali non ragionevoli il solo pesce Delfino sia quegli, che non ostante la maggiore,

giore, o minor mole del corpo, abbia il cervello maggiore di tutte quante l'altre razze di bestie. I Manzi, ed i Bufoli, che talvolta pesano mille cinquecento libbre, appena anno due libbre, o poco più di cervello. Forse maggior di tutti lo avrà quel grande animalaccio volante, di cui la celebre famosissima Satira.

*Metton certe appendici del Botero*

*Nell' India pastinaca un Vcellaccio*

*Ch' alza da terra un Elefante intero.*

*Apicio*, ed *Ateneo* mi sgriderebbono se lasciassi in dimenticanza quest' altra osservazione, ancorchè non sia a proposito, che il cervello del Delfino è una delicatissima vivanda, e non cede ne poco, ne punto a quella del cervello delle Vitelle di latte, o di qual si sia altro costumato nelle più laute, e più ingegnose cucine: anzi direi per esperienza, che fosse molto migliore, e più delicato, e gentile. Se poi in tutte le razze de' Delfini avvenga lo stesso, non saprei affermarlo. Favello qui di quei Delfini, che frequentemente si pescano nel mar di Toscana, e nello esaminar le loro viscere, gli ho veduti quasi in tutte le parti similissimi a queglii, che dal dottissimo *Tommaso Bartolini*, e dal celebre *Giovanni Daniel Maiore* furono notomizzati, e descritti col nome latino di *Phocaena*, e di *Tursio*.

Quan-

Quando favellai de' vermi dell' Orso , e della fabbrica de' suoi Reni , dissi , che il Delfino avea anch' esso i Reni distinti in particelle , e lo dissi con verità , perchè veramente tutti i pesci , conforme ancora tutti gli uccelli , anno i Reni scompartiti in varie particelle di differenti figure , che non sono altro , che altrettanti piccoli Reni , i quali piccoli Reni in alcuni animali sono numerosissimi a segno tale , che in un sol Rene di un Delfino , il qual Rene pesava nove once , ne ho contati trecentsettantuno ; e nel Rene compagno ne numerai intino in trecentottanta , e tutti corredati delle loro proprie tuniche , e de' propri canali sanguigni , e de' propri canaletti ureteri , che con molte sottili ramificazioni s' impiantano nel tronco principale degli ureteri maestri , i quali scorrendo da capo a piede per tutta la lunghezza interna de' due Reni , ed usciti fuor di essi Reni , camminando solitari per lo spazio di sedici dita traverse , s' impiantano nel principio del collo della vescica urinaria , e proseguendo tra tunica , e tunica il lor cammino , sboccano nell' interna cavità del collo di essa vescica ciascheduno de' quali con la propria apertura vicinissima l' una all' altra , senza rilevarsi in papille , o capezzoli , conforme ho osservato , che si rilevano in due grossi capezzoli gli ureteri della Tataruga



taruga marina; allora quando sono penetrati internamente nell' orlo estremo del collo di essa vescica, la dove ella con una ben larga foce sbocca nell' interno della cloaca dell' intestino retto. In somma ancorchè tante parti del da me nominato Delfino fossero verminose, nulladimeno i Reni veri non erano verminosi, ma solamente apparivano alcuni bitorzoletti, o vescichette piene di vermi sull' esterna superficie de' due Reni succenturiati, che sono della stessa sostanza, e colore de' Reni veri, ed anno una interna, e manifesta cavità, divisa in alcune cellette, ma non si distinguono evidentemente in globetti, conforme si mirano scompartiti i Reni veri. Queste vescichette verminose su' Reni succenturiati non solamente gli ho veduti in questo suddetto Delfino; ma ancora in un' altro, senza che questo secondo avesse veruna altra parte del suo corpo verminosa.

Di simili vescichette piene di minutissimi vermi una sola volta ne ho veduti scabrosi i Reni veri di una grossa Tartaruga marina, i quali Reni son di fabbrica bizzarra: Conciosiencosachè anno figura piana, schiacciata, triangolare, vestiti esternamente delle solite tuniche, sotto le quali, tanto il destro, quanto il sinistro rene è scompartito in quattordici parti, o per dir meglio in quattordici Reni minori, aventi le proprie

prie tuniche , ed i propri canali : E di più ciascuno di questi quattordici Reni minori è diviso in altri moltissimi , e piccolissimi Reni , guerniti ancor essi di proprie tuniche , di propri canali sanguigni , ed ureteri sottilissimi , i quali sottilissimi ureteri vanno ad entrare negli ureteri de' quattordici Reni maggioretti , e gli ureteri di questi inaggioretti si scaricano nel principale , e più grosso canal maestro .

Considerando il canale degli alimenti d' un grossissimo Pesce Squadro , che pesava intorno alle settanta libbre , osservai , che l' esofago internamente era liscio , e di parieti non molto grosse ; ma grossissime erano quelle dello stomaco , e per tutto l' interno grossamente , per così dire , carnose , e tempestate di moltissime lamine , o risalti grinzosi , situati senz' ordine veruno , come accade nel quarto ventricolo de' Cervi . Tra questi risalti vagavano liberamente molti minuti sottilissimi Lombrichetti bianchi di testa rotonda , e di coda acutissima , de' quali gran numero ancora ne stanziava per tutta quanta la cavità dell' intestino , che è fatto internamente a chiocciola ; ne stanziava altresì nella cavità di quell' appendice cieca , che di figura falcata pende dalla estremità dell' intestino retto . Di simili vermicciuoli mi sono imbattuto a vederne un'altra

altra volta negl'intestini di un grossissimo Pesce,  
Aquila, e di una grossissima Pastinaca marina,  
che per altro nome da' Pescatori è detta Ferrac-  
cia. Ma qual' è quell' animale vivente, in cui  
non sia possibile trovarsi altri piccoli animali vi-  
venti? E tanto basti in questa Prima Parte, che  
non dee servir per altro, che per quello, che  
son per dire nella Seconda.

IL FINE.



THE  
HISTORY OF THE  
CITY OF  
NEW-YORK  
FROM  
THE  
FIRST  
SETTLEMENT  
TO  
THE  
PRESENT  
TIME  
BY  
JOHN  
BUTLER  
1784

NEW-YORK  
PRINTED  
BY  
J. B. B. B.

Il Sig. Avvocato Benedetto Gori si compiaccia di vedere, se nella presente Opera si contenga cosa repugnante alla Fede, e buoni Costumi, e di referire. Dato questo dì 5. Luglio 1684.

*Alessandro Pucci Vic. Gen. Fior.*

Illustriss. e Reverendiss. Sig.

Queste Osservazioni del Sig. Francesco Redi sono state da me vedute, & ho ammirata in esse la dottrina insieme, e la singolarissima accuratezza di questo grand' Uomo; ne avendovi ritrovata cosa alcuna contraria alla nostra Santa Fede, ne alla Pietà Cristiana, le stimo per ogni titolo degnissime delle Stampe. Questo dì 8. Luglio 1684.

*Benedetto Gori.*

Si Stampi

*Alessandro Pucci Vic. Gen. Fior.*

Al Sig. Dottore Pier Andrea Forzoni Consultore di questo S. Ofizio, che esami se nel presente Libro inscrito *Osservazioni di Francesco Redi*, vi è cosa alcuna repugnante alla Santa Fede Cattolica, e Costituzioni Apostoliche, &c. e riferischi. Dato dal S. Of. di Firenze questo dì 10. Luglio 1684.

*Fra Cesare Fallarvicini Min. Convent.*

*Vic. Gen. del S. Of. di Firenze*

Re-

Reverendiss. Padre.

Avendo attentamente lette le presenti Osservazioni del Sig. Francesco Redi , e non avendo in esse trovata cosa veruna repugnante alla Santa Fede Cattolica , e Costituzioni Apostoliche , &c. Le giudico degnissime della pubblica luce della Stampa , come piene d' utili insegnamenti per gli studiosi dell' Arte, che ammireranno la puntual' attenzione , non meno , che la profonda Dottrina del Chiarissimo Autore , già benemerito delle lettere , ed in ogni luogo di nome immortale per l' altre sue celebri opere. Li 12. Luglio 1684.

*Pier Andrea Forzoni.*

Attenta prefata attestazione  
Imprimatur hac die 14. Iulij 1684.

*F. C. Pallavicinus S. T. M. Vic. Gen. S. Officij  
Florentia .*

*Ruberto Pandolfini Senat. e Aud. di S. A. S.*

# ESPLICAZIONE

## DELLE FIGVRE DELLE TAVOLE.

### TAVOLA PRIMA.



*Fig. prima . Serpentello con due teste .*

*Fig. seconda . 1 due stomachi , e l' intestino comune del suddetto Serpentello .*

*Fig. terza . Due tronchi delle due spinali midolle de' due colli del Serpentello ,*

*che si uniscono in un tronco solo .*

### TAVOLA SECONDA.

**F** *Fig. prima . Lucertola con tre code .*

*Fig. seconda . Quinto sacco , che si trova nel ventre de' Pesci Calamai maschi , de' Polpi , e de' Totani pieno di molti corpicciuoli bianchi in figura di Vermi . ccc. Contorni del suddetto sacco . d. bocca del medesimo . a. Corpo bianco ravvolto in più giri chiuso nel sacco . b. Piccolo sacchetto , pieno di materia bianca , e viscosa , contenuto nel sacco maggiore . Vedi Parte seconda .*

*Fig. terza . Vermi , e Idatidi delle viscere delle Lepri .*

TAVO-

## TAVOLA TERZA.

**F**ig. prima. aa. Vescica dell' aria dell' Anguille .  
 b. Canale della detta vescica , che mette capo  
 nello stomaco. cdd. Stomaco dell' Anguilla. e. In-  
 testino .

**Fig. seconda.** aa. Vescica dell' aria della Lascia .  
 b. Canale della vescica , che fa foce nello stomaco .  
 d. Stomaco . eef. Intestino .

**Fig. terza.** Vescica dell' aria della Murena . c. Sto-  
 maco della Murena .

**Fig. quarta.** Vescica dell' aria della Tinca di mare  
 divisa in tre cavità .

## TAVOLA QUARTA.

**F**ig. prima. aa. Stomaco della Laccia , ovvero  
 Cheppia . b. Vescica dell' aria , che col suo ca-  
 nale mette capo nel fondo dello stomaco . df. Intesti-  
 no . e, eeeeee Intestini ciechi , o canali pancreatici .  
 g. Cistula del fiele .

**Fig. seconda.** Vescica dell' aria della Trota , che col  
 suo canale mette capo nello Esofago . bc. Stomaco .  
 d. Intestino . eeeeee Intestini ciechi , o borsette  
 pancreatiche .

**Fig. terza.** Vescica dell' aria della Ombrina .

**Fig. quarta.** a. Vescica dell' aria del Luccio . b. Suo  
 canale .

**Fig.**



*Fig. quinta . Vescica dell' aria del pesce Organo divisa in tre carità .*

TAVOLA QUINTA.

**F** *Fig. prima . Vescica dell' aria della Reina .*

*Fig. seconda . Vescica dell' aria del Muggine .*

*Fig. terza . Vescica dell' aria della Vipera del mare .*

*Fig. quarta . Vescica dell' aria del pesce Rondine .*

*Fig. quinta . Vescica dell' aria della Tinca di acqua dolce*

*Fig. sesta . Vescica dell' aria del pesce San Piero latin.*

*Faber .*

*Fig. settima . Vescica dell' aria del pesce Ago della*

*Fig. 14. dell' Ionstono .*

TAVOLA SESTA.

**F** *Fig. prima . a. Stomaco del pesce d' Oro . bbb.*

*Intestino . cccc. Quattro intestini ciechi di di-*

*suguale lunghezza . d. Vescica urinaria . eeee.*

*Vescica dell' aria divisa in quattro carità . fff.*

*Tre canali della vescica dell' aria , che si uniscono nel canal comune . g. che va a sboccare nello stomaco .*

*Fig. seconda . Vescica dell' aria del pesce Tordo .*

*Fig. terza . Vescica dell' aria del Dentice .*

*Fig. quarta . Vescica dell' aria della Sardina .*

TAVO-

## TAVOLA SETTIMA.

**F** Ig. prima . aa. Porzione d' intestino del Grotto .  
b. Canale cistico . c. canale epatico . ddd. Tre  
canali pancreatici .

Fig. seconda . aa. Porzione dell' intestino della Garza  
bianca . b. Canale cistico . c. Canale epatico . dd.  
Due canali del Pancreas .

Fig. terza . aa. Porzione dell' intestino di un Tarabuso .  
b. Canale cistico . c. Canale epatico . dd. Due ca-  
nali pancreatici .

Fig. quarta . aa. Porzione dell' Intestino di quell' uc-  
cello , che in Toscana si chiama Dottore , in latino  
dagli Scrittori Anas Platyrinchos . b. Canale ci-  
stico . c. Canale epatico . d. Canale pancreatico .

Fig. quinta . aa. Porzione d' intestino della Parvoncella,  
ovvero Fisa . lat. Vanellus . b. Canale cistico . c.  
Canale epatico . dd. Canali pancreatici .

Fig. sesta . aa. Porzione d' intestino del Gambetto , che  
è una razza di Chiurlo . Latin Arquata . Nume-  
nius . b. Canale epatico . c. Canale cistico . dd.  
Canali pancreatici .

## TAVOLA OTTAVA.

**F** Ig. prima . Lombrico trovato nel Rene di un Ca-  
ne , e disegnato nella propria naturale lunghezza  
e grossezza . Fig.

DELLE FIG. DELLE TAV. 269

Fig. seconda . Canale degli alimenti del suddetto Lombrico .

Fig. terza . Canale bianco appartenente all' Opera della Generazione .

Fig. quarta . Altro Lombrico minore trovato in compagnia del suddetto grosso Lombrico nel medesimo Rene del medesimo Cane .

TAVOLA NONA.

Fig. prima . Lombrico grossissimo trovato nel Rene di una Martora , e disegnato a capello nella sua naturale grandezza .

Fig. seconda . Lombrico trovato sotto la pelle del Leone .

Fig. terza . Lombrichi , che frequentissimamente si trovano sotto la pelle delle Faine , delle Martore , e delle Puzze .

TAVOLA DECIMA.

Fig. prima . Lombrico ritondo de' corpi umani . c. Bocca del Lombrico . d. Estremità , o coda del Lombrico .

Fig. seconda . Canale degli alimenti del Lombrico ton- do de' corpi umani . a. Principio del canale degli ali- menti , che corrisponde con la bocca . b. Estremità del suddetto canale , che corrisponde col podice .

D d

Fig.

Fig. terza . Canale bianco circolare avvolto in molti giri pieno di materia lattiginosa , che si trova in tutti i Lombrichi tondi de' corpi umani . Qui per comodità è fuor del proprio sito .

Fig. quarta . Canale bianco non circolare pieno di materia bianca lattiginosa , che si trova in quei Lombrichi tondi de' corpi umani , che anno la coda piatta .

Fig. quinta . Rappresenta la Figura ingrandita dal Microscopio di quei piccolissimi vermi bianchi , che escono con le fecce dagli intestini de' fanciulli .

Ascaridi

TAVOLA VNDECIMA.

Fig. prima . Rappresenta due Lumaconi ignudi uniti al lavoro della propagazione .

Fig. seconda . Cuore del Lumacone ignudo con ramificazione di vasi .

Fig. terza . Osso della testa .

Fig. quarta . Dente del Lumacone ignudo ingrandito dal Microscopio .

TAVOLA DVODECIMA.

Fig. prima . a. Principio del canale degli alimenti del Lumacone ignudo . f. Gorzo . b. Stomaco . ccc. Intestino . d. Estremità dell' Intestino , che sbocca

sbocca fuor del corpo in un piccolo forame situato sull' orlo di quel maggior forame, pel quale entra, e esce l'aria da' polmoni.

Fig. seconda. g. Membro genitale del Lumacone ignudo. h. Luogo per dove il membro genitale si sguaina fuor del corpo del Lumacone, e si unisce col canale spermatico. iiii. Canale spermatico. k. Testicolo. l. Canaletto bianco attorto, che con una estremità termina nel testicolo, e con l'altra estremità termina in una glandula al dintorno del fegato con le ramificazioni. m m m m. n. Pelle del Lumacone. o. Canale degli alimenti.

Fig. terza. Mostra il membro genitale co' suoi ligamenti, e con la sua membrana.

Fig. quarta. Mostra il membro genitale arrovesciato, e ripieno artificialmente di flato.

TAVOLA DECIMATERZA.

Fig. prima. Canale degli alimenti delle Chiocciolacce terrestri col guscio. a. Apertura del canale degli alimenti, che corrisponde alla bocca. b. Gozzo, o cavità, nella quale è radicato il dente della Chiocciola. cc. d. Stomaco. eee. Intestino. f. Estremità dell' Intestino, che mette foca nel forame situato intorno all' esterna apertura de' polmoni.

Fig. seconda. Dente della Chiocciola terrestre aggrandito dal Microscopio.

Fig. terza. a. Apertura per la quale esce fuori lo strumento, della generazione. b. Canale, o carvità membranosa, nella quale s'alza il corpo bianco grinzoso simile a una papilla; segnato nella Figura quinta. c. Membro genitale della Chiocciola fuor del suo sito per minor confusione. d. Sacchetto bianco cartilaginoso, in cui sta collocato l'oggetto fatto a piramide. ddd. Canale, o vaso spermatico. g. Testicola. eeee. Canale, che cammina attaccato ad un lembo del vaso spermatico, e s'impianta nel corpo. f. Che è un corpo rossigno glanduloso nascosto nel mezzo di quella massa, che fanno gl'intestini, ed il fegato aggrovigliati insieme. m m. Canale ancora esso appartenente alle cose della generazione. l. Zucchetta, o carvità, nella quale termina il canale. n. Ed è piena di una materia di color rugginoso, simile al sapone tenero.

Fig. quarta. Cuore della Chiocciola terrestre con le diramazioni de' vasi sanguigni.

Fig. quinta. Corpo bianco grinzoso simile a una papilla situato nella carvità. b. della Fig. terza.

### TAVOLA DECIMAQUARTA.

**F**ig. prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, e settima. Grandezza delle Anguille, che nate nel mare montano ad abitar nell'acque dolci de' fiumi, e de' laghi. Fig.

*Fig. ottava.* Canale degli alimenti delle Mignatte, che abitano nelle acque dolci.

*Fig. nona.* a a. Spinale midolla della Mignatta di acqua dolce. b. Membro genitale.

TAVOLA DECIMAQVINTA.

**F**ig. prima. Lombrico terrestre, che ha la fascia, o bardella sul dorso con la coda larga a foglia di Vlierro. 4. Bocca del suddetto Lombrico. 3. Apertura del podice.

*Fig. seconda.* Lombrico terrestre con la coda larga a foglia di Vlierro, il quale non ha la fascia, o bardella sul dorso. A. Bocca del Lombrico. B. Estremità della coda, dove è l'apertura del podice.

*Fig. terza.* Lombrico terrestre, che ha la fascia, o bardella sul dorso, e la coda non piana a foglia d' Vlierro, ma ritonda, e cilindrica.

*Fig. quarta.* Canale degli alimenti di tutt' a tre le sovraddette razze di Lombrichi.

*Fig. quinta.* Corpo, che serpeggia per la lunghezza della interna cavità del suddetto canale degli alimenti de' sovraddetti Lombrichi. B. Estremità, che risponde verso la testa.

## TAVOLA DECIMASESTA.

**F**ig. prima. Lombrico terrestre grossissimo, che a suo piacimento diventa lunghissimo con la coda cilindrica senza bardella, o fascia sul dorso. A. Bocca del Lombrico. B. Podice.

Fig. seconda. Canale degli alimenti del sovraaddetto Lombrico terrestre.

Fig. terza. Corpo, che serpeggia per la interna cavità del canale degli alimenti del detto Lombrico.

Fig. quarta. Canale degli alimenti de' Lombrichi trovati negl' intestini di una Tigre. A. Estremità, che era alla bocca. B. Estremità, che termina nel podice. CC. Due intestini ciechi.

Fig. quinta. Tre animalletti aquatici, che vivono nelle acque stagnanti, e ne' pozzi, osservati col Microscopio.

## TAVOLA DECIMASETTIMA.

**F**ig. prima, e Fig. seconda. Vermi piani degl' intestini del Gatto, e del Cane.

Fig. terza Lombrichi lunghi, e non piani degl' intestini del Cane, e del Gatto, i quali si trovano ancora negl' intestini del Leone.

Fig. quarta. Altri vermi del Cane, e del Gatto.

Fig. quinta. Scolopendra marina.

Fig.



- Fig. sesta. Canale degli alimenti della Scolopendra marina, che ha due denti falcati nella bocca.  
 Fig. settima. aa. Intestino retto del Guso. bb. Cloaca aperta del medesimo intestino retto. cc. Due papille de' canali ureteri, che metton capo nella cloaca. dd. Canali ureteri. ee. Due papille rilevate, per le quali si scaricano i vasi spermatici nell' opera della generazione. ff. Vasi spermatici del Guso.

TAVOLA DECIMAOTTAVA.

- F**ig. prima. aa. Vescica urinaria della Murena femmina. b. Orifizio esterno della medesima vescica. cc. Due canali ureteri. dddd. Le due ovaie della Murena femmina.  
 Fig. seconda. ee. Vescica urinaria della Murena maschio. f. Orifizio esterno della medesima vescica urinaria. gg. Due canali ureteri. hhhh. Canali spermatici.  
 Fig. terza. ii. Vescica urinaria del Grongo. k. Orifizio esterno della medesima vescica. ll. Due grandi canali ureteri con le varie ramificazioni. mmm. nnnnn. Altri canali, che metton capo nella vescica.  
 Fig. quarta. Tubercoli verminosi del Grongo.  
 Fig. quinta. Vescica urinaria dell' Anguilla.  
 Fig. sesta. Altra vescica urinaria dell' Anguilla.

## TAVOLA DECIMANONA.

- F**ig. prima. Verme dell' intestino del Pesce Spada figurato nella sua natural grandezza.
- Fig. seconda. Vescica dell' aria di un piccolo Pesce Spada.
- Fig. terza. A membro del Pesce Spada.
- Fig. quarta. Vermicciuoli pelosi trovati ne' globetti del corpo glanduloso del membro genitale.
- Fig. quinta. Moltiplicazione di piccoli cuori della Scolopendra terrestre.
- Fig. sesta. Cuore di una specie di Buccino marino, de' Pescatori Livornesi chiamato Cangiglio.
- Fig. settima. Due denti di una Chiocciola marina esternamente di figura, e di grandezza simile alle Chiocciole terrestri; ma di guscio, grosso, duro, liscio, lustro, e di color di Madreperla, scaccato d' un rosso pendente talvolta al nero.

## TAVOLA VENTESIMA.

- F**ig. prima. Verme degl' intestini del Pesce Tamburo.
- Fig. seconda. Canale degli alimenti del medesimo verme. a. Principio di esso canale. bbb. Tre cavità. c. Una altra cavità maggiore. ddd. Proseguimento dell' intestino.

Fig.

- Fig. terza.* Canale spermatico del Maschio, che ha una sua estremità attaccata nel mezzo della cavità del ventre. ff. Due rami del Canale spermatico. gg. Due membri genitali.
- Fig. quarta.* Vasi della femmina appartenenti alla generazione. h. Voçtaia. ii. Due canali, che terminano nelle due estremità della coda biforcata.

TAVOLA VENTVNESIMA.

- F** *Fig. prima.* Vermi degl' Intestini ciechi dell' Asello, e del Pesce Nocciuolo.
- Fig. seconda.* Terza, e quarta rappresenta lo stesso verme, che a sua voglia si trasmuta in queste, ed in altre figure.
- Fig. quinta.* Verme del Canale degli alimenti del Pesce Asello.
- Fig. sesta.* Pincio Marino, che sempre sta radicato negli scogli, e ne' muri delle Darsene.
- Fig. settima.* Verme, che si trova dentro al Pincio Marino.

TAVOLA VENTESIMASECONDA.

- F** *Fig. prima.* Microcosmo Marino.
- Fig. seconda.* Canale degli alimenti con quattro intestini ciechi del Microcosmo Marino.

E c

Fig.

*Fig. terza . Cuore , e diramazione de' vasi sanguigni del Microcosmo Marino .*

*Fig. quarta . Vermi marini , che racchiusi in alcuni cannelletti abitavano sopra il dorso del Microcosmo Marino disegnati maggiori del naturale ; e son quegli , che dagli Scrittori son chiamati Vermes in tabulis .*

*Fig. quinta . Vn' altra razza de' suddetti Vermi . cccc. &c. numero dodici gambe de' medesimi Vermi distese sopra una membrana .*

### TAVOLA VENTESIMATERZA.

**F** *Fig. prima . a. b. Vermi del Polpo .*

*Fig. seconda . Canale degli alimenti del Polpo . c. Rostro . d. Esofago . e. Gozzo . f. Stomaco simile a quello degli uccelli . g. Intestino cieco . h. i. Intestini . k. Vescica dell' inchiostro , o fiele . l. Apertura nel podice dove sbocca l' intestino , e la vescica dello inchiostro .*

*Fig. terza . Canale degli alimenti della Seppia , o Pesce Calamaio . m. Rostro . n. Esofago . o. Stomaco . p. Intestino cieco . qq. Intestini . r. Vescica dello inchiostro , o fiele . s. Apertura , che sbocca nel podice .*

*Fig. quarta . Canale degli alimenti del Torano . t. Rostro . u. Esofago . x. Vescica dell' inchiostro , o fiele*

fiele . y. Intestini . z. Apertura , che sbocca nel  
podice . v. Stomaco . vv. Intestino cieco , ovvero  
secondo stomaco .

TAVOLA VENTESIMAQUARTA.

**M**ostra la figura dell' ovaia di una Grancervola .  
b. unione de' due corpi dell' ovaia . cc. Due  
canali, per cui l' ovaia si scarica dell' uova fuor del  
corpo della Grancervola . d. Estremità della ovaia  
d. Tumore attaccato alla ovaia , e pieno di vermi  
segnati fff,

TAVOLA VENTESIMAQVINTA.

**F**ig. prima . Istrice , o Riccio Marino , o Bruco  
Marino .

Fig. seconda . Il medesimo animale volto col ventre  
all' aria .

Fig. terza . Canale degli alimenti dell' Istrice marino  
corredato di quaranta intestini , che non son tutti se-  
gnati nella presente figura .

Fig. quarta . Vermi dell' Istrice Marino .

Fig. quinta . Cuore dell' Istrice Marino .

Fig. sesta . Guaine, nelle quali entrano i quaranta in-  
testini del canale degli alimenti .

## TAVOLA VENTESIMASESTA.

*Fig. prima . Osso del membro genitale della Lontra .*

*Fig. seconda , e terza . Del Cane .*

*Fig. quarta , quinta , sesta , e settima . Della Martora , e della Faina .*

*Fig. ottava . Membro genitale del Ghiro .*

*Fig. nona . Osso del suddetto membro , il qual osso è disegnato maggiore di quel , che naturalmente suole essere .*

*Fig. decima . Osso del membro genitale della Puzzola .*

*Fig. undecima . Del Lupo .*

*Fig. duodecima . Della Iena odorifera , ovvero Animale del Zibetto .*

*Fig. decimaterza . Del Tasso , che ha in punta un corpo cartilaginoso .*

*Fig. decimaquarta . Del Tasso , tolto via il corpo cartilaginoso della punta .*

Fine della Esplicazione delle Tauole .



INDICE

INDICE  
DELLE COSE PIV NOTABILI,

A



- Bate Bourdesor a car. 14.  
Acacia 84.  
Acceggia 148.  
Accinghe non anno la vescica dell'aria 175.  
Aceto ammazza i Lombrichi terrestri 119.  
Acqua non ammazza i Lombrichi terrestri 105. 106.  
Acqua del Testuccio, e del Bagniuolo 115. Di Nocera non ammazza i Lombrichi 118. 127. Stillata di Lombrichi 123. Acque stillate nemiche degl'Insetti 121. e seg. 128. Acqua arzene ammazza i Lombrichi 118.  
Albanella uccello di rapina quanto campi senza mangiare 94. Non ha le Filandre 146. Gozzo 151.  
Albardeola 8.  
Agarico 108.  
Ago Pesce ha la vescica dell'aria 175.  
Aldrovando 166. 181.  
Alessandro Moro 14.  
Allodola, e suoi vermi 145.

Alla

- Allume di rocca* 116.  
*Aloè, che cosa operi co' Lombrichi* 106.  
*Amaranti. vedi Sciamiti.*  
*Ambrette* 84.  
*Andrea Cesalpino* 28.  
*Anguille* 41. *Calano al Mare per depositarvi le loro*  
*semenze* 67. *Tornano all' acque dolci* 68. *Loro*  
*vermi* 157. 171. *Vescica dell' aria* 173. 179.  
*Anici* 85.  
*Animali viaggiano da un paese all' altro* 67.  
*Animali morti di fame, e stato delle loro viscere* 95.  
*Antonio Felice Marsigli* 57.  
*Aquila reale quanto viva senza mangiare* 93. *Non*  
*suole aver le Filandre* 146. *Suoi vermi* 147. 151.  
*Intestini ciechi* 148.  
*Aquila pescatrice non suole avere le Filandre* 146.  
*Aquila Pesce* 12. 201.  
*Arancio* 79.  
*Ardero. vedi Giacomo.*  
*Argento vivo nemico de' Lombrichi* 116. 117.  
*Arfella* 62.  
*Asello Pesce, e suoi vermi* 163. 164.  
*Astore non suole aver le Filandre* 145.  
*Avoltoio quanto campi senza mangiare* 93. *Non suole*  
*aver le Filandre* 146.



## B

**B** Alani 185.

Barbagianni, e suoi vermi 147. Intestini ciechi 148.

Barbio ha le mascelle sdentate, e la vescica dell'aria di due cavità 178.

Bisciuole. vedi Vermi del fegato della Lepre,

Bociarto. vedi Samuel Bociarto.

Bolo non ammazza i Lombrichi 118. 127.

Borelli. vedi Gio. Alfonso.

Bourdelot. vedi Abate Bourdelot.

Bozzagro uccello di rapina quanto viva senza mangiare 93. Non suole aver le Filandre 146.

Bruchi muoiono coll'olio 104.

Bruma, o Tarlo di Mare 60.

Budelli de' Lumaconi ignudi terrestri 44.

Busoli, e loro reni 135. Cervello 197.

Buoi, e' loro reni 135.

Buonanni. vedi Filippo Buonanni.

## C

**C** Alamaio Pesce 12. 169. 172.

Calderugio, e suoi vermi 145.

Camaleonte 7.

Cammillo Coppoli 142.

Canali

- Canali pancreatici, e biliari degli uccelli 8.  
 Canale degli alimenti de' vermi degli animali 30. 33.  
 34.  
 Canale de' Lombrichi degli animali appartenente alla  
 generazione 31. 33. 34. 35. e seguenti.  
 Cane Carcana, e suo Cervello 196.  
 Cane, e suo osso del membro genitale 10. Verme del  
 rene 27. e seguenti.  
 Cani tenuti senza mangiare campano lungamente 94.  
 Cani Marini non anno la vescica dell' aria 175.  
 Cangiglio 58.  
 Capponi tenuti senza mangiare quanto campino 92. 93.  
 Caprio, e suoi vermi 136.  
 Carnumi 59. 61. 184.  
 Castrone, e vermi della testa 25.  
 Cervo, e suoi vermi sotto la pelle 25. Nella testa  
 25. Corna 46. 127.  
 Cervello cavato alle Tartarughe 140. 141.  
 Cervello del Delfino è grandissimo 196.  
 Cervelli di differenti Pesci 196. Pesci anno il cervel-  
 lo piccolissimo 196.  
 Cefalpino 28.  
 Cheppia ha la vescica dell' aria 175. Di una sola ca-  
 vità 176. Il suo canale s' impianta nel fondo dello  
 stomaco 181. Ha le mascelle sdentate 178.  
 Chinachina 110.  
 Chiocciolate terrestri tanto ne' maschi, quanto nelle femmine  
 è simile l' arnese della generazione 38. Chioc-

- Chioccirole terrestri 53. Canale degli alimenti 54. Ar-  
 nesi della generazione 54. Osso piramidato 55. Den-  
 te 53. Vova 57. Cuore 58. 88.  
 Ciano persico odorosissimo 84.  
 Cicogna, e suoi intestini ciechi 148. Vermi 150.  
 Cigno, e suoi vermi 145.  
 Cipolle di Giacinti turchini 74.  
 Clematide, o Vincapervinca 70.  
 Clitoride della Lepre 138.  
 Colchico autunnale giallo 87.  
 Colombacci tenuti senza mangiare quanto vivano 93.  
 intestini ciechi 148.  
 Coloquintida 109.  
 Conchiglie marine, e d'acqua dolce 59.  
 Corallina 109. 127.  
 Cornacchia, e suoi vermi 150.  
 Corvo, e suoi intestini ciechi 148. Vermi 150.  
 Cuore de' Lumaconi ignudi terrestri 46. Delle Chioc-  
 cirole terrestri 58. Lo anno tutti gli animali 62.  
 Molti insetti ne anno più di uno 62.

D

- D** Ecozione di Lupini, e di assenzio se sia nemica  
 a' Lombrichi 107.  
 Delfino 12. Suoi reni 135. 198. Non ha la vescica  
 dell'aria 176. 191. Vtero 192. Vermi 193.  
 F f 195.

195. Canali della bile 194. Cervello 196.  
 Dente del Lumacone ignudo terrestre 43. Delle Cbioc-  
 ciole terrestri, e delle marine 53.  
 Dentice, e suoi vermi 172.  
 Dieta regolata è grandissima medicina 95.  
 Dioscoride 107.  
 Donnola, e suo osso del membro 10.  
 Dragone marino non hà la vescica dell' aria 176.

## E

**E** Litropio Peruano maggiore 87.  
 Elleboro nero, Elleboro trifogliato 70.  
 Epatica, o Erba trinità dal fior doppio 69.  
 Erba Paralifis, o Primula Veris di fior turchino 69.  
 Esofago guernito di glandule 152.  
 Esperienze intorno alla morte de' Lombrichi 100. e  
 seguenti.  
 Esperienze intorno a' Giacinti, e ad altri fiori 69. e  
 seguenti.

## F

**F** Abio Colonna 159.  
 Faina, e osso del membro 10. Vermi del pol-  
 monè, e sotto la pelle 23. 24. 26.  
 Falcinello, e suoi intestini ciechi 148.

Falcone

*Falcone*, e suoi vermi detti *Filandre* 146. *Gozze* 151.

*Fegato della Serpe da due teste* 6.

*Ferraccia*, e suoi vermi 201.

*Filandre* vermi de' *Falconi* 146.

*Filippo Buonanni* 58. 62. 63. 64. 65. 66. 69.

*Fiori diversi* da 73. fino a 87.

*Foca* vedi *Vitello marino*.

*Folaga* 8. Ha lo stomaco pieno di *pietrazze* 91.

*Fragole nemiche de' Lombrichi* 120.

*Francesco Delestanghio* 28.

*Francesco Villughetto* 152.

*Fron di Giacinti tubercoli* 75.

G

**G** *Abbiano*, o *Mugnaio*, e suoi intestini ciechi 148.

*Garavina*, e suoi intestini ciechi 148.

*Garza bianca* 8. 154. *Vermi* 155.

*Gatto del Zibetto*, e suo osso del membro 10. 94. 137.

*Gatto domestico*, e *Salvatico*, e loro vermi 129. 130.

*Gattuccio pesce* 161. Non ha vescica dell'aria 176.

*Garvonchio sorta di Anguilla* 157.

*Garvotta* ha la vescica dell'aria 175. Di tre carvità 176.

*Garzella* 94. 137.

*Gelfo*

- Gellomini ordinari 79. 80. Del Gimé 80. 81. Di  
 Catalogna 81. 82.  
 Gherardo Blasio 4. 28.  
 Ghiandaia, e suoi intestini ciechi 148.  
 Ghiro, e suo membro genitale 10.  
 Giacinti fiori 63. 64. 69. 70. 71. 72. *Tuberosi*  
 74. 75.  
 Giacomo Ardero 57.  
 Ginefra 82. 83.  
 Giorgio Girolamo Velschio 145.  
 Giorgio Volfio 28.  
 Giovanni Alfonso Borelli 92. 180.  
 Giovanni Daniel Maique 197.  
 Giovanni Ionstono 7.  
 Girasole 87.  
 Girolamo Cardano 173. 175.  
 Girolamo Fabrizio Acquapendente 154.  
 Giunchiglie di Lorena, e odorose di Spagna 76.  
 Glandule dell' Esofago degli uccelli 152.  
 Goffredo Egenizio 28.  
 Gozzo degli uccelli 151. Del Polpo 171.  
 Grancivola, e sue uovaie 181. Vermi 183.  
 Grilli cantatori muoiono nell' olio 104.  
 Grilloalpe muoiono nell' olio 104. Nelle acque stil-  
 late 121.  
 Grongo, e suoi vermi 156. 157. 172. Vescica dell' ari-  
 na Tav. 18. Vescica dell' aria 157. 175. Di  
 un solo ventre 176. 179. *Grot-*

Grotto 8.  
Grù 8.  
Gualtieri Needam 177.  
Guso 8. Intestini ciechi 148. Vermi 149.

# I

**I**ntestini de' Lumaconi terrestri ignudi 44.  
Intestini ciechi degli uccelli 147. 148.  
Ionstono 166.  
Ipericon se sia medicina contro a' Lombrichi 102.  
Istrice marino 62. 187. Cuore 189. Intestini 189.  
Vermi 190.  
Istrice terrestre 10. Vermi 136.

# L

**L**accia 175. Vedi Cheppia  
Lampreda 97. Non ha la vescica dell' aria  
175.  
Lasca ha le mascelle sdentate, e la vescica dell' aria  
di due carità 178.  
Lattuga 83.  
Leone 10. Vermi sotto la pelle 25. 137.  
Lepre marina 51.  
Lepre terrestre, e suoi vermi 132. 133. 134.  
Lepri credute dal volgo ermafrodite 138.  
Leucoio

- Leucoio con foglie di Draba* 76.  
*Ligustro* 79.  
*Lister vedi Martino Lister*  
*Locusta marina*, orvaie, *Vermi* 183.  
*Lolligine* 12. 170.  
*Lombrichi terrestri, ed esperienze intorno ad essi* 100.  
*Lombrichi terrestri* 29. Anno il cuore 59. Sono di  
 specie differente da quella degli animali 89. Di di-  
 verse razze tra di loro 89. Viscere 90. 95. Si nu-  
 triscono di terra 91. *Vova* 98.  
*Lombrichi degli animali. Vedi Vermi.*  
*Lontra* 10. 195. *Reni* 135.  
*Lorenzo Magalotti* 13.  
*Luce delle carni, e de' pesci* 11. 12.  
*Lucertola* 7. 9. da due, e da tre code 11.  
*Lucertolone Affricano* 7. *Vermi* 20. 21. 22. *Vive*  
 lungamente senza cibo 95.  
*Lucertolone marino ha la vescica dell'aria* 175.  
*Luigi de la Grive* 14.  
*Lumaconi ignudi terrestri tanto i maschi, quanto le*  
*femmine anno simili gli arnesi della generazione* 38.  
 Loro coito 38. Descrizione 40. Loro forami esterni  
 40. 41. Impolverati col sale, e col Zucchero, e  
 con altre polveri muoiono 42. Occhi 43. Cuore 46.  
 Pietra 44. 45. Membro genitale 47. *Vova* 57.  
 Muoiono coll' olio 104. Nell' acque stillate 121.  
*Lumaconi ignudi di Mare* 51. 52.

Lupo



Lupo, e suo osso 10. Vermi 136.

M

**M** Alva 85.

Manzo, e suo cervello 197.

Marangone, e suoi vermi 154.

Marco Aurelio Severino 53. 55. 59. 130. 156.

Marcello Malpighi 8. 54. 57. 62. 104.

Martino Lister 43. 45. 57.

Martora 10. Vermi sotto la pelle 25. Nel rene 27.

33.

Mele nemicosimo de' Lombrichi 105. III.

Membri genitali de' serpenti sono come spinosi 9. De Rammarri, e delle Lucertole son biforcati 10. In molti animali quadrupedi son corredati di un' osso 10. Delle Chiocciolle terrestri 54. De' Lumaconi ignudi terrestri 38. 47.

Mentula marina 61. 183. 184.

Mercurio, vedi Argentovivo.

Mergo, e suoi vermi 154.

Merlo di Mare, e sua vescica dell' aria 175.

Microcosmo Marino. e suo cuore 61.

Mignatte di acqua dolce 88. Di Mare 88. Musoion coll' olio 104. Col Zucchero 113. Nell' acque stillate 121.

Mitridato non nuoce a' Lombrichi 104.

Mina-

*Monachetto*, e suoi vermi 152. 153.  
*Mosche* nate su' fiori 72. e seg. *Muoiono* coll' olio 103.  
*Moscherini* nati su' fiori 73. e seguenti.  
*Moscioni* nati su' fiori 73. e seguenti.  
*Mugnaiò*, o, *Gabbiano* sorta di uccello, e suoi intestini ciechi 148.  
*Murena*, suoi vermi 155. 156. *Vescica* dell' aria 175. Di una sola carità 176.  
*Musino* sorta di anguilla, e suoi vermi 157.

## N

**N** *Asello* Pesce ha la *vescica* dell' aria 175. Di una sola carità 176. 179.  
*Needam*, vedi *Gualtieri*.  
*Nibbio* non suole aver le *Filandre* 146.  
*Niccolò Stenone* 159. 196.  
*Nidi* degli animali 67.  
*Nocciuolo* pesce, e suoi vermi 165. 166. Non ha la *vescica* dell' aria 176.  
*Nottola*, o *Strige*, suoi intestini ciechi 148.  
*Nuotatojo* de' pesci 172. fino a 181.

## O

**O** *Cchi* de' *Lumaconi* ignudi 43.  
*Odorato* degl' *Insetti* 66.

*Oligerio*

- Oligerio Jacobèo 190. 191.  
 Olio da Bachi. Controveleni non ammazzano i Lombrichi 100. 102. 129.  
 Olio d' Ipericon non ammazza i Lombrichi 102.  
 Olio comune non molto nemico a' Lombrichi 103. Nemicissimo a molte generazioni d' insetti 103. 104.  
 Ombrina, e sua vescica dell' aria 175.  
 Orchis 87.  
 Orso 10. Vermi 135. Reni 135.  
 Orvietano non nuoce a' Lombrichi 104.  
 Osservazione delle viscere de' vermi degli animali 29.  
 30.  
 Osso del membro genitale di molti animali 10.  
 Osso delle Chiocciolte terrestri fatto a piramide 55.  
 Ostrea 45. 46. Ha il cuore 59. 62.

P

- P** Alettone, o Albardicola 8. Suoi intestini ciechi 148.  
 Paracelfo 102.  
 Pastinaca marina, e suoi vermi 201.  
 Pecchie, l' olio è loro nemico 104.  
 Pepe nemico de' Lombrichi 110. 124.  
 Pernice bianca de' Pirenei 8. 148.  
 Pesce Rondine 7. 12. Ha la vescica dell' aria 175.  
 Di due carità 176. Ha le mascelle con due ordini di denti 178.

G g

Pesce

- Pesce d' oro* 7. 177. *Non ha denti* 177. *Sua vescica dell' aria di quattro cavità* 177.  
*Pesce argentino, e suoi vermi* 158. 159. *Vescica dell' aria* 179. 180.  
*Pesce tamburo, e suoi vermi* 129.  
*Pesce tordo non ha intestini ciechi* 177.  
*Pesce Perso, ha la vescica dell' aria con una sola cavità, e le mascelle sdentate* 178. *Tre filari di denti nel palato* 179.  
*Pesce Squadro, e suoi vermi* 200.  
*Pesci del mare non tutti gettan l' uova nell' acqua salata* 67.  
*Pesci del mare viaggiano da un mare all' altro* 67.  
*Pesci che anno la vescica dell' aria, e che non la anno* 172. *fino a* 181.  
*Pietra de' Lumaconi ignudi terrestri* 44. 45. *De' Lumaconi marini* 52. *Dello stomaco degli uccelli* 91. 92.  
*Pinci Marini* 59. 60. 183. *Loro vermi* 185.  
*Pipistrello, e suoi vermi* 149. 150.  
*Poana uccel di rapina non ha le Filandre* 146.  
*Polmonaria* 70.  
*Polmone della Serpe da due teste* 4. *De' Lumaconi ignudi* 44.  
*Polmone marino* 12.  
*Polpo* 12. 170. *Canale degli alimenti* 171. *Ha il rostro come gli uccelli* 171.

Porcelli-

Porcellino d' India , e suo osso del membro 10.

Priapo marino 91.

Primula veris di fior turchino 69.

Puzzola , e osso del membro 10. Vermi sotto la pelle 25.

## Q

**Q**uadrupedi vivono lungamente senza mangiare ,  
e senza bere 94.

Quadrupedi , e loro osso del membro genitale 10.

## R

**R**abarbaro 108.

Ragana non ha la vescica dell' aria 176.

Ramarro 7. 9. Vermi 20. Con due code 10.

Reina pesce . Ha la vescica dell' aria 175. Di due  
carità 176. 178. Ha le mascelle sdentate 178.

Regnero de Graaf 154.

Reni dell' Orso , de' Vitelli marini , e di altri animali  
quadrupedi 135. 198. 199.

Riccio terrestre , e suoi vermi 22.

Rinoceronte , e suo corno 127.

Rondelezio 166. 175.

Rondine pesce 7. 12. Ha la vescica dell' aria 175.

Di due carità 176. Le mascelle con due ordini di  
denti 178.

G g 2

Rose

Rose rosse 77. Incarnate, e damaschine 77. 78.  
Rosolaccio 78.

## S

**S** Alamandra aquatica 7.  
Sale comune ammazza i Lumaconi terrestri 42.  
I Lombrichi terrestri, le Scolopendre, le Mignatte di acqua dolce 115.  
Sal fossile di Etiopia, e delle miniere di Vilisca 115.  
Sal gemma 116.  
Salnitro ammazza i Lumaconi ignudi, e i Lombrichi 42 116.  
Salviano 166.  
Samuel Bociarto 62.  
Sanguisughe vedi Mignatte  
Scarlattea 84.  
Scarpa pesce, ha le mascelle sdentate, e la vescica dell'aria di due carità 178.  
Sciamiti 84.  
Scolopendra terrestre 62. 122. Marina 104. 113. 122.  
Scorpioni muoiono coll'olio 104.  
Scorpione Affricano 13.  
Seppia, o pesce Calamaio 12. 169. Canale degli alimenti 171.  
Semenzina, o seme santo nuoce a' Lombrichi 108.  
Sena

*Sena* 109.

*Serola*. *Serolone* 154.

*Serpe da due teste* 1. 2. *Viscere* 4. *Vermi* 6. *Luce delle carni* 11. *Muore prima la testa destra della sinistra* 12. *Membri genitali spinosi* 9.

*Sfrena*, o *pesce argentino* 12. 158. *Vescica dell'aria* 175.

*Siero del sangue*, de' *Vescicatori* si quaglia al fuoco 134.

*Siero*, che i *medicamenti solutivi* cavano fuor del corpo umano per secesso, non si quaglia al fuoco, ma si mantiene fluido 134.

*Sonco aspro* 78.

*Spada pesce*, e *suoi vermi* 162. *Vescica dell'aria* 175.

*Sparviere* non suole aver le *Filandre* 146. *Suoi vermi* 147. *Gozzo* 151.

*Spigelio* 145.

*Spinoso*, o *Riccio terrestre*, e *suoi vermi* 22. *Marino* 187. 191. *Suoi vermi* 190.

*Squadro*, e *suoi vermi* 200.

*Stellione* 7.

*Stenone* vedi *Niccolò*.

*Strige*, o *Nottola*, *suoi intestini ciechi* 148.

## T

- T** Abacco ammazza i Lombrichi 124.  
 Talpa 10. Talpa dell' Imperato 104. 121.  
 Tamburo pesce , e suoi vermi 166. Non ha denti  
 167. Non ha vescica dell' aria 176.  
 Tanaceto Peruano del Cordo 86.  
 Tarabuso 8.  
 Tarli di Mare 60.  
 Tartarughe terrestri vivono lungamente senza mangia-  
 re 95.  
 Tartarughe terrestri cavato loro il cervello vivono  
 molti mesi 140. 141. Vivono ancora quelle di  
 acqua dolce 142.  
 Tartarughe terrestri vivono lungamente senza testa  
 143.  
 Tartarughe terrestri tutte , e sempre anno vermi negl'  
 intestini 144.  
 Tartarughe di acqua dolce non anno i vermi negl' inte-  
 stini 145.  
 Tartarughe marine non anno vermi negl' intestini 145.  
 Loro cervello 196. Keni 135. 142.  
 Tasso . Osso del membro 10. Quanto visse senza man-  
 giare 94. Suoi vermi 136. 137. 138.  
 Teodoro Cherchbringio 28.  
 Temia pesce 12.  
 Terra sigillata 118. 127.

Testi-



- Testicolo minimo autunnale di fior odorato* 87.  
*Tigre, e suoi vermi* 33.  
*Tinca di acqua dolce ha la vescica dell' aria* 175. *Distinta in due cavità* 176. *Le mascelle sdentate* 178.  
*Tinca di mare ha la vescica dell' aria distinta in tre cavità* 176.  
*Tommaso Bartolino* 28. 197.  
*Tommaso Mouseto* 106.  
*Tommaso Villis* 29. 30. 96. 97. 98.  
*Tonno, e suo cervello* 196.  
*Topo casalingo, e aquatico* 10. *Poco soffre il digiuno* 94. 139. *Vermi* 140.  
*Tordo di mare, e sua vescica dell' aria* 175.  
*Torpedine* 167. *Non ha la vescica dell' aria* 176.  
*Totano* 12. 170. 172.  
*Triaca non nuoce a' Lombrichi* 104.  
*Triglie non anno la vescica dell' aria* 175.

V

- V** *Ccelli, e pietre del loro stomaco* 91. 92. *Quei di rapina non costumano averle* 94.  
*Vcelli, e loro ugne* 151.  
*Velschio Giorgio Girolamo* 145.  
*Vermi da seta muoiono coll' olio* 104.  
*Vermi dell' uomo* 33. 34. *e seguenti* 124. 125. *e seguenti.* *Vermi*

- Del pesce Gattuccio 160. 161. Del pesce Spada  
 162. 168. Del pesce Nocciuolo 165. 166. Del  
 pesce Squadro 200. Del pesce Tamburo 129. 168.  
 Del Pincio marino 186.  
 Vespè muoiono coll' olio 104.  
 Vesciche dell' aria de' pesci 172.  
 Vgne degli uccelli 151.  
 Villis vedi Tommaso i  
 Vlisse Aldrovando 166. 181.  
 Vino ammazza i Lombrichi terrestri 119. Non nuoce  
 a quegli de' corpi umani 128.  
 Viola garofana 83. Affricana minore vellutata 86.  
 Vipera da due teste 21. Vipera Lioneſe 14. Di mare  
 12. Suoi vermi 161. Vescica dell' aria 175.  
 Vipera 11. Nel verno conserva il veleno 13. Con-  
 serva il veleno molti giorni dopo la morte 13. 14.  
 19. Fucelli impiaſtrati col suo veleno 18. Ver-  
 mi 20.  
 Viscere degli animali morti di fame 95.  
 Vitello marino, e suoi reni 135. Oſſo del membro 10.  
 Vitruolo 116.  
 Vmore untuoſo de' Lumaconi ignudi 41. 42.  
 Volpe terreſtre, e suoi vermi 10. 23. Di mare, e  
 suo cervello 196.  
 Vorra delle Chiocciole, e de' Lumaconi ignudi 57.  
 Vorra delle femmine de' quadrupedi 134.  
 Vorra di mare 60.

H h

Vrano-

Vranosco non ha la vescica dell'aria 176.  
 Vu spranusa ammazza i Lombrichi terrestri 119.

Z

Zoofiti 59.  
 Zuccairole vedi Grilloalpe.  
 Zu cchero raffinato ammazza i Lamaconi igmadi 42.

1 Lombrichi 112. 113. 128.



**FINE DELL' INDICE.**

965437

| <i>Carte</i> | <i>Linea</i> | <i>Errori</i> | <i>Correzioni</i> |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| 4.           | 23.          | allu          | Leggi alla        |
| 4.           | 27.          | brutti        | bruti             |
| 26.          | 16.          | biancha       | bianca            |
| 27.          | 6.           | fiorontina    | fiorentina        |
| 50.          | 24.          | scabrofa      | scabrosa          |
| 53.          | 18.          | quelle        | quelle            |
| 54.          | 25.          | nelcana le    | nel canale        |
| 135.         | 19.          | foleghe       | foche             |
| 176.         | 18.          | Gronco        | Grongo            |
| 170.         | 26.          | Origene       | origine           |
| 188.         | 5.           | filiginoso    | filigginoso       |
| 199.         | 13.          | evidetemente  | evidentemente     |
| 217.         | 6.           | Voctaia       | Vovaia            |

| Item          | Price | Quantity | Total   |
|---------------|-------|----------|---------|
| Wheat         | 2.50  | 100      | 250.00  |
| Barley        | 2.25  | 100      | 225.00  |
| Oats          | 1.75  | 100      | 175.00  |
| Rye           | 2.00  | 100      | 200.00  |
| Corn          | 1.50  | 100      | 150.00  |
| Beans         | 3.00  | 100      | 300.00  |
| Peas          | 2.75  | 100      | 275.00  |
| Lentils       | 2.50  | 100      | 250.00  |
| Flour         | 4.00  | 100      | 400.00  |
| Sugar         | 5.00  | 100      | 500.00  |
| Butter        | 6.00  | 100      | 600.00  |
| Eggs          | 7.00  | 100      | 700.00  |
| Chicken       | 8.00  | 100      | 800.00  |
| Duck          | 9.00  | 100      | 900.00  |
| Geese         | 10.00 | 100      | 1000.00 |
| Pork          | 11.00 | 100      | 1100.00 |
| Beef          | 12.00 | 100      | 1200.00 |
| Lamb          | 13.00 | 100      | 1300.00 |
| Veal          | 14.00 | 100      | 1400.00 |
| Fish          | 15.00 | 100      | 1500.00 |
| Fruit         | 16.00 | 100      | 1600.00 |
| Vegetables    | 17.00 | 100      | 1700.00 |
| Spices        | 18.00 | 100      | 1800.00 |
| Wine          | 19.00 | 100      | 1900.00 |
| Beer          | 20.00 | 100      | 2000.00 |
| Tea           | 21.00 | 100      | 2100.00 |
| Coffee        | 22.00 | 100      | 2200.00 |
| Herbs         | 23.00 | 100      | 2300.00 |
| Medicine      | 24.00 | 100      | 2400.00 |
| Books         | 25.00 | 100      | 2500.00 |
| Tools         | 26.00 | 100      | 2600.00 |
| Clothing      | 27.00 | 100      | 2700.00 |
| Shoes         | 28.00 | 100      | 2800.00 |
| Household     | 29.00 | 100      | 2900.00 |
| Travel        | 30.00 | 100      | 3000.00 |
| Education     | 31.00 | 100      | 3100.00 |
| Religion      | 32.00 | 100      | 3200.00 |
| Art           | 33.00 | 100      | 3300.00 |
| Science       | 34.00 | 100      | 3400.00 |
| History       | 35.00 | 100      | 3500.00 |
| Geography     | 36.00 | 100      | 3600.00 |
| Mathematics   | 37.00 | 100      | 3700.00 |
| Physics       | 38.00 | 100      | 3800.00 |
| Chemistry     | 39.00 | 100      | 3900.00 |
| Astronomy     | 40.00 | 100      | 4000.00 |
| Music         | 41.00 | 100      | 4100.00 |
| Dance         | 42.00 | 100      | 4200.00 |
| Theater       | 43.00 | 100      | 4300.00 |
| Sports        | 44.00 | 100      | 4400.00 |
| Games         | 45.00 | 100      | 4500.00 |
| Amusement     | 46.00 | 100      | 4600.00 |
| Entertainment | 47.00 | 100      | 4700.00 |
| Recreation    | 48.00 | 100      | 4800.00 |
| Leisure       | 49.00 | 100      | 4900.00 |
| Relaxation    | 50.00 | 100      | 5000.00 |

*Tauola prima*






~ Tavola Seconda ~  
Fig. pr

Fig. 3



Fig. 2






Handwritten text, possibly a title or date, at the top center.

1912



Handwritten text, possibly a signature or date, on the right side.





Tabula 4

fig 1




fig 2



fig 3






fig 4



fig 5





*Paucula 5*

*fig 3*



*fig 2*



*fig 1*



*fig 4*



*fig 5*



*fig 6*



*fig 7*






# Tavola Sesta

fig: I

fig: 4

fig: 2

fig: 3





David Smith



Fig 2



# Tauola Settima

fig: 1



fig: 2



fig: 3



fig: 4



fig: 5






fig: 6




*Faint handwritten text at the top of the page, possibly a title or date.*



*Faint handwritten text at the bottom right of the page.*



fig. 2



England!





*fig 3*



1844



1844

# Tauola Decima

fig: 1



fig: 4



fig: 3




fig: 2



fig: 5





Handwritten text at the top of the page, possibly a title or address, written in a cursive script.

Main body of the document containing several lines of handwritten text in cursive script, arranged in a vertical column. The text is heavily faded and difficult to decipher.



*Tauola*

*Undecima*

fig: I

fig: 3



fig: 2




fig: 4



ccg



1015



# Tauola Duodecima

fig: 4




fig: I




fig: 2









fig: 3




Handwritten text at the top of the page, possibly a title or date, which is mostly illegible due to fading.



# Tauola Decima Terza



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or date, which is mostly illegible due to fading.



# Tauola DecimaQuarta



fig. 8

fig. 10

fig. 9






Conrad J. Smith, Esq. Lake Placid



# Tavola Decima Quinta




Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.




Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script, likely a letter or document. The text is faint and difficult to read due to fading and bleed-through from the reverse side of the paper.

# Tauola Decima Sesta






# Tauola Decima Settima





# Tavola Decima Ottava







*Tauola Diciannouesima*

*fig: 4*




*fig: 2*



*fig: 1*




*fig: 3*



*fig: 5*



*fig: 6*




*fig: 7*






*Tauola Ventesima*



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, written in a cursive script.



# Tauola Ventunesima prima




Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.



Handwritten text on the right side of the page, possibly a date or reference number.

Main body of handwritten text, appearing to be a letter or document, written in a cursive script. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.


*Tavola Ventesima quarta*








*Tauola Ventesima quinta.*  
*fig: 5*




*fig i*



*fig 4*





*fig 3*



*fig. 6*

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or description, which is mostly illegible due to fading.







*Tauola Vigesima Sesta*




Tenue d'Espagne 1714



# Tauola Ventesima seconda



အလောင်းကောင်ဆရာတော်၏ နာမည်



I 37

5

4

# Tauola Ventesimaterza

fig: 2




fig: 4



fig: 3





fig: I











71200

Jan 1400

